

Atlante Fotografico delle Tipologie Forestali

REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI E LA TELEMATICA

Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2387126 Nord: 4646437
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

11 - Lecceta rupicola

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:




6 - Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)

LECCETA RUPICOLA

Popolamenti rupestri a prevalenza di leccio, su pendici acclivi della fascia dei querceti caducifogli, localizzati in gole e su terreni accidentati con affioramenti rocciosi, sui rilievi calcarei interni; presenti gli arbusti della macchia mediterranea, rare le specie mesofile.

Classificazione fitosociologica

Carpinion orientalis
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis
Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis
Cytisophyllo sessilifolii-Quercetum ilicis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2391178 Nord: 4642372
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

11 - Lecceta rupicola

TIPO STRUTTURALE:

4 - Boschi infraperti

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:




6 - Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)

LECCETA RUPICOLA

Popolamenti rupestri a prevalenza di leccio, su pendici acclivi della fascia dei querceti caducifogli, localizzati in gole e su terreni accidentati con affioramenti rocciosi, sui rilievi calcarei interni; presenti gli arbusti della macchia mediterranea, rare le specie mesofile.

Classificazione fitosociologica

Carpinion orientalis
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis
Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis
Cytisophyllo sessilifolii-Quercetum ilicis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2399262 Nord: 4633298
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante IV

TIPO FORESTALE:

12 - Lecceta xero-termofila

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


7 - Popolamenti molto infiammabili di conifere tra
0,5 e 2 m.

LECCETA COSTIERA TERMOFILA

Boschi chiusi a prevalenza di leccio con specie caducifoglie mesoxerofile subordinate. Questa formazione è localizzata nella zona costiera e sui rilievi collinari prospicienti al mare. Il sottobosco è caratterizzato dalla presenza di arbusti della macchia e specie arbustive termofile.

Classificazione fitosociologica

Carpinion orientalis
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2397568 Nord: 4634795
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante IV

TIPO FORESTALE:

12 - Lecceta xero-termofila

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



7 - Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.

LECCETA COSTIERA TERMOFILA

Boschi chiusi a prevalenza di leccio con specie caducifoglie mesoxerofile subordinate. Questa formazione è localizzata nella zona costiera e sui rilievi collinari prospicienti al mare. Il sottobosco è caratterizzato dalla presenza di arbusti della macchia e specie arbustive termofile.

Classificazione fitosociologica

Carpinion orientalis
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2396945 Nord: 4634846
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante IV

TIPO FORESTALE:

12 - Lecceta xero-termofila

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



7 - Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.

LECCETA COSTIERA TERMOFILA

Boschi chiusi a prevalenza di leccio con specie caducifoglie mesoxerofile subordinate. Questa formazione è localizzata nella zona costiera e sui rilievi collinari prospicienti al mare. Il sottobosco è caratterizzato dalla presenza di arbusti della macchia e specie arbustive termofile.

Classificazione fitosociologica

Carpinion orientalis
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2402342 Nord: 4631345
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

13 - Lecceta mesoxerofila

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



7 - Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.

LECCETA MESOXEROFILA

Bosco a prevalenza di leccio consociato a carpino nero, orniello, roverella e talvolta a specie mesofile. Il sottobosco è caratterizzato da specie mesoxerofile raramente da quelle mediterranee. Si trova sia nelle zone collinari che sulla costa, su versanti caldi e su suoli mediamente profondi o superficiali.

Classificazione fitosociologica

Carpinion orientalis
Cytisophyllo sessilifolii-Quercetum ilicis
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis
Festuco exaltatae-Quercetum ilicis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2421102 Nord: 4684341
CTR (1:25.000): Foglio 146 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

13 - Lecceta mesoxerofila

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

10% - 20%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

LECCETA MESOXEROFILA

Bosco a prevalenza di leccio consociato a carpino nero, orniello, roverella e talvolta a specie mesofile. Il sottobosco è caratterizzato da specie mesoxerofile raramente da quelle mediterranee. Si trova sia nelle zone collinari che sulla costa, su versanti caldi e su suoli mediamente profondi o superficiali.

Classificazione fitosociologica

Carpinion orientalis
Cytisophyllo sessilifolii-Quercetum ilicis
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis
Festuco exaltatae-Quercetum ilicis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2400191 Nord: 4631521
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

21 - Querceto a roverella pioniero

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:




6 - Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)

QUERCETO A ROVERELLA PIONIERO

Boscaglie aperte a prevalenza di roverella con ornioello e carpino nero e un ricco strato arbustivo mesoxerofilo. Si trova su tutti i tipi di substrato, in particolare nei versanti meridionali e caldi dei rilievi collinari; rappresenta una fase di ricolonizzazione di ex-pascoli o ex-coltivi.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2.185.340 Nord: 4.520.230
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

21 - Querceto a roverella pioniero

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



2 - Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada

QUERCETO A ROVERELLA PIONIERO

Boscaglie aperte a prevalenza di roverella con orniello e carpino nero e un ricco strato arbustivo mesoxerofilo. Si trova su tutti i tipi di substrato, in particolare nei versanti meridionali e caldi dei rilievi collinari; rappresenta una fase di ricolonizzazione di ex-pascoli o ex-coltivi.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2419045 Nord: 4651910
CTR (1:25.000): Foglio 146 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

21 - Querceto a roverella pioniero

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

QUERCETO A ROVERELLA PIONIERO

Boscaglie aperte a prevalenza di roverella con ornello e carpino nero e un ricco strato arbustivo mesoxerofilo. Si trova su tutti i tipi di substrato, in particolare nei versanti meridionali e caldi dei rilievi collinari; rappresenta una fase di ricolonizzazione di ex-pascoli o ex-coltivi.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2403920 Nord: 4627868
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

22 - Querceto a roverella tipico

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



6 - Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)

QUERCETO A ROVERELLA TIPICO

Boschi per lo più aperti a prevalenza di roverella con specie mesoxerofile e abbondante strato arbustivo. Si trova su esposizioni calde e suoli generalmente superficiali e ricchi di scheletro.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
 STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
 SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
 E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2417441 Nord: 4655019
 CTR (1:25.000): Foglio 146 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

22 - Querceto a roverella tipico

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:




9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

QUERCETO A ROVERELLA TIPICO

Boschi per lo più aperti a prevalenza di roverella con specie mesoxerofile e abbondante strato arbustivo. Si trova su esposizioni calde e suoli generalmente superficiali e ricchi di scheletro.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2426618 Nord: 4641953
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

22 - Querceto a roverella tipico

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


6 - Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)

QUERCETO A ROVERELLA TIPICO

Boschi per lo più aperti a prevalenza di roverella con specie mesoxerofile e abbondante strato arbustivo. Si trova su esposizioni calde e suoli generalmente superficiali e ricchi di scheletro.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2381575 Nord: 4668884
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

23 - Querceto a roverella mesoxerofilo

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:




9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

QUERCETO A ROVERELLA MESOXEROFILO

Si trova in esposizioni medio-calde su rilievi collinari e montuosi ed è caratterizzato da boschi chiusi di roverella mista ad aceri, carpino nero e cerro. Il sottobosco è ricco di arbusti mesoxerofili e presenta spesso tappeti di edera; abbondanti le graminacee nei tratti più luminosi.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2383101 Nord: 4689529
CTR (1:25.000): Foglio 139 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

23 - Querceto a roverella mesoxerofilo

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


8 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

QUERCETO A ROVERELLA MESOXEROFILO

Si trova in esposizioni medio-calde su rilievi collinari e montuosi ed è caratterizzato da boschi chiusi di roverella mista ad aceri, carpino nero e cerro. Il sottobosco è ricco di arbusti mesoxerofili e presenta spesso tappeti di edera; abbondanti le graminacee nei tratti più luminosi.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis
Daphno laureolae-Quercetum cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2397592 Nord: 4687827
CTR (1:25.000): Foglio 146 - Quadrante IV

TIPO FORESTALE:

23 - Querceto a roverella mesoxerofilo

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

QUERCETO A ROVERELLA MESOXEROFILO

Si trova in esposizioni medio-calde su rilievi collinari e montuosi ed è caratterizzato da boschi chiusi di roverella mista ad aceri, carpino nero e cerro. Il sottobosco è ricco di arbusti mesoxerofili e presenta spesso tappeti di edera; abbondanti le graminacee nei tratti più luminosi.

Classificazione fitosociologica

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis
Chamaeytiso hirsuti-Quercetum pubescentis
Daphno laureolae-Quercetum cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2391315 Nord: 4643434
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

31 - Cerreta submontana mesoxerofila

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



7 - Popolamenti molto infiammabili di conifere tra
0,5 e 2 m.

CERRETA MESOXEROFILA

Presente sui versanti caldi dei rilievi interni sia su substrati calcarei che arenacei. Il bosco è caratterizzato dalla prevalenza del cerro ed in minor misura aceri, rovere e carpino nero. Il sottobosco è luminoso e comprende specie mesoxerofile o termofile.

Classificazione fitosociologica

Teucrio siculi-Quercion cerridis
Aremonio agrimonoidis-Quercetum cerridis
Aceri obtusati-Quercetum cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2374978 Nord: 4661621
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

31 - Cerreta submontana mesoxerofila

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



2 - Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada

CERRETA MESOXEROFILA

Presente sui versanti caldi dei rilievi interni sia su substrati calcarei che arenacei. Il bosco è caratterizzato dalla prevalenza del cerro ed in minor misura aceri, rovere e carpino nero. Il sottobosco è luminoso e comprende specie mesoxerofile o termofile.

Classificazione fitosociologica

Teucrio siculi-Quercion cerridis
Aremonio agrimonoidis-Quercetum cerridis
Aceri obtusati-Quercetum cerridis
Cytiso villosi-Quercetum cerris



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2366750 Nord: 4665624
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

31 - Cerreta submontana mesoxerofila

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:

9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CERRETA MESOXEROFILA

Presente sui versanti caldi dei rilievi interni sia su substrati calcarei che arenacei. Il bosco è caratterizzato dalla prevalenza del cerro ed in minor misura aceri, rovere e carpino nero. Il sottobosco è luminoso e comprende specie mesoxerofile o termofile.

Classificazione fitosociologica

Teucrio siculi-Quercion cerridis
Aremonio agrimonioidis-Quercetum cerridis
Aceri obtusati-Quercetum cerridis
Cytiso villosi-Quercetum cerris



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2363798 Nord: 4664679
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

32 - Cerreta mesofila

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CERRETA MESOFILA

Si trova su versanti freschi ed è caratterizzata da boschi chiusi e densi, a prevalenza di cerro con specie mesofile nel piano inferiore (carpino bianco, faggio, aceri e sorbi) e più raramente mesoxerofile. Il sottobosco arbustivo ed erbaceo è talvolta abbondante ed è costituito da specie mesofile.

Classificazione fitosociologica

Teucrio siculi-Quercion cerridis
Aremonio agrimonioidis-Quercetum cerridis
Aceri obtusati-Quercetum cerridis
Cytiso villosi-Quercetum cerris
Listero ovate-Quercetum cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2454507 Nord: 4634515
CTR (1:25.000): Foglio 153 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

32 - Cerreta mesofila

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:





9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CERRETA MESOFILA

Si trova su versanti freschi ed è caratterizzata da boschi chiusi e densi, a prevalenza di cerro con specie mesofile nel piano inferiore (carpino bianco, faggio, aceri e sorbi) e più raramente mesoxerofile. Il sottobosco arbustivo ed erbaceo è talvolta abbondante ed è costituito da specie mesofile.

Classificazione fitosociologica

Teucro siculi-Quercion cerridis
Aremonio agrimonoidis-Quercetum cerridis
Aceri obtusati-Quercetum cerridis
Cytiso villosi-Quercetum cerris
Listero ovate-Quercetum cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2387263 Nord: 4646256
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

41 - Orno-ostrieto pioniero

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

ORNO-OSTRIETO PIONIERO

Formazioni miste a prevalenza di carpino nero e orniello con partecipazione di roverella, aceri e carpinella, a densità scarsa, su pendici calde e per lo più ripide con abbondante detrito.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae
Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2369830 Nord: 4662393
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

41 - Orno-ostrieto pioniero

TIPO STRUTTURALE:

4 - Boschi infraperiti

GRADO DI COPERTURA:

10% - 20%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:




1 - Pascolo quasi completamente secco (praterie)

ORNO-OSTRIETO PIONIERO

Formazioni miste a prevalenza di carpino nero e orniello con partecipazione di roverella, aceri e carpinella, a densità scarsa, su pendici calde e per lo più ripide con abbondante detrito.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae
Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2416936 Nord: 4656160
CTR (1:25.000): Foglio 146 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

41 - Orno-ostrieto pioniero

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

10% - 20%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

ORNO-OSTRIETO PIONIERO

Formazioni miste a prevalenza di carpino nero e orniello con partecipazione di roverella, aceri e carpinella, a densità scarsa, su pendici calde e per lo più ripide con abbondante detrito.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae
Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2386891 Nord: 4648460
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

42 - Ostrieto submontano mesoxerofilo

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:

7 - Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.

OSTRIETO MESOXEROFILO

Bosco a prevalenza di carpino nero consociato con orniello, carpinella, roverella e sporadico cerro. Arbusti abbondanti (citiso, ginepri, rose). Si trova su qualsiasi tipo di substrato, in zone di forte pendio e versanti abbastanza freschi e suoli spesso superficiali.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae
Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2439068 Nord: 4650385
CTR (1:25.000): Foglio 147 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

42 - Ostrieto submontano mesoxerofilo

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo P.D.

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



8 - Lettieria indecomposta e compattata di conifere
a foglia corta o di latifoglie

OSTRIETO MESOXEROFILO

Bosco a prevalenza di carpino nero consociato con orniello, carpinella, roverella e sporadico cerro. Arbusti abbondanti (citiso, ginepri, rose). Si trova su qualsiasi tipo di substrato, in zone di forte pendio e versanti abbastanza freschi e suoli spesso superficiali.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae
Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2406524 Nord: 4643129
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante IV

TIPO FORESTALE:

42 - Ostrieto submontano mesoxerofilo

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



9 - Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

OSTRIETO MESOXEROFILO

Bosco a prevalenza di carpino nero consociato con orniello, carpinella, roverella e sporadico cerro. Arbusti abbondanti (citiso, ginepri, rose). Si trova su qualsiasi tipo di substrato, in zone di forte pendio e versanti abbastanza freschi e suoli spesso superficiali.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae
Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2388286 Nord: 4635037
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

43 - Ostrieto mesofilo

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo P.D.

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


8 - Lettieria indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie

OSTRIETO MESOFILO

Popolamenti a prevalenza di carpino nero, in esposizioni settentrionali, o nei versanti medio-alti e lungo i valloni freschi e ombrosi, con presenza di specie arboree mesofile come faggio, aceri, tiglio e carpino bianco. Strato arbustivo rado; erbaceo spesso con abbondante edera.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2432440 Nord: 4645494
CTR (1:25.000): Foglio 152 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

43 - Ostrieto mesofilo

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo P.D.

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:





8 - Lettieria indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie

OSTRIETO MESOFILO

Popolamenti a prevalenza di carpino nero, in esposizioni settentrionali, o nei versanti medio-alti e lungo i valloni freschi e ombrosi, con presenza di specie arboree mesofile come faggio, aceri, tiglio e carpino bianco. Strato arbustivo rado; erbaceo spesso con abbondante edera.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2363652 Nord: 4660542
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

43 - Ostrieto mesofilo

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo P.D.

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:

8 - Lettieria indecomposta e compattata di conifere
a foglia corta o di latifoglie

OSTRIETO MESOFILO

Popolamenti a prevalenza di carpino nero, in esposizioni settentrionali, o nei versanti medio-alti e lungo i valloni freschi e ombrosi, con presenza di specie arboree mesofile come faggio, aceri, tiglio e carpino bianco. Strato arbustivo rado; erbaceo spesso con abbondante edera.

Classificazione fitosociologica

Melittio melissophylli-Ostryetum carpinifoliae
Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2391179 Nord: 4635360
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

51 - Castagneto da frutto

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia P.D.

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CASTAGNETO DA FRUTTO

Popolamenti localizzati sui rilievi interni, con individui ad alto fusto, generalmente innestati per la produzione di frutti, soggetti a cure colturali più o meno intense o di recente abbandono; presentano una copertura rada, costituita da soggetti di grosse dimensioni. Cenosi da mesoxerofile o mesofile, acidofile, su suoli ben drenati e privi di calcare attivo.

Classificazione fitosociologica

Melampyro italicae-Castaneetum sativae
Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae
Teucro siculi-Quercion cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2388139 Nord: 4638325
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

51 - Castagneto da frutto

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:





9 - Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CASTAGNETO DA FRUTTO

Popolamenti localizzati sui rilievi interni, con individui ad alto fusto, generalmente innestati per la produzione di frutti, soggetti a cure colturali più o meno intense o di recente abbandono; presentano una copertura rada, costituita da soggetti di grosse dimensioni. Cenosi da mesoxerofile o mesofile, acidofile, su suoli ben drenati e privi di calcare attivo.

Classificazione fitosociologica

Melampyro italicae-Castaneetum sativae
Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae
Teucrio siculi-Quercion cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2377587 Nord: 4651347
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

51 - Castagneto da frutto

TIPO STRUTTURALE:

1 - Fustaia

GRADO DI COPERTURA:

21% - 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:


2 - Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada

CASTAGNETO DA FRUTTO

Popolamenti localizzati sui rilievi interni, con individui ad alto fusto, generalmente innestati per la produzione di frutti, soggetti a cure colturali più o meno intense o di recente abbandono; presentano una copertura rada, costituita da soggetti di grosse dimensioni. Cenosi da mesoxerofile o mesofile, acidofile, su suoli ben drenati e privi di calcare attivo.

Classificazione fitosociologica

Melampyro italicae-Castaneetum sativae
Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae
Teucro siculi-Quercion cerridis



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2384619 Nord: 4646516
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

52 - Castagneto (neutrofilo-acidofilo)

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:





9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CASTAGNETO (NEUTROFILO-ACIDOFILO)

Cedui di castagno abbandonati o regolarmente utilizzati, su suoli calcarei o arenacei, con sottobosco piuttosto denso. Spesso sono presenti specie arboree mesofile come carpino nero, faggio, e carpino bianco.

Classificazione fitosociologica

Melampyro italicae-Castaneetum sativae
Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2372516 Nord: 4662640
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

52 - Castagneto (neutrofilo-acidofilo)

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CASTAGNETO (NEUTROFILO-ACIDOFILO)

Cedui di castagno abbandonati o regolarmente utilizzati, su suoli calcarei o arenacei, con sottobosco piuttosto denso. Spesso sono presenti specie arboree mesofile come carpino nero, faggio, e carpino bianco.

Classificazione fitosociologica

Melampyro italicae-Castaneetum sativae
Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2375567 Nord: 4655315
CTR (1:25.000): Foglio 145 - Quadrante II

TIPO FORESTALE:

52 - Castagneto (neutrofilo-acidofilo)

TIPO STRUTTURALE:

3 - Ceduo P.D.

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



9 - Lettieria di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati

CASTAGNETO (NEUTROFILO-ACIDOFILO)

Cedui di castagno abbandonati o regolarmente utilizzati, su suoli calcarei o arenacei, con sottobosco piuttosto denso. Spesso sono presenti specie arboree mesofile come carpino nero, faggio, e carpino bianco.

Classificazione fitosociologica

Melampyro italicae-Castaneetum sativae
Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2386289 Nord: 4637504
CTR (1:25.000): Foglio 151 - Quadrante I

TIPO FORESTALE:

61 - Faggeta altomontana mesoxerofila

TIPO STRUTTURALE:

4 - Popolamenti infraperti

GRADO DI COPERTURA:

> 50%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:



8 - Lettieria indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie

FAGGETA ALTOMONTANA RUPESTRE

Popolamenti a prevalenza di faggio spesso al limite della vegetazione arborea, su pendii molto acclivi, o lungo i crinali; sui versanti caldi, con affioramenti rocciosi e spesso inframezzati da detrito di falda. Il grado di copertura è generalmente contenuto, aspetto spesso cespuglioso, fusti contorti e significativa presenza di specie arbustive mesoxerofile (ginepri).

Classificazione fitosociologica

Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae
Anemone apenninae-Fagetum sylvaticae



Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI
E LA TELEMATICA

ATLANTE FOTOGRAFICO DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

ANAGRAFE DEL PUNTO:

Est: 2402617 Nord: 4665304
CTR (1:25.000): Foglio 146 - Quadrante III

TIPO FORESTALE:

61 - Faggeta altomontana mesoxerofila

TIPO STRUTTURALE:

2 - Formazioni boscate a struttura composita

GRADO DI COPERTURA:

10% - 20%

MODELLO DI COMBUSTIBILE:

2 - Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada

FAGGETA ALTOMONTANA RUPESTRE

Popolamenti a prevalenza di faggio spesso al limite della vegetazione arborea, su pendii molto acclivi, o lungo i crinali; sui versanti caldi, con affioramenti rocciosi e spesso inframezzati da detrito di falda. Il grado di copertura è generalmente contenuto, aspetto spesso cespuglioso, fusti contorti e significativa presenza di specie arbustive mesoxerofile (ginepri).

Classificazione fitosociologica

Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae
Anemone apenninae-Fagetum sylvaticae

