






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	90,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	64,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	19,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	2,0	1,6	1,4	2,3	0,6	0,3	0,2	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6	12,0	8,3	11,9	11,9	9,0	5,6	13,4	17,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	8,0	1,9	1,7	1,8	2,1	3,1	18,2	27,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	1,0	1,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,1	4,4	2,0	1,0	0,7	0,7	3,0	1,8	5,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,8	0,7	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,3	1,3	1,1	0,9	1,2	1,1	0,8	0,3	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	38,0	22,1	11,9	7,1	5,3	3,6	1,5	0,7	0,3	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,4	3,8	6,3	9,4	12,6	12,6	8,8	6,3	2,6	0,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	4,2	1,8	3,0	2,8	2,5	2,1	1,8	0,8	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	64,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	18,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	75,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	16,6
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	118,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	184,4
14	Faggeta termofila e basso montana	129,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	213,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	77,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	74,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	3,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	155,3
26	Querceto a roverella pioniero	113,4
27	Querceto a roverella tipico	1,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	439,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	24,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	53,6
32	Robinieta-aillanteto	1,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,6	2,7	8,3	5,1	1,6	0,1	0,1	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	5,4	10,3	28,8	17,7	4,2	0,6	1,5	6,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	5,9	3,7	1,1	0,9	1,9	0,5	0,2	2,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	15,7	9,7	8,4	1,6	1,1	6,3	43,0	32,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	23,0	72,7	67,4	8,3	0,5	0,3	2,6	9,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	8,7	17,3	49,5	13,6	1,1	0,8	7,9	30,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	25,9	34,5	63,0	31,9	6,2	4,8	22,4	24,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,6	9,4	41,2	22,3	3,4	0,4	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	12,6	13,8	23,0	7,9	2,1	1,5	2,9	10,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,4	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	29,7	34,0	36,2	19,0	7,8	3,1	7,6	17,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	15,5	22,9	41,1	18,0	4,6	2,5	1,5	7,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	96,5	85,9	90,1	50,8	15,7	2,4	23,7	74,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,4	1,8	3,6	4,1	2,3	1,5	5,0	4,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	2,3	13,6	24,2	4,0	0,1	0,0	1,6	7,8
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,3	0,2	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,1	7,1	7,8	2,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,4	3,9	12,3	22,5	18,5	9,7	4,9	1,6	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,4	0,8	2,4	4,8	4,2	2,8	1,0	0,2	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	3,4	9,4	20,3	26,1	23,1	18,7	11,1	5,2	0,9	0,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	12,6	25,6	38,3	35,3	30,5	20,8	13,2	6,2	1,9	0,2
14	Faggeta termofila e basso montana	2,9	10,1	15,7	22,8	27,0	22,8	13,5	8,7	3,4	2,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,3	33,0	59,9	53,7	35,8	17,0	6,0	2,1	0,5	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,4	11,4	19,4	15,1	11,4	8,6	4,8	2,2	1,6	1,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	1,2	6,3	13,0	17,7	13,5	10,9	6,9	3,2	1,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,9	0,9	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	39,4	32,7	34,0	25,8	14,4	5,8	2,2	0,8	0,2	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,0	11,9	28,7	35,7	20,9	8,9	2,5	0,9	0,4	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,7	37,9	101,7	125,2	92,8	43,7	18,8	6,6	2,5	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,7	3,7	5,0	3,8	3,4	2,8	1,4	0,8	0,6	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,4	3,5	6,4	9,0	11,5	10,1	6,9	2,7	1,0	0,1
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	4,2	11,8	22,5	31,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,9	11,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	64,7	53,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	76,1	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,3	47,8	66,6	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	21,0	86,2	62,8	41,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	1,9	34,2	31,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	13,1	52,6	7,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	43,5	46,6	45,3	19,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	10,8	39,4	38,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	66,2	246,1	118,5	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	8,4	6,2	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,6	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	20,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	59,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,2
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,6
26	Querceto a roverella pioniero	4,5
27	Querceto a roverella tipico	155,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	44,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,1	6,2	4,7	0,8	0,1	0,9	3,1	1,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	15,9	29,3	8,8	0,4	0,0	0,3	2,3	2,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,4	3,5	1,8	0,1	0,1	1,2	3,4	4,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	3,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	12,0	60,9	32,9	3,6	0,1	0,9	24,5	20,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	9,2	8,4	3,4	0,9	0,1	1,8	12,0	9,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,4	4,0	8,2	5,1	2,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	15,9	25,6	12,3	3,6	1,2	0,2	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,8	6,4	6,3	2,8	0,9	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,5	1,6	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,2	17,3	33,1	28,9	23,1	16,6	12,7	8,9	7,5	5,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	7,9	11,4	10,6	6,5	3,8	1,4	1,2	0,6	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	16,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	32,1	27,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	2,9	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	23,0	99,6	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	10,2	34,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	32,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	9,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	141,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	112,9
14	Faggeta termofila e basso montana	142,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	161,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	2,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	17,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	30,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	361,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	15,3
32	Robinieta-ailanteto	6,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,4	0,7	9,2	12,7	6,6	1,8	0,4	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,8	4,1	1,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	23,2	8,1	0,4	0,1	2,3	24,6	47,6	35,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	15,6	16,0	4,4	0,0	0,2	4,7	46,4	25,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	7,7	13,8	41,6	18,9	10,7	11,7	26,6	11,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	39,8	20,0	11,8	1,1	0,8	4,8	36,9	46,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,3	10,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	6,5	1,0	0,2	0,1	0,3	1,5	9,4	11,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	39,4	7,0	1,0	0,6	2,7	25,3	162,1	123,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,4	2,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,8	0,4	0,9	0,4	0,0	0,6	8,3	4,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	3,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,5	13,3	12,8	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,3	2,4	3,5	2,3	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,5	5,6	21,3	34,7	34,2	24,7	12,0	6,1	1,8	0,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3,9	20,0	23,9	20,6	15,6	11,6	7,6	5,8	2,7	1,1
14	Faggeta termofila e basso montana	8,4	25,1	32,2	23,4	15,8	11,4	9,0	7,0	4,4	5,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,3	25,4	47,1	41,2	22,8	10,8	5,2	3,3	0,9	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	0,7	0,9	1,8	2,8	3,3	2,5	2,3	1,8	1,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,0	9,9	8,7	4,9	2,7	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,0	23,8	76,7	85,2	62,4	43,4	27,7	22,4	10,8	4,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,3	0,8	2,0	2,1	2,5	1,7	1,2	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	0,9	1,6	2,4	2,9	2,8	2,4	0,9	1,2
32	Robinieta-ailanteto	0,1	1,1	2,0	1,6	0,9	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,2	1,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	55,0	84,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	14,6	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,7	21,3	73,7	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,1	33,3	80,9	19,4	15,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	8,6	5,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	5,2	22,0	0,7	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	45,7	98,8	99,6	87,6	26,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	1,1	8,5	3,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,5	0,5	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	44,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	27,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	2,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	25,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	15,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	19,1
26	Querceto a roverella pioniero	20,3
27	Querceto a roverella tipico	167,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	126,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	15,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,7	1,3	9,0	13,4	7,1	7,5	5,2	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,7	6,6	4,7	5,9	8,5	0,8	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,1	2,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	7,8	15,6	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	6,6	8,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,6	2,3	4,8	4,3	2,3	1,4	1,2	1,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	1,5	8,3	6,1	2,5	1,8	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	3,4	28,5	64,4	18,4	9,9	32,1	10,2	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,0	4,3	16,8	20,6	26,7	47,8	9,6	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,7	4,1	7,3	0,5	0,6	1,8	0,3	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,3	7,2	16,6	9,6	5,2	2,9	1,8	0,6	0,1	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	8,8	10,0	5,4	1,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	2,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,6	1,2	1,1	1,1	1,5	2,0	2,4	3,5	12,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	1,5	1,9	3,5	3,1	4,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,7	5,2	6,1	3,4	1,3	0,7	0,4	0,5	0,4	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,5	4,8	5,2	3,6	2,6	1,4	0,5	0,2	0,5
27	Querceto a roverella tipico	2,1	8,5	24,4	31,2	26,0	20,9	20,0	16,9	10,4	6,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,9	13,5	28,9	24,1	18,3	15,5	11,7	7,1	4,0	2,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,9	2,0	4,4	3,5	2,3	1,1	0,7	0,3	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	3,0	29,9	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,1	8,6	14,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	2,5	18,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	2,7	10,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	3,0	13,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	6,3	13,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,6	52,8	68,6	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,8	65,0	57,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	6,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	38,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	286,1
11	Cerreta mesoxerofila	167,3
12	Faggeta altomontana rupestre	56,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	400,4
14	Faggeta termofila e basso montana	143,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	63,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	14,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	93,7
26	Querceto a roverella pioniero	6,7
27	Querceto a roverella tipico	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	23,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	107,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	0,3	1,0	2,6	1,5	0,2	0,3	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,4	4,1	8,6	11,5	5,4	3,8	2,4	1,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	72,4	85,2	26,2	6,3	10,9	24,0	27,0	34,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	27,0	33,6	24,0	15,6	17,7	14,1	15,8	19,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,6	4,5	29,3	17,1	2,9	1,5	0,2	0,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	20,1	81,0	174,8	83,7	23,3	6,3	3,6	7,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	27,7	37,7	21,9	21,3	11,2	5,6	5,4	13,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	9,5	15,5	11,2	8,9	4,9	2,8	5,0	5,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	9,0	2,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	2,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,6	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	15,4	14,9	14,5	9,8	6,4	9,5	11,8	11,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	1,5	3,0	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,8	3,4	4,0	6,3	8,2	1,0	0,1	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	24,9	36,2	10,0	1,7	1,0	2,3	14,9	16,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	1,3	2,1	1,7	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,6	4,6	9,2	10,7	8,1	3,7	1,3	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	6,6	45,8	76,1	62,8	40,9	25,3	15,3	8,7	3,3	1,3
11	Cerreta mesoxerofila	4,2	26,8	46,5	39,5	23,9	13,2	6,5	3,9	2,2	0,6
12	Faggeta altomontana rupestre	2,2	11,1	13,4	8,5	6,9	4,5	3,1	2,6	1,7	2,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,1	56,3	118,2	97,3	61,3	33,1	16,6	7,5	2,4	1,6
14	Faggeta termofila e basso montana	4,6	17,9	44,0	36,8	20,4	11,6	5,1	2,3	0,8	0,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,3	15,1	19,1	13,5	8,2	3,6	1,6	0,6	0,3	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,0	7,2	4,2	1,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,4	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,3	22,1	29,0	20,9	9,8	4,0	1,4	0,3	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,7	1,7	1,5	1,3	0,7	0,4	0,3	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	3,4	6,0	6,7	4,5	1,8	0,8	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	23,3	42,5	23,6	8,5	4,0	2,6	1,2	0,9	0,6	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	1,1	127,9	131,8	23,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	61,5	66,0	35,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	35,3	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	255,9	121,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	20,9	37,2	44,3	27,7	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	3,5	25,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	6,5	56,2	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	1,5	3,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	12,1	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	35,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	9,7
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	21,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	157,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	14,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	64,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	5,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	0,2	0,1	1,1	2,4	4,4	1,1	0,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,7	2,8	3,6	5,1	1,0	0,7	1,5	3,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,0	23,2	19,4	22,5	15,1	9,1	6,8	29,4	30,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,6	2,7	3,8	2,2	0,2	0,5	1,6	1,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	14,8	5,8	1,2	0,5	0,9	5,5	21,2	14,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,8	0,6	0,3	0,4	0,8	0,5	1,3	0,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,4	0,4	0,7	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,4	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,2	0,6	1,1	1,4	2,2	2,1	1,6	0,4	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8	3,2	4,4	5,2	4,5	2,4	0,5	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	120,2	23,3	7,7	3,8	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,9	3,4	3,9	2,8	1,4	1,4	0,5	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,8	13,8	18,2	13,0	8,5	5,1	2,3	0,7	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,7	1,3	1,7	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	9,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	14,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	58,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,4
26	Querceto a roverella pioniero	14,3
27	Querceto a roverella tipico	4,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,9	1,1	1,1	1,6	1,6	0,3	0,0	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,9	8,0	7,3	4,7	4,5	2,2	1,2	2,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,4	2,8	5,5	2,7	2,7	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,6	2,4	1,1	0,4	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,6	1,6	1,0	0,1	0,9	1,1	0,2	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,5	1,2	1,3	1,6	1,4	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	28,3	2,9	1,8	1,0	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,0	1,9	2,6	2,9	2,2	1,9	0,7	0,2	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,5	1,6	1,4	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	1,0	1,1	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,2	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	15,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	17,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	76,6
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	177,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	116,7
26	Querceto a roverella pioniero	6,3
27	Querceto a roverella tipico	36,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	172,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	54,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,0	1,1	3,9	2,0	4,5	0,9	0,8	0,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	9,0	2,9	0,3	1,3	2,7	0,2	0,0	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	13,3	11,1	9,5	11,9	14,7	4,9	3,0	8,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	31,8	26,4	23,6	28,1	16,0	8,0	14,1	29,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,5	15,4	12,0	20,2	19,4	9,1	6,0	15,3	18,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	1,6	0,7	1,7	1,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,2	1,9	13,8	13,5	0,3	0,0	0,2	5,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	9,2	8,2	8,9	17,8	19,2	8,4	60,7	39,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,4	0,2	0,1	1,4	1,7	0,1	0,1	0,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	5,4	4,2	9,9	9,2	6,1	3,6	6,8	9,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,0	2,0	3,9	3,6	2,6	1,7	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,4	2,9	4,3	4,5	3,2	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,4	3,1	9,1	17,8	20,7	15,5	6,9	2,4	0,5	0,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,8	32,3	51,6	41,8	24,4	11,2	5,1	2,0	0,9	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	20,8	28,7	25,3	18,0	11,3	6,7	3,2	1,6	0,6	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	0,9	1,5	1,8	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,3	2,6	5,9	7,6	7,9	6,3	3,4	1,3	0,5	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,0	19,7	33,1	34,4	27,3	20,2	13,1	8,6	5,8	3,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,5	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,7	6,8	9,8	10,8	10,1	6,9	3,9	2,0	0,9	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,2	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	16,2	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	33,7	137,9	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	36,3	78,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	28,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,1	158,7	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	43,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	30,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,3
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	105,7
16	Lecceta costiera termofila	7,7
17	Lecceta mesoxerofila	1,3
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	220,3
26	Querceto a roverella pioniero	1,3
27	Querceto a roverella tipico	47,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	94,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	15,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	84,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	5,7	10,4	3,7	3,7	2,1	1,0	1,3	2,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	3,8	4,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,6	20,9	20,6	15,1	7,5	5,1	13,9	8,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	1,5	2,8	0,2	0,5	0,1	0,0	0,4	2,2
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,0	31,5	19,8	26,2	25,2	12,4	10,1	38,8	55,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,4	9,8	4,0	2,8	3,6	5,8	3,5	9,6	8,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	8,8	3,2	2,8	2,2	2,7	8,9	37,6	28,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,5	10,7	0,3	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,3	12,9	13,9	7,3	7,1	3,9	4,0	18,6	16,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,4	2,9	4,5	5,2	5,5	4,9	3,2	2,0	1,1	0,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,4	0,7	1,2	1,3	1,3	1,0	1,0	0,6	0,5	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,7	15,0	19,2	18,5	16,2	12,6	7,8	4,0	1,8	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,4	0,8	1,0	1,3	1,3	1,2	0,9	0,4	0,2	0,1
17	Lecceta mesoxerofila	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	56,4	29,0	29,2	29,3	26,7	19,9	14,2	9,0	4,1	2,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	3,2	3,0	4,8	6,9	7,8	8,4	6,0	4,1	2,8	0,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,4	5,9	9,7	12,9	15,8	15,9	13,4	9,7	5,5	3,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,2	2,8	2,6	2,4	2,3	1,5	1,1	0,8	0,4	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	11,2	9,1	11,8	12,9	13,8	10,4	7,7	4,7	1,9	0,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	144,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,9	0,5	1,4	0,4	0,1	0,1	0,4	1,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,4	0,2	0,1	0,2	1,3	0,2	0,1	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	24,9	14,6	15,1	20,7	10,0	4,9	18,6	35,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,9	0,6	0,3	0,1	0,0	0,2	1,5	2,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,8	0,2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	119,7	16,5	4,9	2,4	1,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	1,7	1,6	1,8	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,8	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	6,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	611,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	60,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	763,2
11	Cerreta mesoxerofila	82,3
12	Faggeta altomontana rupestre	190,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1773,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1496,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	241,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	1,8
19	Mugheta appenninica	1,4
20	Orno-ostrieto pioniero	42,6
21	Ostrieto mesofilo	72,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	22,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	126,6
26	Querceto a roverella pioniero	22,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	77,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	161,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	87,6
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,6	0,3	0,2	2,3	2,6	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,3	6,4	52,3	207,3	183,8	124,3	31,4	2,5	3,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	5,3	1,1	2,3	4,6	5,9	21,2	14,1	5,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,3	133,2	55,3	87,5	69,7	23,1	65,8	168,4	159,9
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	8,6	6,3	2,7	6,6	5,7	9,5	26,9	15,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	4,8	37,3	81,2	25,5	18,1	13,0	4,9	5,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,7	182,1	245,9	522,0	195,3	101,6	127,3	156,3	241,7
14	Faggeta termofila e basso montana	1,1	261,0	184,1	103,1	39,5	43,7	161,7	355,3	346,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	35,7	23,4	7,5	4,3	7,3	36,8	66,6	59,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,8	0,1	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	2,6	11,0	23,2	5,1	0,7	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,7	20,0	44,8	6,2	0,4	0,1	0,3	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	1,1	10,4	9,7	1,1	0,4	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	26,4	16,8	10,1	5,6	1,8	7,3	24,3	34,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,0	0,7	5,7	4,6	3,0	1,2	3,1	3,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	9,7	5,4	9,1	18,0	5,7	3,6	12,2	13,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	11,3	3,5	22,6	46,2	2,3	15,5	37,2	22,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	13,7	20,6	17,0	13,7	5,3	3,7	5,3	8,2
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	0,8	0,7	0,7	1,4	0,8	0,9	0,3	0,1	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	7,5	24,3	68,5	136,9	141,8	109,8	65,0	41,7	12,8	3,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,2	29,2	16,7	6,2	2,6	1,1	0,6	0,4	0,4	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	0,6	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	34,3	254,5	235,3	121,7	60,9	29,2	15,7	6,6	2,2	2,8
11	Cerreta mesoxerofila	3,4	24,7	24,0	16,5	8,6	2,9	1,7	0,4	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	2,4	6,8	13,4	14,6	15,5	24,0	28,0	29,6	22,1	34,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	30,1	257,1	375,2	305,0	249,5	205,6	158,8	106,2	50,0	35,5
14	Faggeta termofila e basso montana	52,2	301,8	434,3	333,7	184,1	95,5	48,4	25,0	12,8	8,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,3	75,6	92,8	44,0	12,9	4,1	1,7	0,8	0,7	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	2,0	10,2	11,6	6,4	4,3	3,6	2,3	2,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,2	0,8	3,5	7,2	9,8	13,9	13,2	12,0	12,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,6	5,2	6,7	5,2	3,1	1,6	0,4	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	13,8	40,9	33,6	18,8	9,5	5,2	2,5	1,5	0,5	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	2,4	4,1	2,0	1,7	3,2	4,2	3,2	1,7	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,8	9,9	13,4	12,7	14,1	11,6	7,4	3,5	1,7	1,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	4,2	24,4	36,0	25,0	19,4	18,4	14,7	11,1	5,6	2,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	5,8	21,7	13,5	14,5	12,9	10,3	5,1	2,1	1,2	0,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	27,7	61,1	96,3	232,3	171,3	19,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	8,8	1,5	47,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	413,9	262,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	42,1	28,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	28,2	56,5	53,2	42,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	370,4	914,8	406,2	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	194,9	804,6	480,7	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	26,9	56,8	51,4	86,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	2,8	3,6	18,2	17,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	36,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	12,1	6,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	26,6	27,4	66,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	16,0	3,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	40,7	33,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	34,7	53,7	72,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	42,0	15,5	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	16,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	53,2
11	Cerreta mesoxerofila	323,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	202,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	2,6
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	41,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	99,8
26	Querceto a roverella pioniero	165,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	448,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	57,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	1,0	2,7	2,2	2,6	5,7	1,9	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	37,2	8,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	7,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	73,1	15,7	7,4	16,0	19,8	28,5	72,9	90,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	23,5	15,4	22,1	20,2	15,8	25,8	49,3	29,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,6	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	3,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	8,2	4,6	1,0	0,1	0,0	1,4	8,0	18,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	14,9	14,3	13,2	8,5	11,1	7,5	9,5	20,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	17,7	14,6	33,9	37,3	13,6	16,4	13,5	18,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	61,1	38,9	50,7	47,4	41,6	66,2	82,5	59,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	6,2	11,1	15,2	4,2	1,4	3,6	6,9	8,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,8	3,5	3,4	3,2	1,8	1,3	0,8	0,5	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	2,5	14,0	16,7	12,0	5,8	1,3	0,8	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	16,8	25,5	67,1	71,5	53,8	36,4	27,1	15,7	7,3	2,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,5	49,7	68,1	41,5	20,6	7,2	2,6	0,8	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	0,7	4,5	9,5	7,8	5,5	4,3	3,9	2,9	2,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	46,8	20,5	14,7	7,5	4,8	3,1	1,5	0,6	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	5,5	29,7	51,7	39,8	21,3	9,3	4,1	2,0	1,1	0,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	10,8	53,8	104,6	111,0	82,7	48,4	23,7	8,1	3,8	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,0	12,9	14,4	11,7	7,6	4,4	2,1	1,0	0,3	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	9,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	46,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	14,1	134,2	152,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,4	135,9	55,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	35,9	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,2	89,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	87,3	74,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	178,5	252,2	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	47,5	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	13,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	21,6
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	24,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	9,6
14	Faggeta termofila e basso montana	59,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	63,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,5
19	Mugheta appenninica	26,0
20	Orno-ostrieto pioniero	37,7
21	Ostrieto mesofilo	26,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	155,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	48,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	20,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	237,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,4	2,1	3,7	4,5	1,1	0,1	0,0	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,7	3,6	5,7	1,1	1,4	4,0	1,6	1,5
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	4,0	8,6	6,0	0,9	0,1	0,1	1,2	3,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,2	6,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	15,6	18,8	9,9	2,4	0,0	0,0	3,4	9,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	10,6	10,2	13,3	11,7	4,0	3,9	4,1	6,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	5,1	1,5	1,6	1,1	0,6	0,3	2,4	13,6
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	6,5	12,4	15,5	2,3	0,0	0,0	0,0	1,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	1,3	7,1	16,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	22,7	43,4	46,6	18,8	8,7	2,4	2,7	10,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,3	11,8	6,4	4,9	7,1	7,9	1,8	1,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	8,2	11,2	0,4	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	36,9	46,7	51,2	31,7	25,4	19,1	5,9	20,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	1,9	4,6	4,0	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	1,2	3,2	5,6	4,4	2,8	1,6	1,2	0,8	0,7
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,3	0,7	0,6	1,7	3,3	4,1	4,3	8,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,1	2,7	1,3	0,7	0,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,5	1,4	3,7	8,3	11,7	12,2	9,1	12,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8	7,6	19,1	20,1	10,1	3,5	1,7	0,6	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,1	0,3	0,6	1,2	3,3	5,2	4,9	4,3	3,3	2,9
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,9	5,1	8,4	6,6	3,6	2,6	2,5	3,0	5,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,8	1,4	3,5	4,6	5,8	4,8	5,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,7	4,3	17,1	17,3	13,6	10,5	11,1	13,3	13,5	54,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,9	13,3	12,8	7,8	4,2	2,0	1,3	0,8	0,4	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,4	1,6	6,3	6,4	2,8	1,8	0,6	0,4	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,4	28,8	59,3	61,1	40,0	22,6	11,5	6,7	3,0	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,2	8,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	3,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	1,1	3,4	7,5	6,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	6,2	19,2	16,3	16,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	28,4	28,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	18,0	1,4	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	16,0	4,8	5,9	6,3	4,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	7,0	14,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	16,0	16,0	29,6	12,6	35,7	37,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	36,6	10,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	10,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	101,2	112,3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	13,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	26,1
11	Cerreta mesoxerofila	62,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	109,5
16	Lecceta costiera termofila	4,1
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	2,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	33,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	5,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	47,4
26	Querceto a roverella pioniero	8,4
27	Querceto a roverella tipico	78,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	190,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,0	3,7	3,4	1,1	1,5	0,5	0,0	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	7,4	3,0	0,3	0,2	0,9	4,7	5,2	4,3
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	19,8	18,7	6,1	0,2	0,0	0,7	4,4	12,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,5	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	23,3	26,6	18,6	11,5	11,3	2,2	3,9	12,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5	0,7	0,5	0,8	0,4
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,2	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	5,5	2,6	13,2	6,2	1,4	0,2	0,8	4,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,5	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	10,6	10,5	8,7	4,5	1,0	1,6	4,0	6,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,2	2,2	1,2	1,0	0,4	0,1	0,0	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	14,1	11,1	12,5	16,7	4,5	1,0	4,4	13,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	44,9	49,0	35,7	16,1	8,3	2,8	12,2	21,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,3	2,7	5,5	3,7	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	1,4	4,9	7,7	7,0	3,5	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,9	9,0	18,0	15,1	10,2	5,1	2,4	1,1	0,5	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,3	23,0	35,4	27,5	13,5	2,6	0,6	0,3	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,5	0,7	0,6	0,4	0,7
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	1,3	7,0	7,2	4,6	2,9	2,7	2,2	1,7	4,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	1,1	1,8	0,9	0,5	0,2	0,3	0,3	0,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	11,1	11,3	11,2	8,2	3,8	1,1	0,4	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	2,1	3,2	1,8	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,5	7,1	14,0	18,7	16,3	9,9	5,3	2,3	1,1	2,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,6	24,7	46,3	50,6	34,9	16,1	7,5	1,8	0,8	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,8	4,7	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	22,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	10,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,6	64,2	40,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,7	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	6,3	16,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,1	2,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	11,9	14,2	17,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	3,3	4,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	20,8	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,1	40,4	119,5	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	92,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	58,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	26,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	117,6
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	227,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1033,4
14	Faggeta termofila e basso montana	235,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	206,7
16	Lecceta costiera termofila	1,6
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	1,0
19	Mugheta appenninica	548,8
20	Orno-ostrieto pioniero	15,7
21	Ostrieto mesofilo	198,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	173,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	65,5
26	Querceto a roverella pioniero	1,2
27	Querceto a roverella tipico	1,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	112,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	9,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	24,3
32	Robinieta-aillanteto	3,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,4	3,2	16,1	25,2	35,1	12,1	0,2	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	5,0	9,6	15,6	20,2	7,0	0,3	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,2	4,6	4,8	3,9	7,4	1,7	0,2	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	14,0	19,1	23,4	21,6	19,0	7,3	4,0	9,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	30,0	27,5	35,5	48,1	46,0	13,3	10,0	16,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	316,5	234,8	113,3	79,6	79,2	29,2	23,9	157,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	37,6	46,1	52,8	45,5	33,6	10,3	1,4	7,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	53,8	57,1	43,1	11,5	9,5	6,6	5,4	19,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,1	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	88,4	95,7	104,5	78,4	67,2	15,6	33,1	66,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,8	1,7	5,6	3,7	2,1	1,7	0,0	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	27,4	36,6	49,6	28,8	7,5	4,8	12,1	32,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	32,4	60,7	58,0	6,7	4,2	2,4	1,6	7,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	11,1	21,0	11,9	7,3	5,9	5,1	1,7	1,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	18,5	16,0	23,1	12,1	10,4	13,1	7,4	11,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,0	3,1	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,4	1,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,8	6,2	8,8	2,7	2,4	2,3	0,0	0,0
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,7	1,7	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,3	0,5	0,5	1,4	6,6	15,5	20,5	19,4	13,1	14,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	0,7	4,0	7,0	7,6	9,6	11,0	9,1	5,3	3,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,7	3,1	9,1	7,5	4,5	0,9	0,3	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,7	6,4	17,8	32,0	30,5	18,1	7,5	2,8	1,3	0,6
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	0,6	2,3	6,8	19,4	31,6	37,9	38,4	89,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2,4	8,7	21,0	48,0	110,0	195,5	224,4	192,5	125,1	105,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,4	2,7	11,1	22,6	28,0	32,2	38,2	32,1	26,5	41,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,7	20,1	63,3	67,6	37,1	11,3	3,4	1,2	0,7	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,1	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
19	Mugheta appenninica	1,9	6,2	9,5	17,4	50,8	117,2	131,3	116,6	61,6	36,4
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	2,3	2,1	2,6	2,6	4,8
21	Ostrieto mesofilo	0,3	1,0	2,8	6,7	12,4	24,2	29,0	31,1	24,3	67,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,6	2,5	5,8	9,3	13,0	21,5	31,5	30,3	25,1	33,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,0	13,4	19,6	16,2	8,1	3,1	0,7	0,3	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,2	10,5	29,9	31,8	21,2	10,1	4,6	1,9	0,9	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,3	2,6	3,8	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,7	1,3	0,3	0,3	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,3	3,3	4,5	4,5	4,1	2,9	1,4	1,3	1,9
32	Robinetto-aillanteto	0,0	0,4	1,2	1,2	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	2,2	24,4	39,2	26,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	36,8	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	14,1	12,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	28,6	69,7	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	3,8	20,1	37,9	89,3	55,3	16,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	3,3	55,3	213,0	255,9	282,0	195,1	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	8,1	81,3	59,3	65,0	14,2	5,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	54,8	103,5	29,6	12,4	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	84,4	273,2	169,3	16,3	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	4,1	4,7	6,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	29,1	101,0	46,2	21,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,8	39,0	100,3	26,6	4,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	19,1	31,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	9,4	91,7	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	7,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	2,1	8,8	9,8	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,7	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	12,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	51,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,2	3,1	0,9	0,0	0,0	0,6	1,9	2,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,9	2,2	1,2	0,2	0,0	0,4	2,6	1,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	10,2	10,8	5,6	0,2	0,1	1,6	10,7	11,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	1,2	1,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	3,8	3,7	2,2	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,8	2,7	1,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,9	8,2	13,6	11,9	7,7	3,3	1,1	0,3	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	1,5	0,8	0,6	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	34,8	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	24,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	72,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	14,2
26	Querceto a roverella pioniero	15,1
27	Querceto a roverella tipico	31,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	122,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	4,1	7,6	6,0	0,0	0,0	0,9	2,9	3,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,2	11,8	7,9	0,1	0,4	8,3	21,6	16,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6	1,6	1,0	1,4	1,3	0,2	0,9	4,5	2,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,8	0,9	0,2	0,0	0,3	2,7	5,3	3,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,7	0,6	0,1	0,1	0,5	7,5	16,5	5,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	14,7	29,4	12,9	1,1	2,2	10,2	32,6	19,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,3	1,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,5	7,9	9,3	4,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,6	10,9	22,8	20,9	10,5	4,0	0,8	0,2	0,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,2	2,4	2,3	1,8	1,9	0,9	0,4	0,1	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	3,9	6,7	3,1	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,9	3,4	5,6	6,2	6,3	4,3	3,1	1,6	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,0	8,6	24,5	30,4	22,8	14,4	9,6	5,6	2,9	2,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,1	0,6	1,0	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,2	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	47,2	23,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	9,5	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	3,2	20,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	31,2	84,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	21,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	11,9
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	184,2
11	Cerreta mesoxerofila	321,0
12	Faggeta altomontana rupestre	98,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	574,7
14	Faggeta termofila e basso montana	189,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	62,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	11,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	131,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	40,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	29,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,8	0,9	0,4	1,2	0,0	0,0	0,1	1,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,4	0,5	1,5	4,6	3,1	3,2	4,3	3,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5,6	5,0	1,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	46,2	54,3	47,7	15,3	1,7	0,5	3,4	15,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	26,6	66,7	81,5	71,2	44,2	22,4	5,1	3,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	4,2	9,1	23,2	21,0	19,0	6,9	9,3	6,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	127,1	48,7	35,9	29,5	15,7	24,6	121,3	171,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	55,0	36,2	25,2	23,4	9,7	5,3	6,7	28,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,2	11,1	14,4	15,2	9,6	4,2	0,5	1,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,3	0,8	0,8	2,1	2,4	2,7	0,8	0,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	17,0	19,0	25,2	27,6	21,6	11,9	2,7	6,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	1,5	13,1	13,6	7,7	3,5	1,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	5,3	3,9	2,7	9,3	4,2	1,0	0,8	1,9
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	0,3	1,2	1,6	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,7	7,3	4,6	3,5	2,7	1,4	0,6	0,4	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	1,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	0,6	0,8	1,5	1,9	2,6	2,3	1,3	0,5
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	3,6	40,7	63,9	42,6	21,0	8,1	3,2	0,9	0,2	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	3,6	44,8	100,7	79,5	47,3	25,6	12,4	4,9	1,9	0,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,4	3,8	6,6	7,3	7,5	11,5	14,3	15,1	13,1	19,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	13,1	127,8	185,7	107,0	56,7	33,8	22,1	15,5	7,2	5,6
14	Faggeta termofila e basso montana	3,9	38,1	65,6	43,2	15,9	7,1	4,8	4,2	3,0	3,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	14,2	19,6	12,4	7,6	4,2	2,2	1,0	0,3	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,9	2,5	3,2	1,8	1,5	0,8	0,5	0,1	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,6	26,1	37,2	26,4	16,6	8,8	4,1	1,1	0,3	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,2	8,7	12,6	7,7	4,6	2,2	1,1	0,4	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,9	2,3	3,6	4,6	4,6	4,3	4,3	2,9	1,2	0,5
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	1,0	7,3	1,2	9,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	8,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	103,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	102,6	112,5	89,1	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	66,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	358,4	178,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	87,6	83,6	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	7,6	19,2	22,9	10,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,9	7,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	26,6	57,4	32,1	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	18,2	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	20,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	4,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	43,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	27,7
26	Querceto a roverella pioniero	3,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	17,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	13,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,5	2,4	1,7	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,2	4,2	0,7	1,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,8	2,6	3,6	23,6	10,9	0,7	0,0	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,6	4,2	5,2	5,6	3,0	0,7	1,4	3,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,4	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,6	1,8	2,7	3,0	5,0	1,8	0,5	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,6	1,3	1,3	4,0	4,5	1,0	0,0	0,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	1,1	0,9	1,0	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,1	0,9	1,7	1,6	1,1	0,4	0,2	0,2	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,3	4,0	6,3	10,9	11,1	5,6	2,2	1,2	0,3	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,2	8,4	4,2	2,7	1,6	1,2	0,6	0,4	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	2,7	3,3	3,0	3,6	2,1	1,3	0,4	0,2	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,5	1,6	2,1	2,6	2,3	1,6	1,4	0,6	0,3	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	19,9	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	21,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,6	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	6,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	68,6
26	Querceto a roverella pioniero	3,3
27	Querceto a roverella tipico	9,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	20,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,5	0,9	0,4	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,7	3,4	1,1	0,4	1,9	1,6	2,4	4,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	9,3	13,3	10,9	6,6	3,9	5,6	10,9	8,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,5	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	2,0	3,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	4,4	8,5	3,9	1,1	0,6	0,4	0,3	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,0	3,6	5,6	3,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	45,1	12,3	6,0	3,3	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,6	0,9	1,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,2	2,0	3,7	2,2	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	13,6	2,6	2,0	1,4	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	16,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	7,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	57,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	23,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	13,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	2,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	567,8
14	Faggeta termofila e basso montana	126,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	142,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	57,3
21	Ostrieto mesofilo	52,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	348,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	5,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	122,3
26	Querceto a roverella pioniero	4,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	54,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	91,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	141,9
32	Robinieta-ailanteto	18,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	8,8	10,1	10,0	1,7	1,7	5,4	9,3	10,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	3,2	13,7	5,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	1,2	0,3	0,6	0,3	0,4	3,3	3,9	3,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,9	1,3	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	160,9	188,7	65,4	11,8	4,2	1,6	50,0	85,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	27,4	30,1	19,2	4,4	0,5	2,4	10,4	32,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	32,6	42,1	24,1	5,6	0,4	0,5	6,5	30,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	12,7	17,0	10,5	2,7	0,4	0,9	3,2	9,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	5,6	5,2	11,4	8,1	0,7	0,3	10,3	11,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	66,9	115,8	59,7	28,6	2,8	3,5	27,1	43,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,8	1,7	1,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,5
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	33,6	25,0	12,7	4,6	0,4	2,2	11,6	32,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	1,0	2,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	9,5	12,1	6,1	0,9	0,2	1,0	10,2	14,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	13,4	26,4	4,4	4,0	0,5	1,2	18,6	22,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	39,0	21,6	21,4	16,0	2,7	4,5	10,0	26,4
32	Robinieta-aillanteto	0,0	4,9	5,2	4,4	0,9	0,1	0,0	0,7	2,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,5	10,3	11,2	9,2	6,8	6,4	4,7	2,8	1,2	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	1,6	4,4	6,5	4,9	3,7	1,3	0,3	0,2	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,1	5,2	4,1	1,5	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,8	1,0	0,7	0,8	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,3	0,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3,9	39,0	77,8	97,1	91,2	85,7	66,4	49,0	30,7	27,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1,1	5,3	11,5	16,6	22,4	21,5	20,3	13,5	8,2	6,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	14,1	19,4	38,8	35,6	19,8	9,2	3,5	1,2	0,4	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,7	10,3	13,0	12,7	8,4	5,3	2,5	1,3	0,5	0,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,7	2,6	4,0	6,5	8,2	9,3	8,9	6,1	6,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	6,9	26,1	48,8	67,1	64,3	54,6	39,4	23,9	11,6	5,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,6	1,2	1,2	1,0	0,6	0,5	0,3	0,3	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,8	21,8	22,4	20,6	16,8	11,3	7,4	4,9	2,3	1,9
26	Querceto a roverella pioniero	1,4	1,0	1,2	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	12,6	8,9	7,8	9,2	6,8	4,6	3,0	1,0	0,5	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,9	3,5	8,6	12,5	12,5	15,9	15,7	9,3	6,3	3,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	10,3	19,9	24,1	22,9	19,9	15,4	11,8	8,1	5,0	4,5
32	Robinetto-aillanteto	0,4	2,8	6,2	4,5	2,6	1,3	0,4	0,3	0,2	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	31,3	21,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	16,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	144,8	243,3	148,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	16,3	70,3	30,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	44,2	12,8	39,7	40,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	2,6	43,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	18,4	14,2	10,6	9,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	5,2	110,9	182,6	45,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	33,7	33,1	31,0	22,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	25,4	7,8	20,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	2,2	61,4	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	13,3	107,1	21,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	2,8	10,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	49,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	209,6
11	Cerreta mesoxerofila	94,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	39,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	3,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	38,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	44,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	5,9	13,7	14,7	11,2	3,3	0,5	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	1,3	0,8	1,8	0,6	0,5	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	38,8	51,8	58,0	30,1	3,2	0,6	4,7	22,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	5,0	12,1	18,3	20,1	22,1	13,1	1,4	2,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,2	7,3	17,6	8,1	0,9	0,1	0,0	1,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,8	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,4	8,7	10,2	7,1	4,6	2,0	0,6	1,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,6	8,6	16,8	11,0	3,8	1,2	0,0	0,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,5	11,5	16,3	11,4	6,1	2,2	0,5	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6	1,4	2,3	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	4,7	40,7	59,7	51,6	31,9	13,4	5,4	1,3	0,5	0,3
11	Cerreta mesoxerofila	1,0	10,8	28,8	28,3	15,8	6,1	2,5	0,9	0,1	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,7	8,8	15,4	9,3	3,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,3	0,9	1,4	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,2	7,1	10,7	8,9	5,7	2,8	1,3	0,4	0,2	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8	6,4	13,6	12,8	6,9	2,9	0,8	0,2	0,1	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	28,4	21,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	4,3	41,8	136,9	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,1	69,2	24,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	4,1	30,9	1,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	1,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	12,0	17,7	7,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	2,8	36,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	51,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	4,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	249,1
14	Faggeta termofila e basso montana	14,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	161,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,3
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3
21	Ostrieto mesofilo	7,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	47,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	100,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	68,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	48,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	365,3
32	Robinieta-aillanteto	40,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	9,5	22,0	9,7	2,1	1,2	1,4	1,6	3,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	2,8	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,2	1,2	1,8	0,1	0,0	0,1	1,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	67,3	48,4	69,7	22,2	0,3	0,1	0,9	40,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	2,3	5,7	2,7	1,0	0,0	0,0	0,3	2,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	29,1	28,6	40,2	13,4	0,8	5,4	17,6	25,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	1,6	5,0	0,7	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	8,6	18,1	12,1	3,5	0,5	0,2	1,4	2,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	16,3	12,7	17,2	6,4	2,3	4,1	17,5	24,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	13,7	16,2	12,0	1,6	0,4	2,4	11,8	10,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	12,9	19,2	8,5	2,4	0,6	0,2	1,1	3,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	63,3	89,7	85,2	52,0	19,5	6,2	12,9	36,4
32	Robinieta-aillanteto	0,1	8,9	10,7	7,3	3,4	0,3	0,4	2,7	6,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,4	14,0	11,7	7,6	4,4	3,8	2,5	1,3	0,3	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	0,9	1,3	1,1	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,3	0,8	0,7	0,8	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,5	3,2	8,5	19,3	34,9	53,0	56,1	41,9	21,5	10,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,8	1,8	2,3	2,4	2,7	2,3	1,3	0,6	0,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,5	43,1	45,5	29,3	14,5	7,1	2,7	1,0	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	1,1	1,7	1,7	1,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,7	3,4	7,2	10,2	11,2	7,7	3,8	1,7	0,6	0,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,5	26,2	18,2	13,3	9,4	7,2	4,1	2,6	1,3	0,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	11,5	11,3	12,6	11,8	10,3	6,6	2,9	1,2	0,5	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,5	3,8	4,0	5,3	7,7	10,4	7,5	5,6	1,9	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	17,2	55,2	53,7	54,4	50,9	47,0	36,9	26,2	14,2	9,5
32	Robiniato-ailanteto	5,5	10,3	8,7	6,8	4,7	2,5	1,2	0,4	0,3	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	6,7	10,7	27,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	1,4	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,9	48,8	93,1	73,6	28,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,8	6,4	5,8	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	88,1	66,3	5,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	16,9	29,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	56,9	37,7	5,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	32,9	29,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	12,7	20,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,2	107,8	234,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	29,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	13,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	61,2
26	Querceto a roverella pioniero	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	55,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	21,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,5	0,6	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,3	0,5	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,5	0,1	1,3	2,1	4,1	2,3	0,7	2,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	8,7	7,2	5,6	4,9	4,8	5,3	10,7	14,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	9,4	1,5	0,4	1,3	3,3	3,6	13,3	22,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	7,4	2,2	1,3	0,5	0,0	0,1	2,1	7,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,1	0,9	0,4	0,4	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,5	1,8	3,1	3,2	2,3	1,1	0,6	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,3	15,3	12,5	9,7	7,2	4,1	1,9	1,0	0,2	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	2,9	6,6	8,6	10,4	10,0	8,4	4,4	2,4	1,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,8	2,8	4,0	3,5	3,1	2,3	1,8	1,3	0,6	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	57,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	50,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	19,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	32,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	67,4
16	Lecceta costiera termofila	29,3
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	139,9
26	Querceto a roverella pioniero	10,1
27	Querceto a roverella tipico	93,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	93,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	19,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,2	2,7	5,0	12,8	9,4	0,8	0,1	0,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	10,3	9,6	8,5	23,6	6,7	0,3	1,0	7,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	4,9	0,4	0,4	1,2	1,1	0,1	4,3	17,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	23,3	12,8	20,0	24,3	9,7	3,7	12,5	33,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,9	5,1	2,7	0,8	0,2	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	24,2	13,2	4,5	4,4	9,1	4,2	5,7	28,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	13,0	1,3	6,4	6,3	1,7	1,3	20,3	43,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,8	2,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	4,7	2,2	1,5	1,5	1,0	0,4	1,6	6,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,9	2,2	4,0	3,9	4,6	4,9	4,1	2,8	1,7	1,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,0	6,7	12,4	12,0	11,1	9,3	7,1	3,7	1,5	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,9	2,4	2,8	3,3	4,6	4,8	4,5	3,0	1,7	1,3
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,5	19,4	20,3	23,3	21,0	17,4	11,6	7,8	4,2	2,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	0,3	0,6	1,4	1,9	2,8	1,7	0,7	0,4	0,1
27	Querceto a roverella tipico	2,8	8,8	13,9	14,4	14,0	12,4	10,6	8,3	4,8	3,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,4	8,8	12,4	14,6	15,8	14,0	11,6	7,2	4,1	2,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,8	2,1	3,6	3,7	3,3	2,6	2,0	1,0	0,3	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	139,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	92,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	11,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	42,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	112,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	31,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	101,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	61,0
26	Querceto a roverella pioniero	31,9
27	Querceto a roverella tipico	10,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	233,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	19,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,4	1,5	0,7	0,8	1,0	0,8	1,3	2,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,8	0,9	1,9	0,1	0,0	0,0	0,4	1,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,0	2,1	2,2	5,0	9,0	8,9	7,9	4,9
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	24,8	27,1	19,3	9,4	4,4	1,3	5,3	20,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,9	6,7	9,2	3,3	1,9	0,3	0,8	1,6	6,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	25,4	30,0	27,1	9,6	2,3	0,5	0,3	6,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	14,7	7,2	7,8	6,5	3,5	3,1	5,5	12,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	4,3	10,4	7,9	3,8	2,5	1,3	0,7	0,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	3,6	2,1	2,0	0,1	0,0	0,2	0,4	2,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,3	56,5	66,2	35,8	16,6	8,5	9,2	11,5	28,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	2,1	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	4,9	8,3	3,1	1,4	0,1	0,0	0,1	1,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,4	1,4	1,8	2,1	2,2	1,7	0,7	0,3	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,3	1,3	1,9	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,4	1,5	3,3	5,7	8,4	9,2	7,5	4,1	1,4	0,6
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,1	15,4	24,3	28,5	21,5	12,7	4,7	1,2	0,4	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	19,9	4,5	1,4	1,3	1,6	1,3	0,7	0,4	0,2	0,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,8	15,6	24,0	24,8	18,8	9,2	4,2	1,4	0,6	1,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,2	14,5	15,3	11,1	7,7	3,0	1,0	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	10,7	4,6	3,4	2,9	3,6	2,5	1,9	0,7	0,6	0,9
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,7	2,4	2,6	2,3	1,6	0,6	0,3	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	40,5	51,8	44,0	40,3	28,3	16,0	7,9	3,2	1,2	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,8	0,9	0,5	0,2	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,9	5,7	6,2	4,0	1,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,6	6,4	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,4	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	11,5	28,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	29,4	70,1	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	5,9	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	8,3	91,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	42,3	18,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	5,1	3,5	10,2	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	22,8	108,9	49,9	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	7,7	7,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	12,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,7
6	Boscaglia pioniera calanchiva	78,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	121,0
16	Lecceta costiera termofila	37,6
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	19,7
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	52,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	7,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	74,5
26	Querceto a roverella pioniero	45,3
27	Querceto a roverella tipico	45,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	273,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	9,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,4	0,9	1,5	0,5	0,9	0,4	3,6	2,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	18,1	16,6	11,4	7,3	7,7	2,9	5,3	8,7
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	22,5	16,6	18,7	18,3	9,2	5,6	14,7	15,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	1,0	5,2	15,8	7,9	3,3	2,6	1,1	0,8
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	4,8	11,1	3,6	0,2	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,4	5,0	18,8	15,0	3,4	1,4	2,9	3,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,8	2,4	3,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	13,5	14,2	15,0	8,9	3,2	2,1	6,1	11,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,4	4,6	13,6	13,7	7,5	3,8	1,5	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	3,4	7,5	10,4	9,2	8,0	2,7	3,3	1,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	38,8	55,3	53,9	22,0	16,5	13,6	34,7	38,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,1	3,2	1,2	0,7	0,4	0,7	0,1	0,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,3	0,6	2,9	4,3	3,1	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,7	6,4	22,9	28,3	14,7	4,1	0,8	0,1	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,8	17,8	41,3	34,6	16,1	4,9	1,2	0,2	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	1,3	3,1	3,5	5,8	7,7	7,5	5,3	2,2	1,2	0,1
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,0	0,2	0,3	1,4	3,5	5,5	5,3	2,6	0,7
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,0	3,5	7,3	7,4	9,1	9,9	7,7	4,4	1,6	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,3	1,3	2,0	1,5	1,1	0,6	0,3	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	48,6	11,9	7,5	4,1	1,3	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,7	3,7	9,5	11,7	8,4	5,8	3,7	1,1	0,4	0,2
27	Querceto a roverella tipico	2,8	4,1	6,8	10,6	9,0	6,3	3,5	1,4	0,9	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	16,4	33,2	54,2	54,5	45,0	33,5	19,4	10,6	5,0	1,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,3	2,8	4,0	1,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	5,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,3	47,1	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,4	104,3	11,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	14,6	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	1,1	14,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,9	24,0	25,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	49,8	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	5,6	32,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,7	30,2	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	38,4	140,4	94,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	8,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	124,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	5,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	86,1
11	Cerreta mesoxerofila	16,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	156,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,3
21	Ostrieto mesofilo	8,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	7,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	190,9
26	Querceto a roverella pioniero	85,3
27	Querceto a roverella tipico	112,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	281,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	4,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	11,7
32	Robinieta-aillanteto	0,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	11,1	27,3	41,0	24,1	8,3	2,4	5,1	4,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,0	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	9,9	14,4	10,7	5,4	0,5	1,5	17,2	26,6
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	3,6	5,3	2,6	1,3	0,1	0,5	2,2	0,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	31,3	9,5	7,3	1,6	0,5	6,1	39,4	61,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	0,8	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,2	1,0	0,4	0,0	0,0	0,1	1,7	3,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	35,7	24,9	17,2	11,0	4,6	7,8	39,7	49,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	11,4	17,8	24,0	16,8	7,8	2,5	1,2	3,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	20,2	18,5	24,5	25,7	12,6	1,3	2,5	7,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	69,7	46,6	26,8	8,2	4,3	6,4	34,5	84,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,6	1,0	0,5	0,8	0,7	0,6	0,1	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,9	7,3
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,6	7,0	28,1	36,3	28,8	15,2	5,2	2,4	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,3	0,8	1,8	1,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	3,6	15,5	27,0	23,1	12,4	3,7	0,7	0,2	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	1,3	3,4	3,2	3,4	2,6	1,6	0,6	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	13,8	41,4	49,7	30,7	13,6	5,0	1,2	0,2	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	0,4	0,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,6	1,3	2,1	1,9	1,5	0,8	0,4	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,5	1,5	1,8	2,0	1,0	0,4	0,2	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	25,8	33,2	44,4	39,3	25,5	13,0	5,5	2,1	1,0	1,1
26	Querceto a roverella pioniero	1,8	11,0	18,9	19,7	15,8	10,1	5,8	1,9	0,3	0,1
27	Querceto a roverella tipico	1,6	17,1	34,1	31,3	17,7	8,0	2,3	0,5	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,7	36,5	73,4	76,2	48,1	25,3	11,0	4,1	1,2	0,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	0,5	0,9	1,5	0,9	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,1	0,8	2,4	3,3	2,7	1,6	0,6	0,2
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	1,2	13,2	104,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,7	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	5,1	0,0	4,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,1	36,4	63,2	46,2	5,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,2	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	2,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	5,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	10,3	84,0	47,7	40,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,5	30,2	40,2	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	54,1	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	143,6	132,0	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	23,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	252,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	113,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	69,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	3,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	54,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	190,2
29	Rimboscimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboscimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,3
31	Rimboscimento di conifere nella fascia montana	18,8
32	Robinieta-aillanteto	7,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,6	1,6	0,1	0,0	0,2	4,0	12,5	4,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	45,2	15,5	3,7	0,8	1,9	27,2	81,8	75,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	14,9	32,5	24,8	1,0	0,3	1,1	17,4	21,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,3	3,7	2,9	0,1	0,0	3,1	37,5	16,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,0	0,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,4	4,1	1,1	0,1	0,1	3,0	23,1	17,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	27,7	39,8	9,3	4,3	6,3	20,1	56,9	25,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,4	2,3	0,0	0,0	1,1	3,1	1,8	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	9,2	6,2
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,5	1,2	2,8	2,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,2	6,6	8,9	5,5	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	5,9	45,7	70,7	57,4	34,6	18,6	8,6	4,3	2,7	3,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	2,6	7,3	13,6	22,3	25,3	20,3	12,4	6,5	2,9	0,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5	10,8	17,9	16,7	11,1	6,7	2,6	1,5	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,4	0,6	0,8	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,7	1,0	1,0	0,4	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,6	18,0	17,2	8,5	3,8	1,8	0,8	0,3	0,3	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,5	20,2	43,1	41,0	30,1	20,9	13,3	8,1	5,5	5,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	3,3	3,2	2,0	0,8	0,4	0,2	0,1	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	2,4	3,8	2,0	1,4	2,4	2,4	2,3	1,3	0,6
32	Robinieta-aillanteto	0,2	2,4	3,1	1,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	4,4	17,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,2	42,9	148,7	47,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	48,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	6,4	25,0	37,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	1,9	4,1	26,4	21,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	18,2	106,2	28,0	31,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	3,8	4,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	5,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,8	5,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	7,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	53,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	816,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	43,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	237,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	6,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	63,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	47,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	16,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,7	1,0	0,9	0,4	0,0	0,5	1,1	1,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	8,7	6,4	6,9	1,9	4,6	7,4	6,2	10,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	4,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	3,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	1,5	148,9	172,7	142,8	45,5	33,1	49,9	113,1	108,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	5,2	7,6	7,5	3,5	1,6	2,0	8,6	6,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	42,2	30,6	30,2	17,9	22,2	21,9	32,8	39,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	12,6	9,5	4,2	1,1	1,5	7,5	11,6	15,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	5,4	6,1	5,5	3,6	4,5	1,9	13,7	6,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	2,6	1,0	0,0	0,2	0,1	0,3	4,6	7,3
32	Robinetto-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,9	4,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	16,2	13,1	7,1	4,9	3,7	4,0	2,7	1,1	0,2	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,7	3,0	1,5	0,4	0,9	1,1	1,0	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	65,8	192,1	184,3	122,6	89,8	64,1	44,2	27,8	15,2	10,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	12,3	9,0	4,6	3,0	3,1	3,7	3,0	2,2	0,9	1,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	27,6	83,6	57,4	28,2	17,1	11,3	6,5	3,2	1,2	1,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	1,3	0,9	0,7	0,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,4	17,2	11,0	7,1	6,2	4,5	3,1	1,6	0,3	0,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,4	14,1	10,1	5,9	5,4	4,3	1,8	1,2	0,4	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,3	3,9	5,1	3,0	2,2	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	17,4	213,3	307,2	276,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	36,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	19,8	112,7	104,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	1,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	7,6	50,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,3	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	17,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	128,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	93,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	3,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	6,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	84,4
26	Querceto a roverella pioniero	119,3
27	Querceto a roverella tipico	2,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	402,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	4,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillateto	1,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,8	1,2	3,1	4,3	4,8	3,2	0,0	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	32,8	36,1	35,8	16,3	2,8	0,1	0,3	4,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	12,4	31,0	27,3	9,5	6,5	2,6	1,6	2,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,1	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	4,3	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	13,8	15,5	19,7	17,0	9,0	3,8	1,2	4,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,2	7,6	18,8	29,9	39,5	16,6	2,6	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	1,2	0,5	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	31,3	77,3	90,5	73,4	70,9	40,6	10,7	7,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,4	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,3	1,4	3,9	4,9	3,6	2,2	0,9	0,3	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	2,4	15,0	36,5	35,2	22,2	11,0	4,4	1,1	0,3	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,8	26,1	28,8	16,4	7,8	2,6	0,8	0,4	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,4	0,9	1,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,7	1,6	1,9	1,4	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	38,2	16,8	13,4	7,8	3,9	2,0	1,0	0,6	0,4	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	1,4	10,7	29,7	34,2	24,2	10,6	5,1	2,6	0,7	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,5	0,1	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	14,2	50,2	85,4	93,3	72,3	45,1	24,8	11,4	4,2	1,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	0,3	0,4	0,8	0,9	1,1	0,9	0,4	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	8,5	8,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	31,4	93,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,0	42,2	32,5	15,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,9	54,2	9,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	59,2	52,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,3	214,1	170,8	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cereta mesofila	0,0
11	Cereta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	23,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	19,3
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,0
26	Querceto a roverella pioniero	107,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	280,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	14,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	40,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,4	1,7	1,6	0,7	1,7	0,7	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	5,5	9,1	6,0	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,6	4,7	7,5	5,4	1,1	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	0,3	1,1	4,0	1,9	0,7	0,6	0,4	0,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	6,2	22,5	16,0	24,2	25,3	11,9	1,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,6	18,1	75,0	53,8	43,8	67,0	21,1	1,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	1,0	0,5	1,6	8,3	3,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	7,0	18,7	12,2	1,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,9	2,2	1,9	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	2,6	7,7	6,8	3,8	1,4	0,4	0,1	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,1	0,3	1,1	2,7	4,6	4,2	3,8	1,9	0,4
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,0	2,4	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,9	10,6	21,1	26,9	19,4	12,1	7,0	4,5	2,2	1,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,7	11,1	33,7	55,3	64,0	53,2	36,1	16,2	5,9	1,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,3	0,5	0,8	2,3	3,3	3,7	2,5	0,7	0,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	5,0	18,0	13,1	3,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	4,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,6	6,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	1,3	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,6	54,2	39,4	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	135,1	109,7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	10,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	8,1	31,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,4
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	66,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	44,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	12,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,0	0,2	0,6	0,4	0,4	1,1	0,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,7	0,8	2,5	1,7	1,0	1,8	3,7	3,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	8,0	5,1	8,5	6,0	5,3	6,9	13,3	13,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	10,1	3,3	2,7	3,2	1,4	1,2	7,6	15,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	4,1	0,1	0,3	1,0	0,4	0,4	1,5	4,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,7	0,8	1,1	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,0	2,0	3,0	3,3	2,9	1,9	0,9	0,4	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	32,9	20,6	6,9	3,5	2,0	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,0	4,2	5,9	8,9	9,7	6,7	4,4	2,2	0,8	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,2	1,5	2,4	3,3	2,5	1,5	0,7	0,3	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	44,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	12,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Comune di San Martino sulla Marrucina




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	41,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	49,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	32,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	21,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	1,0	3,4	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,5	6,3	15,1	1,7	0,7	8,3	7,2	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,1	9,9	10,5	2,6	1,1	4,7	8,4	6,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,5	0,4	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,3	4,7	5,0	0,7	0,7	7,8	9,9	2,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	1,1	6,0	6,8	1,4	0,2	2,1	3,2	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	1,0	1,7	1,4	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,6	6,4	9,1	8,9	7,7	3,8	1,8	0,9	0,4	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,3	12,6	11,3	6,8	4,1	1,9	1,2	0,5	0,3	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	0,6	0,4	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,9	4,8	7,3	5,6	4,4	2,7	2,0	1,3	0,9	1,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,2	4,8	6,2	4,1	2,6	1,2	0,7	0,4	0,1	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,7	37,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,2	40,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	26,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	1,3	20,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	36,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	10,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	14,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	2,1	1,8	5,2	13,4	4,6	1,3	1,0	7,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,2	1,8	3,5	0,8	1,1	0,7	0,7	0,5	0,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	2,3	10,5	0,4	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	25,2	7,3	2,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	10,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	5,4	3,8	2,2	1,2	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	8,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	28,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	3,1
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	67,2
26	Querceto a roverella pioniero	1,4
27	Querceto a roverella tipico	62,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	20,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,6	4,1	0,5	0,7	0,9	0,2	0,1	0,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,2	7,1	1,8	1,1	1,0	0,5	4,3	7,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,8	11,9	9,1	11,5	10,3	9,8	2,0	5,2	6,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	12,2	17,7	2,3	0,7	0,0	2,6	16,2	10,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,8	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,6	2,7	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	4,5	2,2	2,2	1,0	1,1	0,4	4,6	4,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,9	0,9	1,3	1,3	1,4	1,1	0,9	0,4	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	4,9	6,4	5,6	4,6	3,1	2,0	1,0	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	13,7	9,0	9,0	8,1	7,5	6,4	5,5	3,8	2,6	1,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,0	4,0	7,7	10,1	9,9	9,9	7,8	5,9	3,0	3,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	0,8	0,4	0,1	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,2	0,2	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,3	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,4	1,7	2,8	3,4	3,2	3,1	2,4	1,6	0,7	0,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	7,4
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	13,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	120,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	4,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,8	0,8	1,5	3,0	0,8	0,4	0,0	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,1	1,6	0,8	0,5	2,0	0,9	1,8	4,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	17,5	13,0	11,6	17,1	18,2	16,4	13,4	13,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,3	0,2	1,2	1,2	0,1	0,1	0,3	0,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,5	1,5	1,1	1,3	1,0	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	0,9	2,9	4,3	3,1	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	50,5	26,7	16,0	12,6	8,5	4,6	1,6	0,3	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,9	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	5,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	109,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,5
26	Querceto a roverella pioniero	6,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	4,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,2	0,2	0,8	1,5	0,1	0,0	0,6	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,8	1,3	0,5	0,4	1,1	1,2	0,0	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,8	0,8	1,1	0,1	0,0	0,0	0,7	2,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,8	0,5	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2	2,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8	0,6	0,5	0,7	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	0,9	1,6	1,2	0,8	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,7	1,5	1,3	1,2	1,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,5	0,7	1,0	0,7	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	10,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	28,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	143,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	14,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	40,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	6,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,0	0,1	2,4	4,1	3,3	0,1	0,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,0	3,5	2,9	3,3	7,0	1,4	0,8	4,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,7	21,3	19,3	26,9	22,4	13,9	7,3	12,8	18,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,9	0,7	0,9	0,9	3,5	1,6	0,2	1,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	14,4	3,2	1,9	5,3	2,7	0,8	1,1	11,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,2	1,1	0,4	0,2	1,8	1,1	0,2	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	1,6	2,9	2,9	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,4	6,6	8,1	6,0	3,7	1,7	0,3	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	99,6	22,4	11,4	5,6	2,8	0,9	0,4	0,1	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,4	2,9	4,0	3,0	1,6	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,8	9,7	12,3	8,0	4,5	2,6	0,7	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,5	1,3	1,2	1,1	0,5	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	26,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	142,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	10,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	32,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	272,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	43,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	12,5
11	Cerreta mesoxerofila	95,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	402,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	103,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	203,3
26	Querceto a roverella pioniero	532,8
27	Querceto a roverella tipico	21,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	612,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	32,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	60,2
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,1	10,1	44,1	43,5	65,0	77,9	25,9	3,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,2	0,3	0,0	0,3	3,8	17,3	15,5	4,7
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	1,0	2,6	3,5	3,7	0,8	0,0	0,1	0,7
11	Cerreta mesoxerofila	1,6	13,0	22,3	24,3	15,2	9,3	3,9	1,5	3,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	37,8	53,0	43,1	26,3	44,8	92,5	77,5	27,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	23,5	24,7	14,2	4,1	0,7	5,8	15,3	14,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,9	11,1	17,3	19,0	28,3	41,7	52,4	25,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,9	22,4	110,2	118,7	132,6	91,3	46,0	9,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,5	1,9	8,5	5,0	3,6	1,1	0,2	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	14,9	27,5	57,8	49,2	110,5	164,9	132,0	55,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,0	1,0	1,2	1,2	2,7	12,5	11,3	1,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,5	7,3	10,6	6,0	12,6	7,8	8,3	6,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,0	13,6	44,2	60,3	57,7	45,5	29,9	14,6	3,7	0,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,2	0,8	2,0	3,1	6,0	8,1	8,9	6,8	5,2	2,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,3	1,2	2,9	3,8	2,6	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	27,9	7,5	12,5	14,7	14,9	9,6	5,1	1,8	0,8	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,9	48,7	108,8	95,2	64,4	37,2	18,6	6,7	1,5	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,5	3,4	9,8	18,3	21,6	20,6	16,0	8,3	4,1	0,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	34,4	26,4	50,1	42,7	26,3	13,8	6,6	2,2	0,6	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	10,1	63,7	122,1	130,6	98,1	59,0	30,6	13,3	4,3	1,0
27	Querceto a roverella tipico	2,0	2,7	4,5	4,0	3,6	2,5	1,1	0,7	0,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,0	48,8	129,1	149,4	125,6	85,9	44,6	17,3	5,1	0,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,8	2,0	2,5	4,1	6,8	7,3	5,6	2,4	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,4	1,8	4,6	8,4	12,6	14,8	10,2	5,6	1,4	0,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	10,7	39,0	45,8	140,2	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	4,3	29,8	6,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	62,0	4,8	0,0	28,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	95,7	119,2	67,4	67,0	52,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,5	45,9	4,4	40,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	37,2	41,0	73,3	41,1	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	184,9	223,0	67,8	55,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	11,8	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	59,9	265,1	216,0	68,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	42,2	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	13,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	221,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	34,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	30,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	11,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	8,2
12	Faggeta altomontana rupestre	8,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	25,7
14	Faggeta termofila e basso montana	39,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	120,5
16	Lecceta costiera termofila	0,6
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	23,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	102,4
21	Ostrieto mesofilo	29,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	23,3
26	Querceto a roverella pioniero	2,9
27	Querceto a roverella tipico	19,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	71,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	45,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,3
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,2	0,5	5,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,9	10,2	41,1	112,5	43,9	11,4	0,1	0,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	7,8	10,0	6,2	1,9	1,1	0,4	2,2	4,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,6	11,1	11,1	1,6	0,0	0,0	0,8	2,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,7	1,1	1,4	0,3	0,2	1,0	3,2	2,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	3,0	1,8	1,1	0,2	0,1	0,0	0,1	1,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	2,3	3,6	0,5	1,8	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,2	10,5	10,7	3,7	0,5	0,1	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	3,6	17,0	13,9	4,1	1,2	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	40,1	29,0	11,2	5,1	2,9	1,0	2,9	28,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,3	1,7	13,2	2,4	4,5	0,8	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,3	8,7	34,6	32,6	11,8	8,8	3,0	1,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	1,6	4,8	22,8	0,5	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,5	2,6	2,2	5,4	3,3	0,9	0,3	4,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	4,1	11,7	3,2	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	20,6	15,0	8,6	6,4	1,6	0,8	3,9	14,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,5	2,3	11,7	14,3	6,1	2,9	0,2	3,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,2	1,1	1,5	1,3	2,5	2,9	2,6	1,3	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,7	10,8	60,8	71,9	42,6	21,0	8,5	2,3	0,7	1,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,8	7,5	13,3	8,6	3,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6	11,0	12,4	4,7	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,5	2,1	3,4	2,5	1,7	0,7	0,2	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,6	1,5	2,3	1,9	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,7	1,0	1,0	4,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,1	0,2	1,2	3,4	4,2	5,7	4,3	4,5	2,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,2	1,2	4,6	8,8	9,4	6,3	3,8	2,6	3,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,6	33,0	56,4	21,2	5,8	1,7	0,6	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,1	3,0	4,9	5,2	8,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	1,3	2,8	6,0	8,7	19,6	22,3	21,2	11,9	8,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	8,1	9,6	5,0	1,6	1,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,9	8,4	6,3	3,1	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	0,8	0,6	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,6	2,8	3,9	4,0	3,4	2,6	1,4	0,4	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,9	11,3	20,8	16,4	9,9	5,6	3,5	1,1	0,4	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,5	1,9	3,9	5,3	9,4	9,2	7,9	4,0	2,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	3,9	5,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	49,4	62,1	78,6	12,9	2,2	0,1	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	13,5	18,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	23,9	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	7,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	5,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	14,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	22,2	7,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	84,8	35,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	8,5	10,6	2,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,4	12,4	24,3	22,1	24,0	6,7	3,0	8,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,7	9,1	15,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,3	15,7	3,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	10,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,1	51,2	18,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	5,4	26,3	11,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	21,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	66,7
26	Querceto a roverella pioniero	2,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	51,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieto-ailanteto	22,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,0	2,7	3,6	3,2	1,8	2,7	0,9	3,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	11,0	6,8	7,5	6,4	3,6	5,8	7,9	17,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	0,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	5,8	1,3	2,7	2,2	5,3	5,9	10,5	17,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	4,7	1,6	1,1	0,9	1,0	2,0	3,6	7,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,5	1,4	4,1	4,3	3,8	3,1	1,9	0,9	0,4	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,5	6,9	9,0	10,0	10,3	9,2	6,5	3,6	1,8	1,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8	2,7	5,5	8,2	10,2	8,8	6,3	4,7	2,4	2,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,4	1,1	2,4	4,1	4,6	3,8	3,0	2,0	0,6	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	34,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	118,5
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	146,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	69,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	17,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	13,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,1	3,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,7	5,9	6,2	1,9	0,8	1,0	5,1	7,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,1	32,3	62,6	8,0	1,9	1,8	1,0	3,7	7,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,9	17,3	11,2	16,1	20,1	15,0	11,7	21,3	32,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	9,0	5,2	0,6	0,5	1,4	1,8	18,7	32,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,5	6,0	2,7	0,5	0,4	0,7	4,0	1,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,2	4,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	2,4	0,9	1,5	1,1	0,2	0,6	2,1	5,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	0,8	1,4	1,4	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,5	7,1	9,1	6,7	3,6	1,8	1,2	0,4	0,2	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	15,1	35,6	27,3	16,8	10,6	6,6	3,5	1,6	1,0	0,4
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	88,6	35,1	13,1	4,7	2,9	1,3	0,4	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	8,0	17,8	13,8	9,3	6,9	4,8	3,2	2,5	1,8	1,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	2,4	3,0	2,6	2,8	2,0	2,1	1,1	0,7	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,5	0,6	1,2	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,6	2,3	2,5	2,4	1,7	1,0	0,6	0,4	0,2	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	146,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	16,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	178,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,9
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	83,3
11	Cerreta mesoxerofila	179,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	2,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	164,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	5,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	55,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	57,9
26	Querceto a roverella pioniero	131,1
27	Querceto a roverella tipico	15,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	311,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	18,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	49,4	51,0	37,4	17,6	2,8	5,3	2,8	12,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1	0,6
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,2	11,3	7,7	10,9	10,4	9,6	4,2	17,6	11,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,9	22,8	39,0	35,3	13,7	18,6	6,0	26,1	17,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,3	0,8	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	43,4	41,1	28,8	12,5	6,7	4,3	7,6	20,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	1,8	1,3	1,0	0,2	0,3	0,2	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	4,8	8,7	32,2	4,6	1,0	0,9	0,9	1,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	15,3	13,5	8,9	6,6	1,2	2,7	1,7	8,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	14,7	23,9	31,5	28,5	9,7	11,1	5,7	6,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,3	0,3	3,8	1,4	9,7	0,4	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	33,5	74,9	86,5	60,6	11,6	16,5	10,1	17,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,0	1,2	3,1	4,0	1,5	2,6	2,4	2,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,7	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,2	1,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	10,7	32,4	67,3	49,3	16,4	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	0,5	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	6,5	13,6	21,4	18,0	11,8	6,6	3,2	1,5	0,4	0,5
11	Cerreta mesoxerofila	11,3	26,2	38,4	38,0	29,5	18,5	10,5	4,9	2,0	0,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	0,5	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,6	36,8	61,5	37,5	13,6	4,6	1,5	0,5	0,2	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,8	1,4	1,3	1,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,8	5,2	7,0	10,1	11,5	8,7	6,0	2,9	1,3	0,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,9	20,2	16,8	8,1	3,5	1,6	0,5	0,3	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	33,7	41,2	29,5	16,4	7,5	2,3	0,6	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	1,0	1,6	2,8	4,1	2,7	2,6	0,7	0,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	41,1	59,2	65,1	58,0	42,9	27,6	12,3	4,2	0,8	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,8	4,9	4,5	3,1	2,6	1,6	0,5	0,3	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,2	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,2	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	41,5	117,0	19,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	43,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	4,8	97,5	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	24,1	91,4	32,5	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	13,5	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	21,1	29,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	5,9	27,2	80,6	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	1,4	13,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,6	60,5	216,6	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	1,8	9,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	55,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	5,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	3,4
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	279,2
11	Cerreta mesoxerofila	347,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	201,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	150,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	55,6
26	Querceto a roverella pioniero	75,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	95,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	112,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	35,6
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,3	1,8	5,8	11,4	20,0	11,2	2,7	0,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	0,9	1,2
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	19,3	56,5	62,5	55,2	49,7	21,8	7,4	6,8
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	40,4	65,3	84,5	36,7	41,2	36,7	16,0	26,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	34,2	70,0	45,0	2,4	2,6	4,4	24,2	18,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	16,7	26,4	35,0	25,6	24,8	14,4	2,2	5,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	10,4	9,8	11,4	7,8	8,1	2,2	1,0	4,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	7,6	8,0	15,0	19,3	13,3	7,6	1,7	3,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	10,7	12,8	19,9	22,4	13,8	7,3	4,5	3,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	14,3	26,7	23,8	14,0	17,4	8,4	2,8	5,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,8	3,6	3,9	5,0	10,0	7,8	2,6	1,9
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	3,7	13,8	15,2	11,0	6,3	3,0	1,5	0,7	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	0,7	0,9	1,1	0,7	0,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,3	0,5	1,4	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	7,0	33,2	70,9	70,3	48,6	28,1	13,4	5,0	1,9	0,7
11	Cerreta mesoxerofila	4,9	32,6	88,4	88,8	66,0	35,9	19,6	8,3	2,7	0,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1,8	7,6	31,1	49,0	45,2	31,4	19,4	9,7	4,2	2,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,5	28,0	45,9	34,9	21,4	9,9	3,1	1,0	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,8	9,4	16,4	14,2	8,2	3,6	1,4	0,5	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,9	11,6	21,8	18,5	10,8	5,0	3,5	1,7	0,6	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8	9,0	20,1	25,4	20,3	11,8	4,9	2,1	0,6	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	9,4	34,4	31,3	17,1	8,9	5,4	3,7	1,7	0,5	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,5	1,6	5,0	8,0	8,4	7,3	3,5	1,1	0,2	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,5	13,7	19,4	19,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	2,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,4	7,8	133,3	131,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	9,2	123,8	177,0	32,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	18,8	123,4	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	7,4	50,4	63,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,7	18,9	24,5	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	17,8	46,4	6,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,7	45,3	44,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	41,1	37,6	32,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,4	9,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	23,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	14,4
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	57,9
26	Querceto a roverella pioniero	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	17,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	12,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,2	0,6	1,7	6,9	8,6	0,8	0,1	2,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	9,7
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	10,5	7,3	5,6	8,5	8,5	2,3	2,7	12,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,9	0,8	0,9	2,0	2,6	1,4	2,5	4,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	1,6	1,1	0,5	0,9	2,1	0,8	0,1	5,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	1,2	1,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	2,6	4,8	5,4	4,7	3,3	1,6	0,5	0,2	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,4	0,8	1,0	1,9	1,9	2,5	2,3	2,1	1,1	0,3
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,9	13,6	11,8	9,2	5,5	2,6	1,2	0,5	0,3	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,9	1,9	2,6	3,6	3,1	2,3	1,7	1,4	0,5	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,6	1,9	2,9	2,5	1,9	1,4	0,7	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	22,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	16,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	10,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	13,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	95,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	19,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	4,8
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	164,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	342,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	55,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	17,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	41,7
26	Querceto a roverella pioniero	17,2
27	Querceto a roverella tipico	144,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	596,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	30,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	3,7	2,2	1,6	0,2	0,0	0,1	1,0	4,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	9,7	12,0	10,2	8,7	13,6	15,4	14,0	11,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,7	2,9	2,0	1,1	1,7	3,5	1,9	2,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,7	0,1	1,1	0,5	0,6	1,0	0,4	0,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	47,3	33,2	12,6	5,7	6,5	9,6	18,4	31,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	74,2	46,7	20,9	9,1	23,3	39,7	61,0	67,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,0	3,4	11,1	10,9	11,7	7,1	2,8	4,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	9,3	3,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,8	4,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	9,5	5,1	3,5	2,4	2,3	3,6	6,7	8,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,0	0,6	1,2	1,9	3,7	6,1	1,4	1,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,8	7,6	19,8	27,6	28,7	33,0	15,9	5,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	112,3	111,0	86,6	34,2	33,7	43,5	74,4	101,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	7,6	2,7	2,4	2,8	1,7	3,7	4,1	5,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,5	3,1	3,9	3,5	1,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,8	11,3	27,4	29,8	15,5	6,0	2,3	0,6	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6	3,7	5,8	5,2	3,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	1,3	1,7	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	4,7	25,6	47,6	39,2	25,3	13,3	6,1	1,8	0,8	0,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,2	70,5	115,6	85,9	41,2	15,4	4,4	1,2	0,4	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,4	3,4	9,8	12,4	10,0	6,9	4,6	3,4	1,7	2,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	1,5	3,9	5,1	4,1	2,0	0,9	0,2	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,0	11,1	13,0	7,8	3,7	1,2	0,4	0,2	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,4	1,3	3,7	5,4	3,3	1,9	0,8	0,3	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	3,1	12,6	31,3	39,4	28,7	15,7	7,1	3,3	1,8	1,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	11,9	87,7	163,3	153,5	98,4	50,0	21,4	7,6	2,3	0,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,8	6,7	7,9	4,9	3,5	2,4	1,2	0,5	0,3	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	3,5	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,1	45,5	23,9	23,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	9,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,0	2,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	25,5	107,9	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	6,0	105,0	145,6	82,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,9	22,3	22,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	3,9	12,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,3	2,7	2,5	27,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	5,9	9,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,0	50,2	87,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	25,1	221,2	293,6	56,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,1	29,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,8
16	Lecceta costiera termofila	3,9
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	2,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	39,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,8	1,3	1,4	0,5	0,0	0,0	0,3	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,1	1,9	0,5
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,0	2,1	6,2	2,9	0,2	0,5	10,6	9,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,9	1,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,8	3,0	2,1	4,1	0,5	0,1	12,1	13,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	0,0	0,2	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	1,0	0,9	1,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,6
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,5	6,8	6,8	5,9	4,6	3,1	1,9	1,0	0,5	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8	3,1	4,3	5,1	5,7	6,3	5,0	4,3	2,6	1,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	37,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	59,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,4
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	85,7
16	Lecceta costiera termofila	13,3
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	19,4
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	56,1
26	Querceto a roverella pioniero	243,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	583,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	71,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	58,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,9	0,6	3,9	5,4	11,2	14,9	17,8	4,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,2	3,5	16,1	20,7	14,5	19,0	7,4	2,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,1	3,1	1,5	6,4	2,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,8	6,9	6,4	4,5	0,8	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,6	3,2	5,9	10,1	10,9	8,6	10,3	4,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	6,4	15,9	39,3	31,7	41,8	47,0	43,3	18,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	24,4	101,1	152,1	62,6	53,7	91,3	74,1	23,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,2	0,8	12,0	7,1	15,9	30,4	4,1	1,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,7	7,0	3,6	1,0	2,9	12,5	21,4	5,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	8,6	19,1	17,6	8,8	3,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,2	15,5	24,5	16,8	7,2	4,5	3,3	1,8	1,3	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,1	0,5	0,8	1,7	2,9	2,9	2,4	1,3	0,7
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,1	0,6	1,8	2,9	4,4	4,2	3,1	2,2
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	29,2	10,2	7,7	4,5	2,4	1,2	0,5	0,2	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	16,1	44,2	72,6	51,6	29,3	14,8	7,6	3,6	1,7	2,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	25,2	60,9	104,1	128,1	111,5	77,5	47,0	19,6	7,3	1,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,4	11,5	17,5	20,1	10,9	3,9	1,3	0,7	0,2	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,5	10,6	13,4	14,0	9,8	5,6	1,9	0,5	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,6	34,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	27,2	27,3	28,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	6,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	4,7	13,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	34,3	20,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	52,2	107,6	68,4	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	60,3	256,8	215,2	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	12,4	48,4	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	8,6	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	21,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	48,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	40,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	44,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	25,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	1,1	0,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,7	1,9	4,7	6,3	1,7	1,0	1,2	2,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	6,1	3,5	7,9	7,5	2,9	1,5	6,7	12,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,6	1,2	2,6	6,2	1,8	6,2	11,7	8,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	7,0	2,0	3,3	7,3	3,6	1,3	3,3	16,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	3,3	1,1	2,5	3,3	0,7	1,5	8,3	5,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,3	1,0	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	2,4	5,0	5,0	4,6	2,5	1,5	0,5	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,8	14,9	9,0	5,9	4,3	2,5	0,8	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,2	1,7	4,4	8,5	8,9	8,1	5,4	2,2	0,7	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,2	4,4	9,3	10,8	8,4	5,3	2,7	1,2	0,3	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,4	2,0	3,5	3,9	4,9	4,0	2,9	1,6	0,4	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	15,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	44,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	9,5	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	28,3	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	4,6	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	23,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	16,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	81,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	95,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	53,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	56,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	13,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	30,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,7	2,6	4,2	1,0	0,9	3,6	6,7	3,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	5,1	1,4	5,3	0,2	0,2	0,2	2,0	1,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	7,7	20,0	13,7	7,6	3,4	6,6	12,9	8,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	12,8	10,8	9,6	11,2	6,7	9,6	16,6	18,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	6,1	4,3	5,3	2,9	2,3	8,0	14,3	10,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	6,9	7,5	6,2	4,1	1,3	4,8	16,7	8,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	3,3	1,8	4,2	1,5	0,5	0,8	0,5	0,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	3,7	4,5	2,8	3,3	2,1	3,5	5,2	5,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,8	1,7	3,6	4,8	4,3	4,1	2,9	1,4	0,3	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,7	2,9	2,5	2,4	2,1	1,7	1,1	0,6	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,6	16,6	17,0	12,2	7,2	4,2	2,2	0,5	0,3	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	45,6	22,3	12,8	7,6	4,4	2,0	0,7	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	2,9	8,0	10,8	9,3	9,9	6,5	3,9	1,5	0,6	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,1	8,7	11,2	11,3	7,5	5,0	2,7	1,6	0,6	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	6,3	1,1	2,1	1,5	0,9	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,6	5,3	5,4	5,3	4,5	3,4	1,9	0,9	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	54,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	188,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	109,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	2,6
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	13,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	50,4
26	Querceto a roverella pioniero	29,1
27	Querceto a roverella tipico	48,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	388,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	4,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	31,3	30,6	11,9	0,8	0,6	9,0	50,1	53,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	14,0	20,7	33,4	13,3	2,0	2,3	8,7	14,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,2	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,9	2,5	4,2	0,4	0,0	0,0	0,1	2,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	8,9	13,8	9,4	5,1	2,2	1,1	3,3	6,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,4	4,3	12,6	4,7	2,7	2,8	0,2	1,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	10,3	23,6	13,3	0,9	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	51,7	99,9	98,4	30,4	8,0	7,5	38,6	54,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,1	0,0	1,3	0,8	0,1	1,1	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,7	1,9	1,0	0,1	0,0	0,4	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	7,9	29,2	48,3	44,9	30,2	15,0	7,2	2,7	1,1	1,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	16,0	23,7	31,3	23,1	9,9	3,3	1,4	0,3	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	1,4
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,7	4,0	4,4	3,3	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3	0,4	0,2	0,4	0,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,7	11,0	14,0	10,1	5,0	2,2	0,7	0,3	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	3,0	9,2	7,3	4,1	1,9	1,5	1,2	0,7	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	2,4	9,3	14,2	11,5	6,7	2,9	0,9	0,1	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	15,7	51,6	90,2	92,9	65,1	39,3	19,7	7,9	3,5	2,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,1	0,2	0,6	0,8	0,7	0,4	0,2	0,2	0,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,4	1,5	1,4	0,7	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	22,9	145,5	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	81,6	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	7,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	3,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	38,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	25,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	13,3	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	249,8	138,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	19,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	51,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	1,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,7	1,3	0,9	0,1	0,1	1,3	2,2	1,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,8	3,2	1,8	0,9	1,0	1,4	3,7	3,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	4,0	5,8	5,1	1,3	0,3	3,8	19,0	12,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	1,1	1,8	1,6	1,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,1	5,0	4,0	1,9	1,3	1,3	1,0	0,6	0,3	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,2	6,2	10,0	9,1	8,3	6,5	4,3	2,7	1,4	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	50,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	15,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	37,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	33,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	8,4
33	Variante Abete bianco	0,0

Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,8	0,7	4,7	2,5	2,3	1,0	1,3	1,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,5	4,1	6,3	4,6	3,5	3,7	4,9	6,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,7	3,2	4,3	2,4	1,6	2,1	4,7	11,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,6	0,6	2,6	1,4	0,3	0,5	0,4	1,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,6	1,3	2,2	3,5	3,0	2,1	0,8	0,3	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,1	10,9	6,9	5,3	3,3	2,1	0,9	0,2	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8	2,6	4,7	7,0	6,3	4,9	3,8	2,0	0,7	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,2	1,0	1,6	1,5	1,5	1,0	1,0	0,4	0,2	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,7	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	12,6	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

