

## Modelli di combustibile

### Caratteristiche della vegetazione-combustibile

Provincia di **Chieti**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2679,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	9525,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1873,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	3,4
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	7658,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3704,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	20252,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	30983,8

Comune di **Altino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	61,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,7
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	32,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	17,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	111,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	127,8

Comune di **Archi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	5,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	111,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	4,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	63,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	60,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	89,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	581,2

Comune di **Ari**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	35,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	16,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	99,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	115,0

Comune di **Arielli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	14,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	1,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	115,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	60,3

Comune di **Atessa**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	36,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	181,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	22,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	202,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	41,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	282,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	495,4

Comune di **Bomba**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	20,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	155,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	4,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	2,2
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	199,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	54,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	123,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	461,3

Comune di **Borrello**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	25,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	25,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	71,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	36,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	823,7

Comune di **Bucchianico**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	123,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	32,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	31,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	4,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	154,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	120,7

Comune di **Canosa Sannita**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	41,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	18,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	29,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	73,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	132,0

Comune di **Carpineto Sinello**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	11,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	230,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	15,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	247,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	15,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	133,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	748,9

Comune di **Carunchio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	26,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	245,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	108,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	184,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	186,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1077,9

Comune di **Casacanditella**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	24,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	16,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	63,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	110,9

Comune di **Casalanguida**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	37,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	20,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	28,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	14,1

Comune di **Casalbordino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	13,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	35,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	12,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	132,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	126,6

Comune di **Casalincontrada**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	17,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	4,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	98,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	16,7

Comune di **Casoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	35,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	178,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	58,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	102,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	185,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	460,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	388,1

Comune di **Castel Frentano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	6,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	10,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	11,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	49,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	37,0

Comune di **Castelguidone**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	46,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	108,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	77,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	54,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	71,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	513,4

Comune di **Castiglione Messer Marino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	62,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	272,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	58,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	284,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	11,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	526,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	915,0

Comune di **Celenza sul Trigno**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	72,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	160,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	14,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	51,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	91,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	520,3

Comune di **Chieti**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	6,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	10,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	49,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	256,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	154,6

Comune di **Civitaluprella**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	15,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	43,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	143,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	18,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	180,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	870,5

Comune di **Civitella Messer Raimondo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	104,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	18,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	145,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	9,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	58,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	295,7

Comune di **Colledimacine**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	26,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	124,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	17,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	186,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	52,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	27,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	372,3

Comune di **Colledimezzo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	79,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	41,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	34,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	470,7

Comune di **Crecchio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	6,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	174,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	119,9

Comune di **Cupello**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	45,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	17,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	4,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	49,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	40,7

Comune di **Dogliola**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	27,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	157,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	27,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	14,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	13,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	316,2

Comune di **Fallo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	12,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	23,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	50,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	22,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	308,9

Comune di **Fara Filiorum Petri**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	27,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	10,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	41,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	171,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	147,4

Comune di **Fara San Martino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	80,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	92,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	4,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	35,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	371,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1006,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	149,4

Comune di **Filetto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	66,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	27,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	100,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	149,7

Comune di **Fossacesia**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	27,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	12,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	96,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	63,3

Comune di **Fraine**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	65,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	277,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	25,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	127,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	102,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	425,3

Comune di **Francavilla al Mare**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	7,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	4,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	7,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	60,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	38,2

Comune di **Fresagrandinara**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	13,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	201,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	25,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	27,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	91,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	453,2

Comune di **Frisa**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	5,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	9,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	14,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	33,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	11,0

Comune di **Furci**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	5,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	23,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	32,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	30,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	27,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	274,7

Comune di **Gamberale**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	20,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	19,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	11,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	22,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	625,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	114,6

Comune di **Gessopalena**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	18,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	360,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	33,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	264,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	15,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	47,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	786,9

Comune di **Gissi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	7,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	125,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	21,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	226,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	155,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	294,2

Comune di **Giuliano Teatino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	10,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	5,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	34,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	80,0

Comune di **Guardiagrele**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	134,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	190,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	103,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	199,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	13,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	684,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	816,8

Comune di **Guilmi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	85,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	14,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	42,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	51,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	408,4

Comune di **Lama dei Peligni**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	36,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	240,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	39,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	219,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	164,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	168,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	668,1

Comune di **Ianciano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	15,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	18,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	32,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	201,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	160,7

Comune di **Lentella**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	92,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	17,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	39,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	64,2

Comune di **Lettopalena**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	69,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	135,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	47,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	170,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	318,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	147,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	406,9

Comune di **Liscia**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	56,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	63,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	29,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	271,5

Comune di **Miglianico**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	4,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	109,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	73,3

Comune di **Montazzoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	28,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	261,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	49,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	217,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	42,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	468,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	633,1

Comune di **Montebello sul Sangro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	10,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	176,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	54,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	17,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	40,4

Comune di **Monteferrante**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	13,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	31,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	145,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	43,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	288,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	515,4

Comune di **Montelapiano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	228,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	66,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	10,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	19,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	136,0

Comune di **Montenerodomo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	62,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	63,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	11,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	83,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	31,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	680,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	478,1

Comune di **Monteodorisio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	21,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	13,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	162,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	73,2

Comune di **Mozzagroga**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	18,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	36,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	12,0

Comune di **Orsogna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	46,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	85,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	43,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	70,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	17,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	165,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	247,4

Comune di **Ortona**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	61,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	9,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	1,3
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	78,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	13,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	295,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	156,2

Comune di **Paglieta**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	148,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	9,6

Comune di **Palena**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	179,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	122,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	51,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	243,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	648,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3474,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1124,3

Comune di **Palmoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	29,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	183,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	63,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	68,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	102,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	968,2

Comune di **Palombaro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	20,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	208,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	29,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	26,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	142,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	214,6

Comune di **Pennadomo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	15,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	136,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	89,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	49,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	287,3

Comune di **Pennapiedimonte**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	99,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	244,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	50,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	85,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	702,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1518,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	456,9

Comune di **Perano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	12,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	59,3

Comune di **Pietraferrazzana**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	46,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	63,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	16,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	156,5

Comune di **Pizzoferrato**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	83,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	96,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	19,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	55,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	8,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	945,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	475,5

Comune di **Poggiofiorito**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	3,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	4,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	26,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	6,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	39,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	29,3

Comune di **Pollutri**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	12,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	6,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	69,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	31,0

## Comune di Pretoro

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	103,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	376,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	20,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	85,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	150,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	825,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	274,0

## Comune di Quadri

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	20,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	43,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	8,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	79,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	38,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	288,7

## Comune di Rapino

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	58,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	41,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	30,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	81,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	78,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	402,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	473,0

## Comune di Ripa Teatina

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	3,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	4,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	4,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	82,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	63,3

Comune di **Rocca San Giovanni**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	6,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	99,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	50,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	29,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	159,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	140,4

Comune di **Roccamontepiano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	58,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	181,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	24,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	34,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	8,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	79,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	278,2

Comune di **Roccascalegna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	57,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	179,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	28,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	82,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	41,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	80,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	309,9

Comune di **Roccaspinalveti**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	12,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	211,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	11,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	230,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	191,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	437,8

Comune di **Roio del Sangro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	40,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	53,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	16,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	71,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	166,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	399,1

Comune di **Rosello**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	13,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	115,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	59,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	224,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	16,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	102,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	767,7

Comune di **San Buono**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	8,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	184,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	76,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	85,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	496,2

Comune di **San Giovanni Lipioni**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	30,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	83,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	14,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	17,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	26,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	329,5

Comune di **San Giovanni Teatino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	4,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	5,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	77,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	60,7

Comune di **San Martino sulla Marrucina**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	6,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	5,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	70,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	62,4

Comune di **San Salvo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	6,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	44,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	11,1

Comune di **San Vito Chietino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	64,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	4,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	23,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	90,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	17,5

Comune di **Sant'Eusanio del Sangro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	124,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	13,8

Comune di **Santa Maria Imbaro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	6,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	9,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	5,2

Comune di **Scerni**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	18,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	26,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	149,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	38,6

Comune di **Schiavi d'Abruzzo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	379,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	363,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	197,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	420,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	16,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	203,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	809,8

Comune di **Taranta Peligna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	76,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	110,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	29,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	126,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	283,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	90,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	117,2

Comune di **Tollo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	6,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	87,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	65,7

Comune di **Torino di Sangro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	71,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	3,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	276,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	52,8

Comune di **Tornareccio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	27,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	208,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	33,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	268,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	64,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	607,3

Comune di **Torrebruna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	34,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	66,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	43,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	111,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	7,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	255,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	899,9

Comune di **Torrevicchia Teatina**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	4,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	12,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	84,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	21,8

Comune di **Torricella Peligna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	7,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	265,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	25,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	267,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	38,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	41,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	897,7

Comune di **Treglio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	39,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	42,2

Comune di **Tufilo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	76,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	169,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	47,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	83,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	17,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	72,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	724,3

Comune di **Vacri**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	41,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	10,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	74,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	56,5

Comune di **Vasto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	55,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	17,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	46,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	18,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	125,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	107,1

Comune di **Villa Santa Maria**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	10,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	115,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	60,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	56,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	597,0

## Comune di Villalfonsina

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	3,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	21,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	55,2

## Comune di Villamagna

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	4,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	10,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	45,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	35,7

Finito di stampare  
nel dicembre 2009