






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	372,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	58,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	73,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	23,8
26	Querceto a roverella pioniero	169,0
27	Querceto a roverella tipico	42,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1104,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	47,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	10,6	11,4	9,1	23,7	124,7	141,2	39,2	12,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,9	8,7	0,3	2,1	13,7	20,8	5,9	1,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,7	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	26,5	26,9	6,3	0,2	0,3	1,7	4,3	7,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,2	1,8	1,4	1,4	5,6	8,7	1,8	0,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	3,8	1,8	3,3	10,9	47,7	63,7	30,2	7,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,1	10,0	24,6	3,4	1,3	1,4	0,5	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,3	25,6	54,1	51,0	41,7	214,3	469,7	190,7	56,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,6	4,2	0,4	0,0	0,2	9,0	20,0	9,4	3,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	10,3	51,8	83,6	77,5	54,4	41,0	27,4	18,8	5,7	1,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,3	13,7	14,1	9,7	8,0	6,1	3,9	0,8	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,8	1,1	1,0	0,5	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	7,2	14,5	6,8	7,3	8,0	10,9	9,4	6,1	2,2	1,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,6	6,2	3,4	2,1	1,6	1,3	0,9	0,5	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	5,3	19,2	36,0	39,6	33,1	20,3	9,9	4,1	1,4	0,1
27	Querceto a roverella tipico	1,1	3,4	4,1	4,1	5,7	7,6	7,4	5,4	2,3	1,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	29,3	109,0	170,2	182,3	202,6	186,6	131,3	67,8	19,8	5,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,5	5,8	12,8	11,3	8,6	5,1	1,5	0,7	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	56,6	86,1	119,3	108,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	13,2	29,6	0,8	14,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	3,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	10,1	21,1	9,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	2,3	3,4	87,0	69,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	22,1	12,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	246,0	478,2	262,0	113,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	3,9	0,0	5,7	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	23,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	11,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	67,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	79,1
12	Faggeta altomontana rupestre	44,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	84,8
14	Faggeta termofila e basso montana	22,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	78,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	67,4
26	Querceto a roverella pioniero	88,9
27	Querceto a roverella tipico	17,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	155,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	75,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	8,4
32	Robinetto-aillanteto	5,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,7	0,5	0,2	0,4	0,6	0,9	0,5	0,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,5	0,7	0,3	0,9	4,3	16,6	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	8,8	0,5	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,0	0,9	16,5	17,8	8,6	8,6	10,2	4,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	30,9	2,7	0,3	3,5	6,6	1,0	2,5	31,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,6	5,6	4,9	0,4	3,9	11,1	14,1	3,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,3	8,8	18,1	0,4	0,2	11,7	31,5	13,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	11,7	9,8	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,5	1,7	1,6	7,4	22,6	17,0	16,0	9,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,7	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,7	0,9	4,8	7,9	10,5	16,1	14,2	11,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	1,8	15,4	28,4	12,8	22,6	7,5	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	5,1	6,6	2,5	2,2	0,9	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	6,5	3,5	1,9	11,1	11,5	21,1	69,3	31,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,4	1,5	2,4	7,0	27,3	25,1	10,3	1,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2	3,5	0,2
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	3,7	1,7	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,2	1,1	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	0,4	0,8	2,8	5,8	5,6	5,1	1,7	0,9	0,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,5	0,9	1,7	3,1	3,0	1,9	0,6	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	6,7	22,1	19,3	10,9	4,3	1,6	0,6	0,5	1,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	3,0	5,1	12,6	17,6	16,6	12,3	7,6	3,6	0,7	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	1,6	5,8	5,3	6,3	5,0	4,5	4,9	10,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	0,1	0,6	2,1	7,9	11,0	15,7	13,8	13,0	20,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,3	1,4	2,6	3,8	5,4	3,9	3,5	1,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,3	12,5	22,4	18,7	11,8	5,7	2,5	0,8	0,2	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,2	0,7	1,5	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,3	14,7	19,2	13,9	4,9	2,4	1,4	0,7	0,5	1,5
26	Querceto a roverella pioniero	1,5	13,8	24,2	18,8	9,9	6,6	4,3	2,8	2,6	4,5
27	Querceto a roverella tipico	0,1	1,0	3,4	4,5	4,0	2,8	1,3	0,5	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,6	6,6	10,2	12,3	14,6	17,0	19,7	19,6	17,9	37,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,4	6,1	12,3	9,8	11,3	12,9	10,8	7,4	3,4	1,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	1,6	1,7	1,4	1,8
32	Robinieta-ailanteto	0,2	1,1	2,4	1,4	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	7,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,5	39,3	5,4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	13,9	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,9	14,3	24,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	22,4	26,2	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	31,2	32,7	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	2,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	21,5	40,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	10,9	65,2	2,6	5,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	5,7	43,9	46,3	38,3	20,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	5,4	25,4	18,9	21,5	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,9	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	72,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	22,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	34,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	1199,6
11	Cerreta mesoxerofila	7,2
12	Faggeta altomontana rupestre	1,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	799,0
14	Faggeta termofila e basso montana	270,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	290,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	69,9
21	Ostrieto mesofilo	10,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	117,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	76,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	41,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,3	4,8	6,0	20,4	16,3	5,9	3,1	6,3	9,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,1	0,9	1,7	4,8	8,9	4,6	0,3	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	9,6	3,5	3,9	2,5	3,1	2,3	3,5	5,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	3,0	134,6	215,6	252,4	153,1	115,0	122,4	105,9	97,6
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	0,1	0,7	2,6	2,6	0,8	0,3	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,6	181,2	276,1	119,7	81,8	42,7	11,3	17,6	68,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,4	69,5	67,0	48,7	19,0	6,5	1,7	10,5	47,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	89,8	29,0	36,5	19,9	18,1	10,1	13,9	72,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,4	5,2	33,2	17,9	5,3	3,5	2,5	0,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	4,2	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3	5,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	14,8	29,0	30,6	10,0	2,7	1,3	11,1	17,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	26,3	9,9	6,8	3,3	1,7	2,4	7,9	18,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,5	1,0	6,1	2,2	0,4	0,6	6,2	20,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,4	25,9	27,2	10,8	2,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,7	2,2	5,7	7,5	4,4	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	10,6	6,3	8,4	5,6	2,1	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	84,8	206,1	291,0	259,8	168,7	99,4	50,2	25,2	10,1	4,1
11	Cerreta mesoxerofila	2,1	1,1	0,9	0,9	0,7	0,4	0,5	0,2	0,2	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,8	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	23,1	81,8	129,4	146,2	141,3	115,6	79,7	45,9	22,1	14,0
14	Faggeta termofila e basso montana	9,6	39,7	65,7	60,7	47,0	26,2	12,6	5,1	2,1	1,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	23,2	52,4	87,0	70,8	35,6	15,0	4,4	1,1	0,3	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,1	8,0	13,1	10,9	10,6	8,7	7,6	4,8	2,3	1,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	1,6	2,2	2,8	2,2	1,0	0,4	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,7	4,4	5,0	6,7	11,3	16,6	18,5	18,2	14,6	19,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	20,7	14,1	12,0	8,4	7,5	5,2	3,4	1,5	1,2	2,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,7	1,6	4,8	8,4	10,4	7,9	5,5	2,0	0,6	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	63,6	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	3,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	992,3	125,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,4	403,5	192,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	202,6	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4	135,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	56,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	77,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	306,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	106,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	20,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	74,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	73,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	39,3
14	Faggeta termofila e basso montana	346,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	180,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	1,2
18	Lecceta rupicola	32,7
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	385,7
21	Ostrieto mesofilo	126,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	55,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	73,6
26	Querceto a roverella pioniero	121,7
27	Querceto a roverella tipico	48,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	297,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	118,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	31,3
32	Robinieta-ailanteto	1,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	7,3	17,8	51,0	63,7	63,0	47,0	47,1	9,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	8,6	7,0	7,7	7,4	17,2	33,0	17,2	8,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,6	3,2	1,7	1,3	4,0	3,6	3,3	1,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,9	27,8	37,6	6,9	0,3	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	6,5	15,6	19,8	9,0	0,9	6,6	10,3	4,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	12,5	16,9	7,6	1,0	0,1	0,7	0,2	0,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	73,6	109,9	47,7	8,3	4,0	22,9	43,7	36,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,1	16,7	9,1	7,9	16,4	31,8	41,6	43,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,4	6,2	9,3	7,4	3,7	4,0	0,6	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	37,3	94,0	60,8	24,7	21,6	61,8	61,8	23,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	31,0	51,1	19,4	2,6	0,7	1,9	12,6	6,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	8,2	8,1	1,1	0,4	0,0	0,8	30,0	7,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	10,1	12,5	9,6	9,7	9,5	6,1	7,8	8,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	10,7	28,0	24,4	29,9	22,8	4,7	0,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	3,8	3,5	3,7	18,4	16,8	1,6	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	21,5	23,1	20,2	20,3	36,7	59,0	69,4	47,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	21,4	46,1	8,2	2,9	0,1	1,4	10,0	28,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,7	4,3	15,7	5,1	3,6	1,4	0,5	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,7	4,1	19,6	37,5	72,5	59,9	56,9	25,8	14,0	15,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	4,4	11,5	14,8	19,7	23,5	16,1	11,9	2,5	1,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,7	2,8	2,0	3,7	3,9	3,3	2,2	1,3	0,2	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	9,7	29,4	23,4	6,5	2,5	1,2	0,8	0,3	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,5	1,6	2,9	5,0	11,9	13,7	16,2	9,8	11,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,1	1,4	2,6	4,8	8,5	8,4	7,8	3,7	2,0
14	Faggeta termofila e basso montana	2,3	5,8	16,7	29,0	40,7	66,8	66,0	63,3	35,5	20,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,2	12,6	38,9	60,8	40,0	17,7	4,8	1,5	0,8	1,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	1,6	2,6	4,0	3,8	19,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	0,6	1,3	4,4	13,2	42,3	69,7	77,4	65,9	110,8
21	Ostrieto mesofilo	0,3	1,1	2,9	4,2	9,4	18,8	23,9	25,5	18,5	21,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,8	2,8	3,6	6,1	14,4	10,7	11,6	4,7	1,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,0	12,9	14,8	13,9	9,3	5,7	3,5	2,3	0,9	1,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	5,2	16,3	16,7	20,2	22,1	21,0	13,5	4,5	1,6
27	Querceto a roverella tipico	0,1	1,5	6,8	12,3	13,9	8,5	3,4	1,0	0,2	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,3	9,7	35,2	65,1	69,2	56,2	34,0	19,6	5,2	2,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,5	6,0	20,1	26,9	26,9	20,7	10,5	4,7	1,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,2	0,9	2,9	7,2	7,9	6,7	4,0	1,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,3	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	17,3	50,5	128,9	101,1	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	22,9	11,7	53,1	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	2,0	7,5	8,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	1,5	36,4	35,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	15,1	37,0	15,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	27,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	25,3	143,5	138,8	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	57,8	70,8	23,4	27,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	4,1	11,8	11,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	7,2	92,8	126,0	97,4	49,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	20,2	39,5	46,8	18,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	6,6	13,9	6,0	24,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	43,4	17,9	6,7	4,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	20,8	30,3	50,1	18,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	5,9	35,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	67,3	79,3	48,4	28,5	65,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	19,6	52,8	26,2	18,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,5	10,9	10,0	8,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	108,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	167,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	902,9
11	Cerreta mesoxerofila	19,9
12	Faggeta altomontana rupestre	60,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	613,5
14	Faggeta termofila e basso montana	506,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	284,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	19,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	121,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	13,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,3	1,2	11,7	33,5	26,9	12,7	11,8	9,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,9	7,9	27,0	75,5	43,5	8,0	1,8	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	31,1	99,9	204,0	258,0	219,4	65,8	12,3	12,2
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,2	2,0	5,9	6,0	4,6	0,3	0,1	0,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	3,9	3,9	11,6	15,3	4,7	3,8	8,2	8,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,0	35,5	47,0	91,2	141,7	107,6	60,1	64,4	64,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,4	23,8	29,3	100,9	142,4	97,1	36,4	37,4	38,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,4	15,1	63,3	92,9	61,5	19,8	18,0	10,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,8	0,7	1,4	8,5	4,9	0,8	1,5	1,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	12,0	10,6	19,0	31,6	26,6	10,3	5,1	6,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,4	4,4	7,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,6	33,5	39,9	21,6	7,4	2,1	0,4	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,1	37,6	79,3	36,9	8,5	1,2	0,3	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	26,1	146,6	299,2	229,8	115,4	48,2	20,7	9,8	4,9	2,2
11	Cerreta mesoxerofila	0,7	2,2	5,7	5,1	3,1	1,4	0,7	0,7	0,2	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,5	5,9	7,5	9,6	9,5	8,8	7,1	4,9	2,4	3,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	24,0	104,7	152,5	128,5	89,7	56,5	32,8	15,3	6,5	2,9
14	Faggeta termofila e basso montana	12,8	100,6	177,1	120,0	56,4	20,3	9,5	5,2	2,7	2,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,7	57,1	117,0	73,2	25,1	4,9	0,9	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	0,3	0,5	0,7	1,5	2,3	2,9	3,4	3,2	4,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	0,9	1,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	22,7	19,7	30,0	25,4	14,4	5,8	2,2	0,7	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,9	6,1	5,0	1,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	71,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	3,7	10,1	9,6	71,0	72,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	139,5	442,9	271,4	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	2,5	4,4	9,1	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	31,7	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	177,6	413,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	171,2	310,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	20,0	29,4	38,8	156,9	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,1	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	40,5	39,5	16,5	24,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	7,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	9,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	6,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	24,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	151,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	4,6
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	9,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	2,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	101,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	28,0
18	Lecceta rupicola	1,2
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	41,4
21	Ostrieto mesofilo	12,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	88,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,9
26	Querceto a roverella pioniero	38,1
27	Querceto a roverella tipico	45,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	184,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	181,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	32,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	2,0	1,5	0,5	2,5	2,9	0,3	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,8	12,6	10,5	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,4	14,7	39,8	21,4	21,5	26,0	16,3	8,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,1	3,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	2,5	1,5	1,2	0,5	0,4	0,9	0,8	1,3
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	11,3	20,8	15,0	4,1	5,6	12,6	15,4	16,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	7,7	19,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,2	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,7	7,1	10,9	6,1	5,2	0,7	1,8	4,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	5,2	1,7	0,1	0,0	0,1	0,3	0,9	3,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	15,2	63,3	5,5	0,1	0,1	1,6	1,5	1,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	4,5	2,8	2,6	3,3	4,1	5,2	6,8	6,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,1	1,9	1,6	10,6	11,0	8,1	3,9	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,3	14,9	28,2	2,3	0,2	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	6,8	26,1	27,4	27,3	19,8	40,0	29,9	6,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	10,3	29,5	41,1	43,0	19,8	15,1	15,9	7,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,3	4,8	8,1	1,0	2,4	7,5	6,1	1,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	1,1	2,3	2,0	1,2	0,6	0,8	0,7	0,4	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,7	2,0	0,9	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,1	4,2	7,2	6,0	4,0	1,4	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,0	7,5	26,3	33,1	30,3	25,4	19,3	7,5	1,2	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,1	0,3	1,2	1,4	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	4,1	1,3	0,3	0,2	0,7	1,0	0,5	0,5	0,3	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,4	0,9	0,9	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,3	12,8	18,5	18,2	16,5	11,0	7,6	4,8	3,0	1,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,1	0,1	0,3	0,9	2,9	7,6	6,1	7,5	2,2	0,3
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	2,3	6,7	6,0	5,2	6,9	5,9	5,1	2,3	0,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,3	1,4	2,6	3,0	2,7	1,3	0,5	0,1	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	1,4	3,6	6,1	12,9	20,3	20,3	15,0	6,0	2,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	13,9	5,2	5,9	3,9	3,1	2,4	0,9	0,5	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,1	5,3	12,0	10,5	5,1	2,2	0,7	0,2	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,7	3,1	6,8	12,1	11,6	7,4	3,1	0,7	0,2	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,0	21,7	32,8	37,8	33,1	26,4	16,5	9,3	2,0	0,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	13,6	15,8	32,3	39,4	36,5	22,7	15,9	4,4	0,8	0,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,7	6,4	8,4	6,2	3,7	2,3	1,3	0,4	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	2,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	6,9	10,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	10,2	114,4	25,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	2,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	55,1	23,9	19,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	11,2	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	8,1	21,3	7,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	12,7	55,2	19,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	14,6	17,7	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	20,3	16,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	12,3	31,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	84,2	99,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	39,8	120,5	11,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	30,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	190,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	73,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	4,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	2,1
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	151,4
11	Cerreta mesoxerofila	79,2
12	Faggeta altomontana rupestre	138,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1185,4
14	Faggeta termofila e basso montana	475,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	74,4
16	Lecceta costiera termofila	27,3
17	Lecceta mesoxerofila	475,8
18	Lecceta rupicola	38,8
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	190,9
21	Ostrieto mesofilo	213,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	146,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	56,5
26	Querceto a roverella pioniero	7,4
27	Querceto a roverella tipico	46,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	779,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	106,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	15,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,5	0,0	0,1	11,7	68,3	55,7	44,3	9,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,7	0,1	0,3	4,7	16,1	14,4	29,8	7,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,7	0,6	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	23,0	100,8	26,2	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	17,6	27,7	11,7	5,9	5,1	4,2	4,2	2,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	0,6	1,5	20,5	49,9	43,7	15,6	6,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	143,3	127,1	121,7	87,7	94,3	125,6	286,0	199,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	51,2	50,1	37,2	27,7	69,6	67,7	84,2	87,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,0	16,1	11,6	3,0	5,4	12,2	8,4	11,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	6,2	15,5	2,6	1,1
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	4,4	0,0	9,7	45,5	97,4	151,3	124,7	43,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,7	8,5	7,4	4,2	11,5	4,6	0,9	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	6,9	23,6	32,6	35,8	41,5	19,2	14,2	17,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	38,3	75,9	29,2	11,9	34,4	11,8	6,1	6,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	10,0	30,6	30,2	24,4	15,1	8,8	10,1	17,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,7	8,7	5,7	3,7	8,1	12,8	8,2	4,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,5	1,6	1,4	1,1	2,2	0,3	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,3	8,1	14,7	17,4	5,6	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	33,8	87,1	58,4	33,1	111,5	241,2	153,9	60,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	13,7	56,2	26,9	8,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,2	0,7	5,2	1,0	0,5	0,9	4,5	2,1	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,4	6,8	18,2	25,0	33,0	34,3	30,6	19,1	13,6	9,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	1,2	3,9	11,4	21,8	18,3	11,6	3,2	1,1	0,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,9	0,8	1,1	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,2	1,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	1,5	2,2	17,6	45,2	43,0	24,4	10,3	3,8	2,4	0,8
11	Cerreta mesoxerofila	5,4	5,5	17,9	24,4	15,6	7,0	2,2	0,7	0,4	0,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	1,2	2,3	6,6	15,0	29,7	34,6	27,7	15,3	5,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3,0	10,7	33,7	77,7	167,2	279,0	255,1	209,9	102,7	46,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,5	2,5	10,0	24,6	54,9	94,0	106,4	90,9	58,1	33,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,7	8,1	20,9	20,0	10,5	5,0	1,9	0,8	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,3	0,8	2,2	7,8	6,3	8,5	1,3	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,2	0,9	3,6	15,5	51,9	107,5	118,2	99,3	56,5	22,2
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,6	3,7	5,6	5,3	21,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,5	2,3	4,7	9,5	18,2	31,8	38,9	36,3	26,5	22,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	1,2	5,2	15,1	31,3	42,4	47,2	35,8	35,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	1,1	4,4	10,6	26,2	32,4	34,2	24,3	13,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,9	15,2	8,8	3,8	1,9	1,0	0,3	0,3	0,1	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	1,3	2,4	2,3	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,4	15,8	11,5	6,2	5,0	3,6	1,7	0,7	0,2	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	27,1	151,6	207,3	172,0	112,8	61,1	29,8	12,9	3,7	1,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,5	6,2	18,7	30,0	26,2	16,2	6,1	2,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,7	3,2	3,8	2,7	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	21,8	106,9	55,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	37,1	25,8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,8	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	24,2	89,6	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	61,3	17,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	33,7	32,2	53,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,1	18,0	157,3	345,6	426,9	228,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	1,8	24,7	43,4	130,0	206,5	63,9	4,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	31,3	13,6	1,5	16,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,2	4,8	18,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	12,3	161,0	202,6	93,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	6,3	10,6	17,1	4,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	15,0	67,5	43,6	41,4	11,0	12,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	12,4	71,0	97,7	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	10,5	72,6	42,6	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	49,6	6,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,7	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	8,4	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	187,0	446,1	146,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	19,7	29,9	25,0	28,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	55,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	127,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	24,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	31,1
14	Faggeta termofila e basso montana	66,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	100,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	43,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	4,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	47,3
26	Querceto a roverella pioniero	9,3
27	Querceto a roverella tipico	42,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	587,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	66,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	8,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	9,1	2,8	0,7	0,7	7,0	12,2	15,2	7,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	11,4	22,1	32,9	26,9	12,8	5,1	5,8	10,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	2,1	0,8	2,3	5,0	2,9	2,9	4,4	4,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	1,3	1,3	0,6	0,7	3,4	4,9	9,6	9,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	15,4	8,2	1,8	0,6	2,8	6,9	4,7	26,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	8,2	10,2	18,7	20,3	13,3	10,0	9,0	10,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,4	7,0	7,5	9,5	8,9	0,7	2,7	4,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,2	0,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	6,5	4,6	4,7	2,1	4,7	6,2	8,0	10,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	0,9	2,2	1,2	1,3	3,0	0,0	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,6	7,8	4,6	9,6	5,1	2,0	5,6	3,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	58,4	50,1	52,8	103,0	81,3	59,4	97,4	85,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	3,5	3,1	7,6	10,7	5,1	22,6	9,1	5,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	3,4	2,0	1,7	0,3
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,4	3,0	10,2	14,1	11,5	7,5	4,2	2,6	1,5	0,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,3	13,0	27,5	31,1	25,9	16,1	7,8	2,8	0,4	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	2,2	3,6	4,3	5,8	4,8	2,6	1,1	0,4	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	3,0	5,5	6,4	7,2	5,1	2,5	1,0	0,1	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1,8	5,2	7,8	10,5	13,4	13,5	9,0	4,4	1,1	0,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,5	17,6	27,7	22,6	14,7	8,7	3,4	1,3	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,0	7,4	9,4	10,7	8,2	3,8	1,9	0,6	0,2	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,6	1,0	1,3	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,6	8,3	6,4	5,0	5,0	4,5	3,7	2,4	1,0	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	1,1	1,9	2,5	1,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,7	4,3	5,4	8,9	7,7	7,1	4,7	3,1	0,8	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,9	37,2	68,0	79,0	88,5	99,0	91,2	67,5	33,0	14,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	2,6	5,2	8,9	11,7	13,4	12,6	8,4	3,0	1,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,3	0,2	0,5	1,3	1,7	1,7	1,4	0,6	0,2	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	8,5	42,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	24,2	91,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	19,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	55,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	24,5	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,6	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	24,5	11,5	1,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,2	8,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	2,8	20,2	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	77,5	234,6	149,1	124,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	1,2	56,1	6,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	51,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	145,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	17,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	28,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	10,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	22,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	293,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	43,1
21	Ostrieto mesofilo	88,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	66,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	5,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,1
26	Querceto a roverella pioniero	95,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	106,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	447,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	353,8
32	Robinetto-ailanteto	14,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	2,3	1,8	3,7	9,4	14,1	19,0	1,1	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	18,5	48,6	13,0	9,3	13,6	26,7	9,9	6,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,6	2,9	5,1	7,9	0,9	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,6	3,6	0,5	2,0	8,6	9,8	0,8	0,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,6	3,3	0,2	0,1	0,8	3,2	1,1	0,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	10,0	7,4	0,3	0,0	0,0	3,4	0,6	1,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	8,4	16,5	17,5	20,3	62,1	136,4	24,7	7,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,4	2,3	5,8	4,2	16,1	9,3	2,1	0,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	7,2	41,6	16,8	0,7	7,4	10,9	1,6	2,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,9	2,5	0,6	3,8	51,1	5,3	2,4	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,6	1,1	0,0	0,1	0,2	0,9	1,7	1,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	1,1	0,8	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,8	4,3	4,8	14,9	26,6	39,8	4,0	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,2	20,6	4,1	4,9	15,4	26,4	30,7	1,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	16,1	44,4	12,6	23,8	78,5	189,2	65,0	18,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	73,0	84,6	20,3	11,2	27,1	77,3	33,5	26,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,4	3,7	2,1	1,2	2,7	3,8	0,5	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,4	4,6	11,1	15,5	11,6	5,5	1,6	0,9	0,3	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,4	6,7	18,8	34,8	38,6	29,1	13,0	3,0	0,2	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,6	2,9	4,8	4,4	2,6	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,3	9,4	7,3	6,5	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,2	0,3	0,8	1,5	2,0	2,3	1,8	0,6	0,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,9	2,9	4,8	5,6	4,7	2,5	1,0	0,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	44,0	71,3	82,1	58,7	27,2	8,3	1,9	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	1,4	4,0	4,8	6,1	9,8	8,3	6,3	2,0	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,6	1,7	2,4	5,9	9,7	21,8	19,9	19,2	5,5	1,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	2,3	9,6	16,5	18,6	11,2	6,9	1,4	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	1,0	1,6	1,5	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,6	1,7	0,6	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,4	11,3	21,0	25,5	17,7	12,2	3,2	1,5	0,4	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,3	12,4	11,6	19,0	25,7	20,5	9,6	3,1	0,4	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	9,0	49,1	95,4	121,9	100,8	53,6	13,9	3,6	0,6	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,8	15,7	42,4	73,5	87,9	71,6	40,9	14,7	2,0	0,3
32	Robinieta-ailanteto	1,4	2,7	2,4	3,0	2,3	1,8	0,7	0,1	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	3,1	29,3	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	29,7	78,5	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	1,5	5,8	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	13,8	8,1	1,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,8	42,8	197,0	45,0	7,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	5,3	23,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	55,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	6,7	36,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	21,8	46,1	13,6	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	16,9	72,9	14,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	8,3	194,8	243,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	214,6	78,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,1	11,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	26,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	451,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	21,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	4,2
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	46,8
11	Cerreta mesoxerofila	54,8
12	Faggeta altomontana rupestre	302,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1413,9
14	Faggeta termofila e basso montana	621,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	421,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	16,0
19	Mugheta appenninica	10,0
20	Orno-ostrieto pioniero	136,2
21	Ostrieto mesofilo	14,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	329,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	125,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	28,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	23,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	6,0	14,1	1,3	1,2	2,4	0,5	0,0	0,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	6,4	16,1	43,3	94,8	167,7	88,3	28,6	5,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,9	3,9	3,3	1,6	2,3	2,9	4,4	0,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,1	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	3,4	8,5	18,9	3,7	8,2	1,6	1,1	1,3
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	20,3	29,3	3,3	0,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,6	20,0	20,6	31,6	34,3	53,4	60,1	62,0	20,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,0	238,7	209,6	207,4	217,4	190,2	116,3	113,8	119,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	67,2	96,3	128,4	116,4	84,1	61,1	44,9	22,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	49,4	87,5	76,6	36,9	71,0	53,5	21,1	25,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	5,7	5,3	1,9	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,2	4,3	1,2	0,1
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	1,8	3,8	27,5	25,5	29,5	26,4	14,5	7,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	6,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3	31,8	29,0	30,1	36,6	68,9	64,0	38,5	30,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	33,2	21,1	13,7	3,8	11,1	15,2	5,0	22,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,7	1,6	2,2	1,0	6,0	4,9	5,7	5,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	13,8	6,1	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,0	3,6	8,7	9,1	2,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	14,0	36,4	56,8	70,9	79,2	74,3	55,9	40,1	14,4	9,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,6	6,7	6,2	2,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,1	0,1	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	2,2	3,8	8,3	11,6	9,2	6,5	3,5	1,3	0,3	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	1,9	6,6	8,7	9,7	9,7	9,1	5,6	2,7	0,9
12	Faggeta altomontana rupestre	4,6	10,4	26,9	48,7	56,4	59,8	39,6	30,1	15,3	10,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	40,5	109,6	193,4	237,2	242,8	210,0	164,5	104,3	61,6	50,2
14	Faggeta termofila e basso montana	5,4	22,1	47,5	81,1	106,1	118,8	103,4	75,7	40,0	21,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	31,1	94,8	131,4	99,2	43,7	14,9	4,6	1,4	0,4	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,5	0,5	0,6	0,6	1,0	1,2	1,8	1,8	7,9
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	2,7	2,4	2,7	1,0	0,1
20	Orno-ostrieto pioniero	5,9	12,8	21,3	26,3	18,8	12,8	9,4	7,3	5,5	16,1
21	Ostrieto mesofilo	0,1	0,2	1,8	3,6	2,9	2,2	0,8	1,0	0,5	1,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	7,9	18,3	20,2	21,0	26,6	41,8	48,3	48,1	37,6	59,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	11,9	34,2	32,2	22,5	12,3	5,8	2,9	1,5	0,7	1,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,0	3,8	7,0	6,7	5,2	3,1	1,1	0,5	0,3	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,1	2,2	7,3	7,3	5,1	1,3	0,3	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	24,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	77,0	41,3	122,8	169,3	27,6	0,9	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,8	19,8	96,5	172,9	9,7	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	94,2	370,9	779,2	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	272,7	227,1	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	357,3	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	8,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	7,6	1,2	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	39,5	63,2	16,6	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	144,8	108,8	41,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	88,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	19,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	7,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	504,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	51,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	175,9
11	Cerreta mesoxerofila	47,8
12	Faggeta altomontana rupestre	292,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1129,4
14	Faggeta termofila e basso montana	775,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	63,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	85,9
21	Ostrieto mesofilo	54,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	113,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	51,9
26	Querceto a roverella pioniero	27,0
27	Querceto a roverella tipico	8,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	191,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	60,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	1,5	3,8	0,5	0,0	0,8	0,5	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,3	14,8	27,3	46,3	21,4	39,8	201,3	136,7	16,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	8,0	13,9	8,6	1,2	2,8	4,1	10,1	3,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	13,8	35,5	53,6	12,2	2,5	6,0	40,9	11,4
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	2,1	0,8	1,9	0,7	2,8	12,2	15,0	12,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,9	5,6	5,7	7,3	9,2	13,8	170,6	70,2	8,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	164,6	213,5	72,4	42,3	88,7	188,1	211,3	147,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,6	59,0	159,9	227,7	40,7	8,5	49,4	196,0	34,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,5	2,4	7,8	3,3	2,0	11,6	23,3	11,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	2,3	5,2	4,2	1,8	5,4	18,8	42,0	6,0
21	Ostrieto mesofilo	0,1	1,0	0,3	0,0	2,0	12,1	17,8	10,1	11,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,6	0,8	0,2	0,0	0,1	13,3	81,9	15,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,2	6,2	4,4	0,7	0,8	7,2	18,5	8,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,5	3,4	11,3	3,9	0,2	1,4	6,3	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,2	2,7	1,2	0,1	1,3	2,8	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,3	4,9	83,9	20,9	1,1	8,7	63,6	8,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,8	6,5	7,2	3,5	0,0	9,2	29,0	2,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,9	2,3	2,0	0,9	0,6	0,1	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	13,6	47,6	73,8	99,2	123,0	89,3	53,0	4,2	0,3	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,0	12,7	17,4	11,0	5,6	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	3,4	20,2	40,4	43,2	34,5	19,3	10,0	3,6	0,9	0,2
11	Cerreta mesoxerofila	2,4	7,0	11,3	9,9	7,0	4,9	3,4	1,5	0,4	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	5,1	8,0	17,1	44,9	89,6	80,7	39,1	6,4	1,2	0,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	21,8	93,0	197,8	251,5	245,3	178,3	99,3	31,7	8,3	2,3
14	Faggeta termofila e basso montana	10,2	40,1	95,4	137,0	174,2	148,8	110,2	49,7	8,8	1,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,5	11,6	22,2	16,5	6,8	2,8	0,6	0,3	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,3	13,2	17,2	13,1	11,4	8,9	9,5	4,8	3,1	2,4
21	Ostrieto mesofilo	0,4	0,5	1,2	4,2	8,5	11,8	13,5	8,9	4,6	1,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	1,0	4,6	24,3	26,5	33,9	13,5	7,3	2,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,3	0,8	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,6	14,2	10,9	7,9	4,4	1,1	0,5	0,1	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	2,1	6,0	7,5	6,2	2,8	1,1	0,7	0,3	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	2,3	2,8	1,6	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	3,1	14,6	29,9	43,3	42,3	31,8	19,1	6,2	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	1,4	4,2	14,3	16,8	12,8	8,0	1,8	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,2	1,4	0,5	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	23,3	102,5	86,8	158,5	94,4	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	31,8	11,0	1,4	5,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,3	63,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	18,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	48,4	86,2	154,4	0,3	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	265,4	547,4	280,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	470,7	253,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	53,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	27,1	15,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	19,6	10,3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	68,3	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	43,2	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	24,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	132,6	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	42,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	470,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	11,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	49,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	22,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	3,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	124,9
14	Faggeta termofila e basso montana	251,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	44,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	3,7
18	Lecceta rupicola	2,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	20,6
21	Ostrieto mesofilo	21,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	25,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	44,3
26	Querceto a roverella pioniero	104,5
27	Querceto a roverella tipico	27,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	183,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	351,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	6,9
32	Robinieta-ailanteto	1,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	61,1	48,0	89,2	79,4	34,6	11,2	53,2	93,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,9	2,8	4,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	21,3	5,1	1,7	1,2	0,0	0,0	2,4	17,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	8,0	2,3	0,1	5,1	4,2	0,4	0,8	1,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	5,5	3,1	0,5	0,0	0,0	0,1	62,0	53,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	54,6	74,4	3,1	0,0	0,0	0,2	38,2	81,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	6,8	1,7	3,6	11,5	1,8	0,2	3,0	15,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,2	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,3	7,5	0,7	0,0	0,0	0,2	5,5	3,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	2,6	18,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	9,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	9,1	6,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,5	2,1	6,1	7,9	1,2	0,3	4,2	14,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,6	3,3	40,2	37,5	10,9	1,5	3,2	6,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,3	0,1	4,8	5,2	0,0	0,1	4,2	11,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	36,2	11,7	23,3	31,1	5,3	2,4	20,6	53,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	95,8	13,2	0,5	0,7	0,1	5,0	61,6	174,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,8	26,5	64,9	80,3	91,7	92,7	63,1	38,8	7,5	2,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	0,3	2,8	3,5	2,2	1,5	0,8	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,4	7,9	16,3	14,1	7,7	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,4	6,0	9,6	3,9	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,9	0,7	0,6	0,1	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	1,2	4,1	12,3	28,1	37,1	22,5	17,3	2,1	0,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	1,0	6,7	23,6	51,8	69,8	56,7	35,7	6,1	0,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,8	7,0	8,1	8,6	8,9	5,0	2,0	0,6	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,3	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,7	3,3	3,6	2,4	3,6	3,0	2,9	1,0	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	6,3	7,3	5,9	0,5	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,3	1,5	4,4	6,9	6,3	3,8	2,1	0,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	13,4	12,0	7,8	5,3	3,8	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,4	3,4	6,8	10,1	17,8	24,2	19,1	15,6	5,4	1,8
27	Querceto a roverella tipico	0,9	2,4	3,9	5,7	6,0	4,7	2,7	1,1	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	8,2	14,9	22,1	31,3	40,1	31,7	25,1	8,7	1,4	0,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	7,3	36,0	68,1	93,4	76,1	48,2	18,2	2,8	1,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,5	2,9	1,0	2,4	0,1	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	0,5	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	55,7	97,7	191,8	123,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	7,8	0,4	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	3,8	41,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	12,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	77,2	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	71,3	143,8	25,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	11,7	30,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	6,2	10,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	3,6	17,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	7,2	11,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	23,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	5,9	45,3	35,6	12,9	4,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	8,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	5,2	125,9	42,9	2,5	0,4	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	47,3	152,4	105,9	44,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	15,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	32,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	113,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	105,2
9	Castagneto da frutto	1,1
10	Cerreta mesofila	0,6
11	Cerreta mesoxerofila	1,6
12	Faggeta altomontana rupestre	91,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	791,4
14	Faggeta termofila e basso montana	389,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	93,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	1,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	529,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	16,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	45,6
26	Querceto a roverella pioniero	2,1
27	Querceto a roverella tipico	12,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	893,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	106,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	13,4
32	Robinieta-aillanteto	2,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	4,1	2,8	1,3	1,7	0,8	3,4	0,7	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	7,6	8,6	5,5	4,2	1,9	0,6	1,5	2,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	11,3	22,9	15,0	13,0	11,8	12,0	17,5	9,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	10,8	8,6	22,4	19,0	14,4	16,1	6,5	7,4
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
10	Cerreta mesofila	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	11,9	8,7	6,7	13,5	20,0	17,9	7,9	5,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	158,2	321,7	108,8	66,0	32,8	28,1	29,2	46,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,7	56,2	63,5	86,4	61,7	37,9	38,1	16,2	29,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	19,1	18,5	13,1	11,8	9,6	6,2	4,6	10,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,4	71,0	89,6	33,8	29,9	79,2	133,5	60,6	31,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	5,3	5,5	0,8	0,0	0,1	0,4	2,6	1,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,5	1,9	3,1	1,1	2,9	10,1	16,3	6,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,2	1,6	1,0	5,9	3,3	0,6	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	92,3	132,2	102,9	79,1	145,9	150,6	124,7	65,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	12,6	33,6	16,9	6,0	6,9	4,4	11,1	14,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	1,3	5,3	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	0,5	2,5	4,4	3,8	2,6	1,0	0,2	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	2,5	7,1	10,0	6,5	3,4	1,6	0,9	0,5	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,0	15,8	30,5	28,6	18,9	10,2	5,1	1,6	0,4	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	1,4	6,9	14,2	18,8	22,1	18,9	12,1	6,7	3,3	1,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	0,4	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	5,1	12,0	19,4	23,0	18,9	8,7	3,4	1,0	0,1	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	11,8	41,9	82,7	136,6	170,4	166,2	109,5	56,5	13,8	2,1
14	Faggeta termofila e basso montana	13,5	43,3	67,0	85,0	83,7	56,5	28,3	10,7	1,6	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,5	17,9	22,6	20,1	14,2	8,0	3,2	0,7	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,2	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	19,8	38,6	69,4	98,7	119,1	93,1	58,9	22,8	6,9	2,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,8	1,3	2,8	3,6	3,3	2,1	1,4	0,7	0,3	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,9	5,4	6,7	8,0	7,8	6,5	3,7	1,2	0,3	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,2	1,0	1,9	2,0	2,9	2,0	2,1	0,5	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	11,2	55,5	117,6	154,8	187,7	171,1	116,2	60,4	15,7	3,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,8	6,0	12,4	16,0	17,9	20,1	15,8	10,5	4,6	1,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,3	1,2	3,2	4,2	2,6	1,5	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	3,2	82,7	17,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	53,6	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,7	398,4	157,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,1	185,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,1	37,6	46,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	400,7	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	34,5	8,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	39,6	568,0	242,3	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	7,4	77,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	67,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	7,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	22,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	118,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	9,4
18	Lecceta rupicola	20,8
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	30,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	16,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	50,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	47,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	109,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	5,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	1,3	13,1	19,5	21,1	11,5	0,9	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	5,9	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,1	3,4	6,9	3,0	6,7	1,1	0,2	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,4	13,6	11,2	6,7	43,9	25,7	2,8	1,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,3	5,7	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	16,8	1,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,7	7,7	4,8	3,3	3,2	5,7	1,7	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	1,0	4,2	5,1	3,8	2,7	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	1,5	22,9	12,5	8,1	5,3	0,5	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	4,2	14,2	3,4	7,1	18,7	0,2	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	4,8	3,9	0,4	2,1	60,2	33,9	2,5	1,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	4,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,8	5,4	13,6	22,8	15,0	8,2	1,7	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	1,4	1,7	1,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,4	3,5	6,1	5,8	3,9	1,2	0,2	0,1	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,6	19,7	32,3	24,7	17,6	12,2	5,2	1,4	0,4	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,8	2,4	3,4	1,7	0,8	0,2	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,2	0,3	2,5	5,9	6,9	3,9	0,8	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3	1,8	5,6	7,7	7,2	4,8	2,1	0,7	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,4	4,0	5,2	3,8	1,7	0,5	0,2	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	2,1	9,4	14,6	12,2	8,9	2,7	0,7	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,4	3,8	10,4	14,6	11,1	5,8	1,5	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,6	3,4	13,7	26,9	30,0	21,1	9,4	3,7	0,6	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	1,2	1,1	0,9	0,5	0,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	3,5	22,8	40,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	3,9	37,8	56,4	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	2,7	7,6	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	17,1	28,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	7,0	33,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	75,2	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	17,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	674,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	15,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	223,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	651,6
14	Faggeta termofila e basso montana	417,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,4
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,8
21	Ostrieto mesofilo	27,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	13,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	20,0
26	Querceto a roverella pioniero	8,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	17,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	74,6
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	0,8	3,1	0,1	0,1	4,1	5,7	2,0	1,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	22,2	8,9	15,7	25,6	97,1	215,4	230,4	59,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	6,5	4,5	1,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	6,5	83,0	109,7	22,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	6,1	2,8	2,1	2,4	11,5	160,4	394,8	71,4
14	Faggeta termofila e basso montana	1,0	68,1	64,0	14,9	7,6	27,6	91,5	88,4	54,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,9	1,2	0,2	0,1	2,2	3,8	1,7	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,5	3,1	0,1	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,3	1,3	0,8	0,6	1,6	12,9	8,8	0,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,1	3,9	1,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,5	1,8	0,3	0,1	0,4	2,6	4,3	7,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	5,4	0,6	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,0	4,2	9,9	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	20,4	9,7	4,3	3,0	6,3	18,3	6,6	5,9
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,5	2,7	4,0	3,2	2,2	1,6	0,7	0,3	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	39,6	88,8	117,8	113,6	86,0	72,3	56,7	46,6	30,5	22,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,1	4,8	5,4	2,2	1,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	1,8	5,7	17,8	36,0	49,9	44,7	34,0	33,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,7	27,5	58,9	86,7	136,2	139,8	115,3	60,4	15,5	4,5
14	Faggeta termofila e basso montana	29,3	69,1	97,0	80,1	55,3	41,9	28,3	11,8	3,6	1,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2	2,6	2,9	2,9	1,3	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,8	1,5	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	2,1	4,8	5,0	4,0	4,3	3,5	2,3	0,9	0,1	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,4	1,3	3,5	3,1	3,4	1,4	0,2	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,7	4,0	4,0	3,6	3,4	2,0	1,1	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,2	0,8	1,9	2,5	2,1	1,1	0,3	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,3	0,9	4,0	5,0	5,1	2,0	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	9,4	12,7	16,9	12,8	11,6	7,3	3,6	0,3	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,7	96,0	33,2	110,2	163,1	68,1	3,2	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	26,8	104,0	88,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	250,0	206,7	92,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	259,5	89,6	14,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	1,9	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	8,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	2,3	4,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	3,7	12,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	726,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	447,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	47,2
11	Cerreta mesoxerofila	3,3
12	Faggeta altomontana rupestre	25,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	535,2
14	Faggeta termofila e basso montana	231,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	157,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	3,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	189,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	48,4
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	51,4	81,2	116,9	115,8	126,6	112,7	80,4	41,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,3	24,3	34,9	45,4	51,2	76,2	92,8	79,4	42,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,2	5,3	8,3	13,4	12,7	7,2	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	0,7	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	5,5	3,6	1,0	0,8	2,3	4,2	2,4	5,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	68,6	31,8	32,6	35,6	62,0	104,7	112,9	86,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	21,0	18,9	22,2	24,1	33,8	42,4	40,9	28,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	11,3	11,1	10,2	14,9	23,8	39,7	30,5	16,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,4	0,4	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	35,4	27,5	28,0	11,7	17,5	19,5	23,2	26,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	8,1	6,5	17,9	8,3	1,5	0,3	1,4	4,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,3	0,5	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	7,5	51,5	136,7	191,5	174,5	109,4	42,8	11,1	1,1	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	34,5	81,5	95,7	94,7	74,6	43,5	17,6	4,3	0,6	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,4	5,2	12,2	15,4	9,1	4,2	0,6	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,1	0,9	1,2	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,6	1,8	3,1	4,6	5,1	4,6	3,0	1,2	0,4	0,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,2	17,6	48,6	72,9	96,6	107,0	88,6	59,5	29,1	11,2
14	Faggeta termofila e basso montana	1,5	8,2	28,1	51,3	57,6	44,2	24,7	10,4	3,7	1,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,4	27,5	30,3	33,5	29,4	16,8	7,3	2,5	0,8	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	0,8	0,8	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	29,4	27,7	32,7	35,9	27,9	19,8	10,9	4,2	0,6	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	1,8	5,3	9,5	12,3	10,9	5,9	2,4	0,2	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	325,5	399,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,2	264,7	9,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	18,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	69,8	290,3	168,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	98,5	116,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	156,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	11,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	80,8
9	Castagneto da frutto	40,2
10	Cerreta mesofila	9,1
11	Cerreta mesoxerofila	102,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	473,7
14	Faggeta termofila e basso montana	70,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	193,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	4,1
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	21,2
21	Ostrieto mesofilo	66,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	14,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	28,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	36,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	225,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	6,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	0,7	0,9	2,5	1,5	3,8	1,6	0,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	1,5	0,1	0,2	0,4	0,7	0,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	17,4	13,2	14,0	12,4	2,8	0,7	7,2	13,0
9	Castagneto da frutto	0,0	7,8	6,5	8,4	1,7	2,6	4,0	3,9	5,4
10	Cerreta mesofila	0,0	0,1	0,1	1,0	0,7	0,4	1,5	3,9	1,3
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	8,6	23,7	17,5	2,5	0,9	3,6	29,6	16,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	52,3	146,2	133,9	74,0	23,9	20,2	4,6	18,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,7	19,6	25,1	1,8	6,2	12,3	4,1	0,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	12,8	43,0	63,6	20,1	13,3	26,0	9,1	5,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,3	2,7	0,3	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	1,9	1,9	0,7	5,2	10,3	1,2	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,4	13,2	23,4	3,0	15,2	11,7	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,9	4,7	7,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,4	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,7	6,2	5,1	1,4	2,6	2,0	2,6	2,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	24,8	2,1	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,2	17,6	32,2	10,2	19,6	109,2	29,3	4,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,4	0,7	0,2	0,1	0,4	1,6	1,8	1,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,5	2,5	3,7	2,8	1,6	0,5	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,0	0,9	0,4	0,7	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,4	2,0	6,3	13,7	16,2	16,8	11,6	7,5	4,0	2,2
9	Castagneto da frutto	0,1	0,7	3,4	6,8	8,7	8,9	6,3	3,4	1,5	0,5
10	Cerreta mesofila	0,0	0,1	0,4	0,9	1,2	1,6	1,9	1,4	1,2	0,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,6	3,4	13,4	29,4	27,4	17,3	6,7	2,8	1,0	0,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	10,0	19,8	32,6	50,5	64,6	84,0	84,9	71,1	40,3	16,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	0,9	3,8	13,8	17,3	12,9	7,0	4,6	4,3	5,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,6	10,5	43,0	60,8	45,1	21,1	7,4	2,2	0,5	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,5	0,9	0,5	0,4	0,2	0,2	0,4	0,9
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,3	4,2	4,9	6,2	2,6	1,1	0,6	1,3
21	Ostrieto mesofilo	0,1	0,3	1,6	8,3	14,8	17,0	8,1	5,4	5,0	6,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	1,7	4,1	3,6	2,1	0,8	0,5	0,4	0,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,6	2,8	4,9	5,0	4,5	3,0	1,6	0,7	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,3	1,9	5,5	11,1	8,8	7,9	0,7	0,1	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	8,2	6,4	18,7	33,4	44,6	51,5	42,1	17,9	2,4	0,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,4	1,1	1,3	1,4	1,3	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	8,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	2,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,3	74,9	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,2	35,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	4,5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	55,3	46,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	59,6	118,6	165,7	124,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	27,8	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	28,8	123,7	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,2	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	44,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,8	12,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	10,3	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	13,4	22,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	18,4	73,5	79,8	51,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	6,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	279,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	183,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	55,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1321,7
14	Faggeta termofila e basso montana	784,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	83,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	10,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	5,3
21	Ostrieto mesofilo	148,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	81,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	25,3
26	Querceto a roverella pioniero	103,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	313,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	83,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	5,7
32	Robinetto-ailanteto	9,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,8	40,7	45,2	14,4	11,3	19,3	59,4	49,1	37,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,2	31,0	34,9	18,1	10,7	18,2	12,7	23,3	33,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	11,2	20,4	3,4	0,6	0,2	4,2	7,0	8,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	387,2	457,3	177,5	61,2	9,2	42,7	86,5	99,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,9	208,9	240,2	66,4	49,9	32,8	42,2	59,2	84,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	23,1	28,4	5,5	2,2	1,1	4,9	6,5	11,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	4,8	0,2	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,3	0,1	0,4	1,0	1,6	1,5	0,0	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,2	14,4	52,1	13,9	6,0	10,2	22,3	20,8	9,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	5,6	5,8	1,6	0,6	9,7	33,4	22,5	2,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,7	5,6	0,7	0,0	0,4	3,4	4,2	3,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,4	4,0	2,3	5,4	4,6	27,0	39,1	14,1	6,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	50,8	96,9	27,1	6,5	20,8	34,9	52,1	24,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	14,4	23,3	7,6	4,1	6,4	12,8	4,2	11,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,3	0,7	0,5	0,7	0,6	0,2	0,6	1,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0	2,0	3,9	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5	1,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	52,1	87,0	74,2	40,9	16,4	5,1	1,9	0,8	0,6	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	40,9	68,2	40,4	20,4	9,1	3,3	1,0	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,4	11,7	11,8	10,1	7,0	4,5	2,1	0,3	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	8,7	34,8	112,6	231,3	334,2	310,1	197,9	72,2	15,9	3,9
14	Faggeta termofila e basso montana	37,1	104,0	160,7	160,0	129,6	96,6	61,0	28,8	5,5	1,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,0	18,3	16,9	12,9	9,8	7,6	4,6	2,3	1,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,2	0,4	1,2	2,8	1,8	2,8	0,9	0,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,9	1,0	1,2	0,7	0,1
21	Ostrieto mesofilo	3,1	12,5	22,5	20,6	22,6	26,6	23,3	14,8	3,0	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,6	2,3	5,7	10,6	16,5	17,5	14,6	9,5	4,0	0,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,8	4,9	4,8	3,9	3,4	2,7	1,9	0,8	0,2	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	12,9	18,4	8,2	6,1	7,8	14,0	15,1	12,6	7,4	1,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	38,2	83,6	52,3	30,1	35,4	33,6	24,0	12,0	3,5	1,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,0	4,5	7,6	9,0	15,5	19,1	14,4	8,4	2,7	0,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,9	1,9	1,5	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,7	4,2	1,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	17,9	167,1	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	137,5	17,8	2,6	11,5	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	5,8	47,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	572,5	444,1	201,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	96,5	618,5	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	13,4	54,4	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	2,6	5,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,1	2,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	1,2	53,6	84,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	14,2	34,1	32,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	11,7	5,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	34,0	67,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,2	85,8	227,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	3,0	73,8	7,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	169,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	6,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	12,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	137,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	12,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	19,0
14	Faggeta termofila e basso montana	137,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	277,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	715,9
18	Lecceta rupicola	38,6
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	43,5
21	Ostrieto mesofilo	62,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	285,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	83,4
26	Querceto a roverella pioniero	124,4
27	Querceto a roverella tipico	1,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	147,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	45,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	98,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	10,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	15,9	45,6	53,6	16,0	5,7	5,0	16,4	11,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	0,5	0,0	0,1	0,5	0,9	0,4	1,8	2,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	1,8	1,3	0,9	6,2	2,4	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	17,3	27,1	27,7	15,1	2,3	11,0	16,0	21,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	5,7	5,1	0,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	2,4	2,7	1,0	0,2	1,0	5,5	3,6	2,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	17,9	4,1	4,2	3,2	3,2	28,3	52,9	24,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	39,3	63,3	44,3	9,2	14,3	30,9	46,1	29,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	44,6	54,9	55,8	46,7	54,2	136,3	237,4	86,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,4	1,4	11,5	4,4	8,9	3,9	6,1	2,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	10,5	10,9	6,9	6,6	1,5	0,8	1,9	4,4
21	Ostrieto mesofilo	0,1	15,5	9,3	2,3	4,3	3,6	1,7	6,9	19,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	11,2	10,8	12,0	19,5	19,8	67,5	127,8	17,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,7	9,2	15,2	9,1	7,9	8,3	10,9	12,3	9,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	21,7	27,8	18,0	6,2	4,1	20,8	11,1	14,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	16,9	11,7	2,8	1,5	2,2	40,1	64,5	8,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	12,8	6,9	3,1	2,8	1,3	3,6	6,7	8,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	9,5	11,2	16,9	28,8	6,0	3,8	14,8	7,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	3,1	2,1	1,1	2,6	0,9	0,3	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	6,0	28,0	31,7	33,4	32,6	21,7	12,0	3,3	0,6	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,1	1,0	0,9	0,8	1,3	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,5	2,2	3,9	2,5	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,8	23,7	29,5	28,9	23,2	15,1	7,1	1,3	0,4	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,2	0,2	0,5	1,4	3,1	2,5	2,9	1,0	0,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,8	3,4	4,4	2,9	2,4	2,6	0,6	0,9	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1,1	3,0	11,8	17,9	17,7	25,3	21,9	24,3	11,1	3,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	30,7	61,4	50,9	56,6	45,1	22,7	8,1	1,4	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	6,0	18,4	49,8	101,8	149,4	159,8	127,2	67,0	26,4	10,1
18	Lecceta rupicola	0,2	0,5	1,0	1,7	4,8	7,7	6,9	7,1	3,9	4,9
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,6	2,7	4,1	5,3	8,6	8,6	6,2	2,7	0,9	2,7
21	Ostrieto mesofilo	1,1	2,6	7,9	14,4	15,2	10,1	6,6	2,9	1,2	0,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,8	6,5	14,3	29,0	48,5	68,9	55,5	45,1	14,2	3,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	41,2	19,3	10,1	6,0	3,8	1,9	0,8	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,7	8,8	17,3	27,9	32,5	20,9	13,0	2,1	0,2	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,3	16,8	29,0	29,4	28,6	20,4	14,9	5,7	1,5	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,6	2,5	4,8	6,9	11,9	11,5	5,5	2,3	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,4	5,4	10,0	20,7	24,9	18,5	9,8	4,3	1,3	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,3	3,5	1,9	1,2	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	16,8	76,4	69,1	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,2	0,0	2,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	21,8	110,1	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	6,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	67,1	67,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	44,5	187,8	20,6	21,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	30,4	236,7	326,9	113,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,4	17,3	7,7	6,7	5,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	11,2	12,6	10,5	7,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	2,2	32,8	24,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	4,8	24,9	145,1	95,1	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	67,5	7,0	1,0	6,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	14,6	81,6	19,6	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	5,7	98,6	37,3	6,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,0	42,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	42,7	54,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	7,7	0,7	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	141,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	37,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	62,0
9	Castagneto da frutto	4,2
10	Cerreta mesofila	36,8
11	Cerreta mesoxerofila	162,4
12	Faggeta altomontana rupestre	14,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	856,2
14	Faggeta termofila e basso montana	171,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	324,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	48,9
18	Lecceta rupicola	17,2
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	40,9
21	Ostrieto mesofilo	331,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	611,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	3,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	32,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	155,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	393,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	30,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	7,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	8,9	32,7	15,6	6,0	21,2	46,0	8,2	2,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	4,9	12,0	3,6	4,0	5,4	4,0	2,4	1,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,3	2,1	3,3	0,9	0,4	0,2	0,1	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	18,9	29,2	6,3	1,5	0,4	0,3	1,2	4,1
9	Castagneto da frutto	0,0	2,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3
10	Cerreta mesofila	0,0	10,4	5,5	3,2	4,5	3,2	0,2	1,7	8,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	19,9	80,4	42,8	8,2	2,2	0,5	2,1	6,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	7,2	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	4,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	217,0	249,1	86,2	39,3	44,5	52,3	76,5	91,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	18,7	101,2	34,0	3,9	1,4	5,0	5,4	1,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	43,0	136,2	43,6	14,8	15,8	31,4	23,1	16,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,2	0,8	7,7	21,6	18,6	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,5	0,3	1,2	4,3	9,8	1,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,0	1,9	7,8	17,7	4,6	5,9	1,7	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	50,6	172,8	49,7	15,7	12,1	7,6	11,3	11,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	122,8	219,9	54,0	4,8	18,7	53,5	64,2	73,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,0	1,6	0,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,4	5,0	2,4	1,3	3,4	5,3	6,0	4,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,0	1,8	3,0	6,0	69,7	69,0	3,0	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	30,5	124,4	30,1	12,1	48,6	74,3	57,9	15,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,9	1,5	0,7	8,6	6,6	8,0	1,5	0,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,5	2,4	0,9	0,7	0,6	0,3	1,2	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,7	8,9	16,9	38,0	39,9	24,0	9,9	1,7	0,1	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,7	5,8	9,0	9,1	7,3	3,1	1,5	0,2	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,0	1,0	1,1	2,0	2,1	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,6	3,8	8,5	12,4	14,0	9,8	6,0	3,6	2,0	1,1
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	1,1	0,8	0,2	0,2	0,0
10	Cerreta mesofila	0,4	2,1	5,4	7,0	6,8	5,6	3,6	2,1	1,4	2,3
11	Cerreta mesoxerofila	2,3	10,6	35,3	47,6	36,1	19,2	7,3	2,3	1,2	0,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	0,4	0,9	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	6,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	23,4	68,3	129,5	173,0	169,4	127,5	82,6	41,3	22,3	18,9
14	Faggeta termofila e basso montana	1,0	2,8	6,1	14,1	31,2	34,2	31,3	21,9	14,6	14,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,1	32,4	67,4	78,9	62,6	40,8	24,0	7,7	1,8	1,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	7,2	12,8	10,9	10,2	6,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,3	3,3	3,3	7,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,3	0,5	0,9	3,1	9,5	8,4	10,1	4,1	4,0
21	Ostrieto mesofilo	0,9	7,8	19,1	32,6	51,0	64,1	59,6	45,6	26,3	24,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,5	8,8	24,7	56,4	116,9	151,0	132,0	80,5	23,9	15,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	0,3	0,3	1,2	1,0	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,1	6,0	4,9	4,5	3,0	2,3	1,4	1,2	1,0	1,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,7	7,5	14,3	23,9	45,2	29,6	29,2	3,5	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	10,8	28,0	60,5	82,0	75,0	62,1	39,1	22,6	7,8	5,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	1,9	3,1	2,0	1,7	7,1	5,4	7,3	1,1	0,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,4	1,2	1,5	2,2	1,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	24,8	108,5	8,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,5	22,4	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	4,4	0,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,2	41,0	20,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,2	31,7	1,2	3,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	59,9	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	8,7	1,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	60,1	119,6	282,1	388,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	36,1	102,8	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	2,5	186,6	117,7	17,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	1,4	23,7	21,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	2,0	13,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	5,2	18,4	13,7	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	189,3	72,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	18,2	327,1	215,8	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	4,8	23,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	42,8	72,4	39,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	11,4	172,0	185,5	20,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	6,8	20,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	3,9	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	11,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	144,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	156,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	26,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	326,8
11	Cerreta mesoxerofila	151,6
12	Faggeta altomontana rupestre	76,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	194,5
14	Faggeta termofila e basso montana	519,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	46,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	13,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	88,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	13,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	100,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	15,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	7,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	193,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	3,0	0,1	0,0	1,4	3,1	2,7	1,3	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	9,3	24,1	23,3	11,8	15,0	34,1	19,4	7,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	8,3	46,5	37,7	25,9	14,1	10,7	10,7	3,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	9,7	10,3	1,7	1,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	25,9	3,0	2,1	10,6	35,2	75,9	98,4	75,7
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	3,0	0,4	1,6	13,3	60,5	38,9	19,1	14,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	0,9	0,7	4,1	25,0	33,9	10,7	1,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	35,4	82,3	13,9	1,0	2,9	10,6	13,7	34,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	102,9	98,1	8,8	2,6	14,9	98,7	109,2	84,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,0	3,0	2,6	2,9	8,4	14,5	10,1	3,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,7	0,2	0,0	2,2	7,9	0,9	0,4	0,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,7	1,2	0,4	10,3	26,2	27,6	18,7	3,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	5,1	4,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,0	1,8	0,8	5,7	9,7	22,4	33,3	21,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,1	6,9	2,9	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,4	1,7	1,3	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	3,7	2,2	1,8	15,3	42,4	56,0	52,9	19,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,5	3,4	2,3	2,0	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	4,5	23,9	39,8	36,4	22,3	10,7	4,8	1,4	0,3	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	4,8	40,3	57,7	32,3	14,9	5,5	1,1	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	3,4	8,4	6,9	4,3	2,2	0,8	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	8,1	24,5	52,8	60,4	58,3	48,3	38,2	23,3	10,7	2,3
11	Cerreta mesoxerofila	2,3	6,9	15,4	24,4	27,2	29,3	23,0	16,0	5,9	1,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,7	1,5	2,8	7,9	15,6	20,3	15,9	8,2	3,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,5	4,6	17,3	37,8	49,0	39,9	26,0	13,6	4,3	1,4
14	Faggeta termofila e basso montana	1,2	4,0	17,2	52,3	83,5	112,3	109,8	87,3	41,1	11,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,6	4,4	9,6	8,7	6,5	4,7	2,7	1,3	0,7	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,3	0,9	1,8	3,2	2,6	2,8	1,0	0,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,7	7,7	8,0	10,1	14,0	17,6	14,2	8,0	4,3	0,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,7	1,3	1,7	3,6	3,1	1,6	0,9	0,4	0,2	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	20,7	17,9	19,1	16,6	11,8	7,3	4,1	2,1	0,6	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,4	1,7	3,7	3,7	3,0	1,8	0,8	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	0,3	0,6	1,4	2,3	1,2	1,3	0,4	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,6	8,4	28,9	40,9	38,6	29,3	22,0	14,2	7,3	3,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	46,3	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,7	71,4	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	13,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	171,9	37,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	88,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,7	54,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	30,0	112,7	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	171,8	234,7	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	12,5	4,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	10,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	47,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	8,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	114,7	54,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	79,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	91,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	53,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	67,0
21	Ostrieto mesofilo	14,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	113,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,5
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	120,2
27	Querceto a roverella tipico	12,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	340,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	152,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	27,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	3,8	8,6	8,3	11,4	18,0	22,2	4,4	2,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	12,9	22,6	7,1	5,1	12,3	15,6	7,6	7,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,4	22,0	3,8	1,4	5,0	14,1	1,6	0,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	10,5	22,6	4,5	2,8	2,6	13,7	7,0	3,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	14,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	26,3	53,7	1,8	0,6	1,7	14,2	7,1	8,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	6,8	31,7	28,2	10,2	15,0	17,4	7,4	3,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,7	4,8	1,1	0,0	0,3	0,4	0,1	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	88,0	128,6	30,4	9,9	19,5	20,3	19,2	24,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	22,8	33,4	9,7	3,6	9,6	48,4	15,9	8,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	2,8	10,0	1,3	0,1	1,0	10,2	1,5	0,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	3,1	9,8	18,1	21,1	13,8	6,9	3,7	2,0	0,4	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	14,5	22,2	20,4	14,5	10,5	6,3	2,6	0,5	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,1	5,4	12,6	14,5	9,4	5,3	2,0	0,5	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,8	6,1	10,0	12,2	13,9	11,2	7,6	2,7	0,2	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	4,3	6,3	2,5	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,9	4,2	8,7	18,5	29,8	26,8	16,3	6,4	1,2	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	10,4	19,7	21,4	19,3	21,0	15,4	10,0	2,8	0,3	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,9	7,7	2,5	1,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	17,2	48,1	74,1	76,2	62,7	38,8	18,6	4,4	0,3	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	4,9	9,7	19,8	34,5	36,7	28,3	13,8	4,4	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,6	3,0	6,6	7,6	5,7	2,7	0,8	0,2	0,1	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	5,4	42,3	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	72,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	18,6	29,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	5,4	90,1	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,5	105,6	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	6,6	142,0	192,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,8	111,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	14,1	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	368,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	175,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	205,5
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	87,9
11	Cerreta mesoxerofila	50,2
12	Faggeta altomontana rupestre	13,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2750,6
14	Faggeta termofila e basso montana	212,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	581,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	3,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	70,3
21	Ostrieto mesofilo	54,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	8,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	27,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	33,2
26	Querceto a roverella pioniero	16,7
27	Querceto a roverella tipico	10,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	42,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	9,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	10,8
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,3	1,8	2,5	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,3	21,5	36,4	43,0	39,7	51,6	121,7	37,9	16,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	9,5	31,3	29,8	15,3	29,8	34,8	17,6	6,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,4	46,7	58,8	36,0	10,7	4,2	8,8	15,3	24,5
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	18,6	32,9	15,7	2,6	1,6	5,7	4,7	6,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,3	4,0	0,6	9,5	32,9	2,9	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	1,0	3,9	6,8	1,3	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,7	434,6	747,4	278,3	158,6	250,7	461,9	252,1	162,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	38,3	77,6	66,6	10,7	5,3	2,5	3,2	7,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	65,4	87,2	70,5	32,5	46,5	108,6	104,4	66,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,3	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,7	10,9	7,6	0,9	12,1	33,4	1,8	0,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	5,8	28,2	18,0	1,3	0,0	0,0	0,2	0,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,5	1,0	4,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	8,3	8,1	2,4	0,3	0,4	0,6	2,0	5,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	4,1	7,3	5,7	2,7	2,3	3,1	5,4	2,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	11,1	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	8,4	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	1,2	4,7	5,4	16,3	14,7	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,3	5,4	0,0	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	1,2	3,6	3,6	1,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	0,5	1,6	1,6	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	7,8	19,6	42,6	76,1	94,3	74,7	38,8	11,6	2,6	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	15,9	39,7	50,2	35,9	20,6	8,6	3,6	0,5	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	7,3	14,8	28,9	38,4	40,8	33,5	22,6	10,4	4,8	4,1
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	2,9	9,6	18,2	23,0	18,0	10,4	4,7	1,0	0,2	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	3,1	12,5	14,8	10,9	6,2	2,3	0,2	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,6	2,6	3,0	3,2	2,1	1,0	0,4	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	101,3	230,6	405,3	564,6	600,9	459,5	264,4	93,6	24,8	5,5
14	Faggeta termofila e basso montana	1,4	5,2	16,0	30,2	49,0	47,6	38,4	16,6	6,2	1,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	50,8	120,3	152,2	123,2	75,8	38,3	13,4	4,6	1,5	1,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	3,5
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	0,8	3,2	5,5	9,9	12,9	13,4	8,9	6,3	9,3
21	Ostrieto mesofilo	0,2	1,1	6,7	10,4	10,5	9,5	8,2	4,4	1,9	1,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,3	0,8	2,8	2,0	1,6	0,4	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,6	1,6	3,9	6,0	6,1	5,0	2,6	0,8	0,3	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	13,6	6,6	4,1	3,6	2,9	1,4	0,6	0,2	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	0,4	2,3	3,5	4,2	2,5	1,2	2,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	3,7	2,4	0,7	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	1,6	4,6	6,8	8,6	7,2	6,6	3,8	1,9	1,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,4	0,5	0,4	0,9	1,5	2,0	1,6	0,9	0,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,8	1,8	2,1	2,4	1,7	1,1	0,6	0,4	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	255,4	97,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	126,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	159,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	54,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	3,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	786,3	1692,4	249,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	95,4	107,7	8,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4	405,0	87,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	43,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,7	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	16,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	11,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	6,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	83,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	17,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	46,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	49,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	64,0
21	Ostrieto mesofilo	74,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	74,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	196,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	107,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	138,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	120,5
32	Robinieta-ailanteto	1,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,9	12,4	21,0	19,5	15,3	12,9	0,8	0,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	0,0	0,2	0,5	4,2	8,5	2,5	0,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,9	24,6	16,8	2,8	0,3	0,1	0,2	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,1	17,3	13,7	6,0	5,9	0,9	0,7	0,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,8	11,1	9,7	8,0	9,7	19,8	1,3	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	5,1	56,2	9,1	0,5	0,5	1,4	0,6	0,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	21,3	31,3	14,9	2,1	1,7	0,2	0,2	2,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	5,4	45,6	39,1	42,3	40,9	14,5	6,0	2,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	33,6	33,2	13,8	7,8	5,0	3,4	1,3	9,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	22,6	37,4	19,5	10,7	18,9	17,0	5,6	6,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	25,0	47,6	12,4	2,1	9,7	17,8	3,2	2,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,3	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,5	8,5	14,5	19,9	18,6	9,5	5,4	3,2	1,2	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	1,0	2,3	3,6	3,8	3,3	1,7	1,0	0,1	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	1,7	5,8	9,6	12,5	10,2	5,0	1,2	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,8	11,7	11,7	11,9	6,2	3,1	0,9	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,8	3,2	6,9	15,2	15,9	12,4	4,8	3,7	1,0	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,7	2,5	2,7	6,2	15,7	19,9	16,8	7,4	1,7	0,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,0	2,5	4,2	9,7	20,2	19,0	12,3	4,9	0,2	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	7,9	29,4	43,7	49,4	40,0	18,7	5,9	0,9	0,1	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,8	17,3	21,3	25,1	20,2	12,1	6,3	0,3	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,0	13,5	34,6	37,9	27,8	14,6	4,9	1,3	0,4	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	5,2	13,7	23,3	27,9	26,0	15,7	6,8	1,6	0,5	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	1,6	24,5	54,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,7	0,0	1,4	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	14,3	31,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	4,6	14,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	2,2	7,8	48,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	58,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	7,4	47,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	5,3	80,4	91,1	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	3,7	39,6	56,4	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,7	31,8	83,7	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	28,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	25,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	188,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	81,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	902,3
9	Castagneto da frutto	363,1
10	Cerreta mesofila	2627,8
11	Cerreta mesoxerofila	580,1
12	Faggeta altomontana rupestre	4,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	475,5
14	Faggeta termofila e basso montana	363,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	684,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	3,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	194,3
21	Ostrieto mesofilo	309,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	268,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	85,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	195,5
26	Querceto a roverella pioniero	24,7
27	Querceto a roverella tipico	44,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	251,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	91,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	32,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	10,0	5,9	4,8	0,9	0,1	0,4	1,2	4,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	13,6	4,4	1,3	0,0	0,0	0,6	1,1	4,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	5,5	8,7	25,1	37,4	30,6	44,5	25,7	11,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	9,3	8,2	6,2	11,4	16,9	13,6	8,9	7,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,3	101,3	129,4	135,7	75,9	77,3	97,1	155,6	129,7
9	Castagneto da frutto	0,0	49,4	58,4	72,1	27,3	26,1	31,9	46,8	51,0
10	Cerreta mesofila	0,3	339,0	246,2	305,4	320,9	333,0	366,6	393,4	323,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	40,7	36,0	53,0	93,0	127,4	121,4	67,6	41,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	1,0	0,6	0,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	210,3	116,0	24,7	7,7	8,2	14,4	29,2	64,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	89,2	50,7	16,2	15,6	24,6	32,2	61,4	73,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	84,6	83,6	78,4	75,2	86,0	110,7	94,3	71,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,1	0,6	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	9,2	9,2	4,7	11,7	28,0	99,5	24,7	7,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	111,7	55,4	13,0	4,1	6,0	25,0	33,7	60,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	15,6	5,4	4,5	7,2	35,4	108,6	63,9	27,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	10,2	15,4	10,6	9,5	7,8	9,3	10,8	12,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	39,3	19,9	9,3	10,8	21,0	32,8	30,3	32,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,9	1,3	2,6	2,0	2,7	11,0	3,4	0,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	33,6	10,3	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	9,7	8,0	9,0	23,0	54,1	61,7	66,2	19,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	20,1	10,0	5,8	7,3	12,4	12,5	11,1	12,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	4,5	1,5	1,1	5,6	7,9	2,9	4,9	4,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	2,9	8,9	8,7	4,9	1,7	0,5	0,1	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,7	4,4	9,4	7,3	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	8,6	17,7	35,0	44,8	39,5	25,0	12,9	3,3	1,0	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,7	18,4	21,2	15,6	10,1	5,3	2,0	0,5	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	14,3	40,6	91,4	154,8	197,1	176,9	126,0	70,7	23,4	7,1
9	Castagneto da frutto	4,4	16,8	41,5	72,4	82,7	72,2	44,0	21,7	6,1	1,3
10	Cerreta mesofila	39,8	136,3	333,5	546,5	619,6	495,3	289,8	123,0	33,9	10,1
11	Cerreta mesoxerofila	7,9	36,3	98,8	142,1	131,2	91,8	48,1	19,7	3,4	1,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,5	1,3	1,4	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	9,0	24,9	50,5	73,1	84,4	83,6	69,7	46,0	25,5	9,0
14	Faggeta termofila e basso montana	3,4	9,4	24,7	49,9	76,3	76,8	61,8	36,1	16,6	8,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	47,6	89,1	173,5	172,7	116,0	58,9	19,3	6,0	1,0	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	1,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,7	10,7	24,6	35,0	40,9	34,9	29,8	11,1	2,5	2,0
21	Ostrieto mesofilo	5,1	13,8	22,3	38,2	53,0	60,5	52,0	35,4	20,3	8,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,4	10,7	23,8	39,9	62,1	55,5	48,6	19,6	4,6	0,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	3,3	6,7	16,0	23,3	18,3	11,0	4,9	1,9	0,5	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	82,6	44,3	25,9	18,5	12,3	6,7	3,0	1,4	0,5	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	2,4	5,1	6,1	4,0	2,5	1,2	1,2	0,6	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	1,9	2,8	7,9	11,6	11,9	6,0	1,9	0,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,0	25,9	51,4	54,9	47,7	31,8	18,3	10,8	3,9	1,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,1	6,9	16,5	23,5	19,7	13,3	6,5	3,4	0,6	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,7	5,3	5,5	5,8	5,8	3,8	1,9	0,7	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,1	8,5	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	17,1	88,0	63,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	4,2	14,5	47,7	14,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	7,1	506,6	330,8	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	2,3	112,7	205,3	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	8,1	1378,4	1098,2	134,4	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	1,3	295,0	246,9	35,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	166,6	275,8	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	281,2	57,5	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	43,2	372,4	208,7	58,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	73,1	63,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	13,8	84,4	135,5	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	6,6	61,1	111,2	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	51,9	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	47,1	108,7	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	17,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	8,1	23,7	12,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	62,1	165,7	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,2	63,9	14,2	12,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	4,6	21,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	504,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	61,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	125,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	333,5
14	Faggeta termofila e basso montana	143,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	50,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	79,0
21	Ostrieto mesofilo	6,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	136,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	9,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	105,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	26,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	152,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,3	12,6	15,8	23,5	89,0	166,6	156,9	35,0	5,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,3	1,9	3,4	5,0	23,9	25,1	0,8	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,3	7,0	10,3	5,1	7,3	28,6	57,9	6,0	2,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,5	51,6	53,2	25,6	29,0	38,1	77,3	39,8	18,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	15,0	24,5	11,3	3,3	29,0	54,4	3,7	2,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,2	3,6	4,5	11,5	25,0	3,4	1,6	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	3,5	7,6	5,1	13,3	22,6	9,3	15,3	2,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,2	1,6	2,0	1,4	0,1	0,7	0,1	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	7,3	9,8	13,9	27,5	35,1	20,7	18,7	3,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,7	2,1	0,4	0,1	1,1	2,8	0,6	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,2	10,2	10,7	16,3	41,3	11,0	12,1	2,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,4	6,0	7,1	4,7	2,4	0,5	2,9	0,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	7,1	11,0	6,0	18,4	36,8	54,1	18,3	0,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	56,0	40,3	35,1	53,7	77,0	90,5	77,0	52,8	16,7	5,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,6	10,0	14,2	13,8	11,6	6,4	1,9	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	3,8	8,1	10,4	10,9	9,9	12,9	16,9	19,1	14,7	18,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	11,8	32,3	51,0	50,5	40,4	43,9	38,4	32,0	17,3	16,1
14	Faggeta termofila e basso montana	1,8	4,2	9,9	10,9	14,0	19,3	23,4	22,5	17,5	19,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,3	5,7	11,3	11,8	9,4	6,9	2,7	0,8	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,6	8,5	18,6	21,9	17,2	8,0	2,1	0,1	0,1	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,3	0,3	1,0	1,7	1,8	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,5	15,5	30,8	36,4	28,5	14,6	5,8	0,2	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	0,4	1,8	2,0	2,1	1,2	0,7	0,3	0,4	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	4,9	17,2	26,4	27,7	18,0	8,3	3,2	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,2	7,1	8,1	5,1	2,2	1,0	0,6	0,3	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,5	7,9	28,8	36,0	34,5	24,6	14,4	4,1	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	17,4	127,0	201,4	112,4	42,5	1,9	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	51,7	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	20,4	85,4	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	231,4	59,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	97,7	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	6,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	23,1	74,0	51,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	35,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	43,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,4
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	128,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	25,5
26	Querceto a roverella pioniero	34,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	500,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	127,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,2	1,0	1,6	5,8	13,4	5,0	2,7	3,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,1	4,4	6,5	3,7	3,6	6,0	7,6	7,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	44,8	42,4	6,7	0,1	0,0	1,1	4,5	28,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,7	8,6	2,5	1,0	1,6	0,7	0,5	2,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,0	4,8	8,9	4,3	8,1	6,3	0,9	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	69,5	130,8	49,1	23,5	25,9	75,6	81,6	44,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	7,3	9,1	2,7	1,0	9,6	56,4	27,8	13,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6	5,5	6,1	5,1	5,6	6,0	3,3	2,7	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,1	14,4	15,3	7,8	3,0	1,5	0,5	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,1	7,3	17,4	28,8	32,9	26,2	11,9	2,7	0,3	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,4	3,2	3,4	3,9	3,9	4,5	3,0	1,7	0,5	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,2	9,2	10,5	5,6	3,6	2,6	1,4	0,3	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	14,5	60,0	110,4	122,8	91,1	53,8	31,9	11,2	3,4	1,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,4	9,2	15,3	22,1	32,6	25,9	13,8	3,9	0,9	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	3,2	15,2	15,1	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	24,5	8,6	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,4	67,9	55,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	4,9	9,9	9,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	1,6	23,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	56,3	308,9	71,5	48,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	14,3	33,4	69,5	9,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	22,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	17,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	64,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	1649,8
11	Cerreta mesoxerofila	482,5
12	Faggeta altomontana rupestre	20,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	751,0
14	Faggeta termofila e basso montana	151,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	403,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	71,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	92,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	378,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	62,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	8,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,2	0,1	1,7	1,5	4,3	4,8	6,0	3,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	0,2	1,4	5,2	2,6	1,8	5,1	0,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,5	7,5	14,3	9,3	5,7	11,2	11,2	2,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,8	160,5	194,2	300,9	185,3	204,1	183,9	200,8	219,4
11	Cerreta mesoxerofila	0,2	42,0	32,7	66,2	137,5	38,7	43,5	64,1	57,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	0,6	4,2	9,3	3,1	0,3	0,4	2,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	47,2	103,8	169,7	134,2	63,0	31,5	118,9	82,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	3,3	36,6	65,7	24,9	10,2	9,7	0,3	0,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	49,7	28,5	52,9	63,1	42,0	41,5	58,3	67,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,1	8,4	33,1	14,9	9,8	5,4	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,7	1,8	34,9	23,5	8,6	3,3	12,7	4,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	54,0	34,9	44,2	43,0	37,3	41,3	62,8	61,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	3,1	4,3	10,8	17,7	7,1	3,8	9,0	6,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,1	3,9	3,2	1,4	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,5	10,4	4,4	1,8	2,3	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,6	2,1	3,9	3,0	3,2	2,4	1,8	0,2	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,4	15,4	25,6	15,5	4,7	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	110,9	407,5	476,8	321,9	172,2	89,8	41,4	20,8	5,9	2,7
11	Cerreta mesoxerofila	32,0	67,1	96,9	100,7	79,5	48,8	29,8	17,5	7,1	3,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,2	2,1	5,9	3,9	3,5	1,4	1,1	2,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,8	17,8	39,2	83,6	142,6	178,3	140,5	95,9	35,3	13,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,5	1,9	5,7	12,0	23,5	37,0	34,3	24,2	9,6	2,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	32,2	106,2	135,9	75,1	32,5	13,2	6,1	1,7	0,4	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,7	1,6	2,2	5,9	16,5	18,2	18,1	5,9	2,1	0,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3	1,5	3,4	7,9	12,7	16,4	20,4	14,1	9,8	6,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	149,1	88,3	73,6	36,9	17,4	7,7	3,3	1,5	0,5	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,0	15,1	14,0	6,7	4,7	4,2	3,6	2,0	1,5	0,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,4	1,7	2,3	2,1	1,7	0,6	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	11,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	2,4	37,1	19,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	31,3	865,8	661,4	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	165,2	59,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	2,0	9,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	78,6	348,1	316,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	65,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	31,1	292,5	76,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,2	21,0	44,7	5,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	43,7	7,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	134,9	221,1	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,9	54,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	10,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	21,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	13,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	1,6
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	77,7
11	Cerreta mesoxerofila	39,7
12	Faggeta altomontana rupestre	26,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1032,1
14	Faggeta termofila e basso montana	223,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	156,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	5,2
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	57,7
21	Ostrieto mesofilo	85,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	73,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	21,1
26	Querceto a roverella pioniero	18,1
27	Querceto a roverella tipico	26,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	238,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	8,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,3	0,5	3,1	1,7	4,2	0,3	0,0	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,9	2,8	5,1	6,8	3,8	0,7	0,6	0,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,7	7,0	1,3	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	19,1	32,8	12,4	5,1	1,1	0,1	1,5	5,7
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	13,0	17,6	3,5	0,2	2,3	2,0	0,2	0,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	0,5	4,5	15,4	5,7	0,3	0,0	0,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,3	238,3	275,0	107,6	65,6	72,7	69,1	100,6	101,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	52,6	73,1	34,5	13,1	13,2	5,4	7,9	23,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	19,0	31,6	17,0	9,8	39,5	32,0	3,8	4,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,3	0,9	1,0	0,3	0,3	2,4	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	9,6	8,4	3,0	1,6	14,6	14,9	3,5	2,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	15,4	48,9	17,6	2,0	0,0	0,0	0,1	1,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	0,2	0,1	1,2	16,2	49,0	5,9	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,2	5,1	2,5	1,2	3,8	2,9	0,9	1,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	10,6	7,0	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	8,2	10,8	6,8	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	34,9	48,6	18,6	5,4	41,6	67,7	13,0	8,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	4,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	0,5	3,1	3,5	2,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,7	3,2	4,3	4,8	3,4	2,8	0,6	0,1	0,1	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,5	3,4	4,8	3,8	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,1	0,7	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,7	4,9	15,8	23,6	15,2	9,2	4,8	2,5	0,9	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,2	2,2	9,7	14,8	8,6	3,3	0,7	0,1	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	0,4	2,5	5,9	6,9	5,3	4,1	1,3	0,1	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	33,0	87,1	160,7	229,1	244,4	168,2	85,0	20,3	2,0	2,4
14	Faggeta termofila e basso montana	1,7	4,9	13,5	26,5	34,8	40,4	38,9	29,0	19,7	14,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5	15,5	49,6	50,5	25,8	8,7	3,2	1,1	0,3	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0	2,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,2	1,7	4,0	5,7	8,6	9,9	9,1	18,5
21	Ostrieto mesofilo	0,1	0,5	3,0	9,8	16,7	21,4	17,1	11,1	3,0	2,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,3	1,5	2,8	4,0	9,3	14,3	16,6	13,1	11,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,8	4,5	3,4	2,8	1,8	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	0,9	1,6	2,0	1,6	2,7	3,1	3,0	2,2	0,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,3	0,7	2,7	5,6	5,7	5,9	3,5	1,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,8	20,7	49,9	60,8	48,3	27,8	15,3	6,5	2,1	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,1	0,6	1,6	2,1	2,3	1,2	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,6	8,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	3,7	33,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	21,8	179,4	420,7	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	81,4	82,1	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	27,5	119,3	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	28,1	28,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	30,4	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	54,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	9,7	10,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	15,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	11,1	162,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	109,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	11,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	4,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	14,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	27,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	153,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	94,9
21	Ostrieto mesofilo	77,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	27,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	74,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	13,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	92,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	142,4
32	Robinieta-ailanteto	1,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	5,9	11,5	16,5	20,7	38,3	14,7	0,9	1,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,7	3,7	0,4	1,6	4,1	1,1	0,0	0,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	1,3	0,2	0,1	0,3	1,7	0,7	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	1,2	1,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	2,3	4,7	0,9	2,4	3,8	0,5	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	13,8	11,8	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,5	23,4	16,6	15,6	41,3	37,0	5,2	0,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,7	13,1	13,4	27,0	26,5	7,7	3,0	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	28,5	40,6	3,0	0,7	4,1	0,3	0,0	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,1	9,6	9,6	4,7	0,1	0,0	0,0	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,4	8,2	6,0	9,3	24,6	11,5	11,4	1,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,3	2,1	5,9	1,3	0,0	0,0	0,1	2,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	8,3	13,5	11,4	15,1	17,9	23,9	1,4	1,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	34,3	47,4	14,3	9,4	16,0	4,9	7,6	8,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,7	2,4	7,0	22,7	35,1	26,5	12,8	2,1	0,2	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	0,4	1,0	1,4	3,4	2,8	2,4	0,3	0,1	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	0,4	0,5	0,9	1,0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,4	0,1	0,2	0,4	1,0	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,6	1,6	1,9	3,0	2,8	2,3	1,6	0,7	0,1	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,6	1,5	4,9	9,3	6,8	3,5	0,4	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,5	29,1	48,5	42,4	20,6	6,2	1,8	0,3	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,6	7,1	16,3	23,8	23,2	14,8	5,3	1,6	0,1	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,6	1,3	2,2	8,5	20,1	21,3	15,8	6,3	0,8	0,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,7	3,8	7,0	7,5	4,7	2,7	0,7	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,5	3,8	9,4	22,8	21,4	11,3	4,1	0,5	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,9	3,3	4,0	3,0	1,6	0,7	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,2	6,5	10,9	23,5	27,9	16,8	5,3	0,5	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,1	10,0	23,5	29,3	30,7	23,8	14,9	5,5	0,6	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	29,6	18,1	28,2	33,6	0,0	0,0	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	4,5	1,7	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	2,4	0,4	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	14,5	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	14,9	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	16,3	25,8	76,0	35,4	0,0	0,0	0,0	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	1,7	8,8	16,6	41,4	26,3	0,0	0,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	58,9	17,1	0,0	0,0	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	22,6	1,1	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	21,0	5,2	41,0	7,7	0,0	0,0	0,0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	5,7	6,6	1,2	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	9,4	2,6	24,5	56,0	0,0	0,0	0,0	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	112,1	14,2	0,0	0,0	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	45,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	36,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,2
16	Lecceta costiera termofila	6,2
17	Lecceta mesoxerofila	35,2
18	Lecceta rupicola	3,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	102,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	11,5
26	Querceto a roverella pioniero	14,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	494,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	47,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,7
32	Robinieta-ailanteto	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	11,3	14,0	6,6	2,0	1,6	2,5	4,6	2,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	18,3	15,5	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	0,9	1,3	3,7	2,5	2,0	1,6	2,8	2,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	2,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	6,1	18,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
18	Lecceta rupicola	0,0	1,1	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	19,7	37,9	23,9	7,2	5,2	0,6	1,4	6,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,3	3,6	1,6	0,6	0,6	0,8	0,9	1,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,1	0,3	0,2	0,3	1,5	3,2	5,2	2,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	99,0	129,6	52,4	16,5	10,4	35,4	75,4	75,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,8	0,4	2,6	5,1	0,1	8,9	24,1	4,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,9	7,7	13,7	10,7	6,3	2,8	1,0	0,4	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,3	0,5	2,1	9,6	8,0	11,7	3,6	0,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,7	5,8	6,8	2,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9	1,0	1,0	2,1
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,3	0,7	2,8	6,5	8,7	8,7	4,1	3,4
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,3	1,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,8	5,2	11,0	15,9	21,9	21,0	14,6	9,9	1,3	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,9	2,5	1,4	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,1	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	2,3	4,6	3,3	2,1	1,2	0,4	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	19,5	46,8	79,4	84,4	80,9	72,0	57,5	33,8	12,7	7,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	0,8	2,6	8,3	11,7	12,0	7,7	2,8	1,2	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,3	1,1	0,9	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	21,6	9,0	10,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	21,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	14,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	6,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	23,1	11,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	10,1	14,4	59,3	12,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	10,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	1,8	10,6	0,0	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	105,4	229,1	93,7	43,4	22,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	19,3	12,8	14,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	18,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	14,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	156,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	49,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	13,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	6,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	29,1
26	Querceto a roverella pioniero	18,3
27	Querceto a roverella tipico	7,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	88,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	264,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,9
32	Robinetto-aillanteto	2,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,6	2,6	4,7	5,7	4,8	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,3	9,7	4,7	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,6	2,6	1,1	3,2	0,5	0,2	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	8,1	18,7	23,5	21,6	20,1	31,4	22,2	11,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	4,3	15,5	12,9	11,0	3,6	0,3	0,6	0,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,3	7,1	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	1,8	2,6	0,2	0,3	0,5	1,6	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,2	0,3	2,6	3,1	6,7	8,5	6,4	1,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,1	4,8	10,6	2,8	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,4	4,7	2,6	0,2	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	9,5	20,9	23,4	15,2	4,0	3,6	9,3	2,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,7	6,9	15,8	55,3	56,5	80,5	35,2	11,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	0,3	0,1	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	0,2	0,1	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	1,1	4,6	4,0	2,3	1,1	1,0	1,0	3,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,6	4,7	6,1	2,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	0,0	0,4	1,2	2,0	1,2	1,3	0,3	0,1	1,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,4	7,3	17,8	20,3	22,0	19,6	20,8	14,3	11,6	21,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	0,6	0,8	0,9	2,2	6,2	8,6	9,4	8,2	11,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,5	3,2	4,1	3,1	1,5	0,6	0,4	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,2	0,4	1,6	1,4	2,1	1,1	0,2	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	16,5	3,3	1,9	1,5	1,7	1,5	0,9	0,5	0,3	0,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,2	1,1	1,5	0,6	0,6	1,6	2,1	2,2	8,4
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,6	2,0	2,2	1,8	1,0	0,2	0,0	0,1	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	1,5	3,3	6,9	8,6	8,6	8,4	9,1	9,4	31,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,9	3,0	7,2	26,0	52,4	69,4	55,1	33,0	12,0	5,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5
32	Robiniato-ailanteto	0,6	0,0	0,2	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	9,4	0,7	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	14,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,6	3,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	20,8	13,7	80,8	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	18,5	12,7	8,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	20,7	7,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	3,4	0,1	3,8	8,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	7,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	6,5	23,2	26,9	22,6	8,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	12,0	115,8	75,4	32,8	28,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	4,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	32,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	1,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	18,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	6,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	1,2	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,2	1,4	2,8	8,4	6,8	5,2	5,0	3,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	0,3	0,6	1,9	4,0	8,3	3,5	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	1,0	0,4	0,1	0,7	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,2	0,1	1,6	0,2	1,0	0,4	0,3	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,6	1,9	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,2	9,4	10,3	5,7	2,2	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,5	4,3	2,7	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	0,4	0,7	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,3	2,2	2,8	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,0	0,9	0,9	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,8	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	10,8	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	13,2	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	26,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	33,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	11,5
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	27,3
11	Cerreta mesoxerofila	2,4
12	Faggeta altomontana rupestre	15,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	269,7
14	Faggeta termofila e basso montana	151,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	35,4
16	Lecceta costiera termofila	2,6
17	Lecceta mesoxerofila	112,6
18	Lecceta rupicola	21,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	50,0
21	Ostrieto mesofilo	196,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	98,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	46,5
26	Querceto a roverella pioniero	4,2
27	Querceto a roverella tipico	428,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	438,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	8,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	8,1
32	Robinetto-aillanteto	12,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	18,3	2,4	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	1,3	3,7	10,7	12,3	4,7	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	2,2	1,4	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,7	0,9	0,4	0,9	1,3	1,9	4,1	1,3
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	5,9	2,0	0,1	0,1	0,3	1,1	8,6	9,2
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	1,0	0,8	0,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	4,7	6,5	1,5	0,1	0,6	1,7	0,0	0,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	29,1	42,9	17,1	10,9	39,9	58,3	46,1	25,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	1,2	0,1	0,1	0,3	11,0	73,0	50,2	15,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,8	0,2	1,9	2,4	4,5	14,0	8,8	2,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,9	0,0	0,2	4,6	33,1	54,5	16,4	2,9
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	5,7	12,5	1,3	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	30,2	12,2	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	32,8	103,3	54,3	3,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	1,7	5,1	16,0	50,9	23,6	1,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,7	0,8	1,4	3,0	8,4	12,5	15,5	4,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,9	0,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,9	0,1	1,7	17,8	70,5	168,0	143,1	25,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	11,0	11,6	29,1	36,1	80,0	149,2	98,0	22,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4	4,5	2,5	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,4	0,5	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,7	6,7	4,1	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,3	0,5	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,2	1,8	5,4	8,6	7,9	2,2	0,2	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,5	2,3	7,1	10,4	8,2	3,7	1,0	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	0,6	1,2	1,4	0,9	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,1	0,4	1,4	2,3	2,3	2,3	1,8	0,5	0,2	0,2
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,2	0,6	1,5	4,8	6,2	5,4	4,1	2,8	1,1	0,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,1	0,7	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	1,9	5,7	5,2	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,6	4,6	15,6	43,9	64,4	63,5	41,8	23,6	8,0	2,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	0,9	1,8	5,8	20,5	39,4	38,5	28,9	11,9	3,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,1	1,9	6,4	8,0	8,1	5,0	2,9	1,1	0,7	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	0,5	0,6	0,3	0,2
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,3	1,2	5,2	18,3	27,8	26,3	20,9	12,4
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,8	2,9	4,2	3,8	7,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	1,0	1,0	2,2	9,1	9,7	12,9	7,4	6,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,3	1,8	3,7	10,8	38,3	49,9	51,2	29,2	10,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,3	1,7	2,9	7,1	17,5	24,4	21,5	14,4	8,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,4	9,0	10,4	9,0	6,9	3,9	1,9	0,8	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	0,6	1,3	1,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,7	23,3	91,1	117,6	87,6	54,0	29,0	14,8	6,0	3,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,3	24,3	64,7	101,1	102,2	72,7	41,0	19,0	6,4	2,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,1	1,1	1,6	1,7	1,4	0,9	0,9	0,4	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	2,7	1,6	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,4	0,8	3,1	3,2	2,9	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	25,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	16,5	11,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	3,0	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	7,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	23,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	25,1	41,5	144,5	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	33,6	74,2	38,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	17,4	6,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	1,7	55,0	45,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,3	7,9	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	22,0	10,4	14,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	52,5	36,1	76,5	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	8,0	0,1	26,1	61,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,4	38,5	6,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	52,3	230,7	132,1	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	228,1	167,5	15,7	25,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	9,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	17,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	26,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	390,8
11	Cerreta mesoxerofila	38,5
12	Faggeta altomontana rupestre	173,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1051,2
14	Faggeta termofila e basso montana	271,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	164,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	89,0
20	Orno-ostrieto pioniero	18,0
21	Ostrieto mesofilo	2,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	68,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	149,7
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	48,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	17,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	18,9
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,8	4,3	4,3	1,2	0,4	1,3	1,4	3,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	0,7	8,1	15,5	1,7	0,0	0,0	0,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	34,2	46,1	38,3	80,8	64,4	67,1	46,6	13,2
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	4,0	9,6	2,2	0,7	6,0	13,1	2,6	0,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	13,7	20,4	32,3	29,1	18,3	17,6	23,9	18,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	148,7	203,3	234,4	102,2	45,2	90,8	160,7	65,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	42,3	26,0	21,6	21,4	6,7	51,8	62,0	39,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	42,0	50,6	13,4	1,5	8,5	17,1	13,0	17,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	13,4	13,7	12,3	7,4	8,6	10,7	8,8	14,2
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,1	0,6	3,0	6,7	5,5	1,6	0,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,0	0,9	12,4	30,1	10,4	10,7	1,0	2,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	15,7	29,1	50,7	14,8	2,2	5,0	14,2	18,2
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,7	14,1	11,2	2,8	2,6	7,9	3,1	0,8	3,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	3,1	3,0	0,6	2,9	4,0	0,9	0,3	2,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,5	3,1	4,3	6,0	5,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	3,0	4,9	6,1	2,4	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	1,1	1,2	1,4	5,4	5,9	7,4	2,7	1,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	22,5	68,1	94,5	80,0	53,9	31,8	20,5	11,3	5,7	2,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,9	5,8	11,7	10,2	5,9	1,5	1,3	0,6	0,5	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	1,0	4,4	9,4	18,2	24,6	30,0	27,1	20,8	37,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,1	22,8	64,5	120,5	193,0	211,2	178,8	128,6	69,8	56,0
14	Faggeta termofila e basso montana	3,7	17,9	44,5	50,7	44,7	38,9	32,3	21,1	10,9	7,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,5	35,6	60,5	41,4	15,3	3,7	0,7	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,1	0,2	0,4	0,8	1,9	4,8	9,3	11,7	12,7	47,2
20	Orno-ostrieto pioniero	0,4	2,1	3,1	2,5	1,5	1,8	1,1	1,7	1,3	2,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	0,8	0,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,3	1,2	2,6	5,6	9,5	12,9	13,6	10,1	12,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,5	6,1	21,9	15,8	9,2	11,4	14,2	16,6	15,4	38,5
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,0	8,5	11,1	10,3	5,9	2,6	1,4	0,4	0,3	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,7	2,7	4,4	2,8	1,1	1,2	1,2	0,9	0,6	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,6	2,1	5,7	5,0	3,5	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0	1,5	18,6	3,6	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	284,9	100,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	31,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	17,1	34,6	91,6	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	171,6	352,3	451,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	105,8	109,6	55,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	129,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	14,7	28,1	34,7	5,3	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	9,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	18,2	21,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	52,8	22,0	26,8	33,8	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	16,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	115,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	15,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	161,0
9	Castagneto da frutto	35,6
10	Cerreta mesofila	116,8
11	Cerreta mesoxerofila	181,6
12	Faggeta altomontana rupestre	181,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1020,1
14	Faggeta termofila e basso montana	199,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	147,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	23,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	101,7
21	Ostrieto mesofilo	189,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	32,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	3,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	61,6
26	Querceto a roverella pioniero	2,1
27	Querceto a roverella tipico	276,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	505,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,9
32	Robinieta-ailanteto	3,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	9,6	25,8	30,9	37,1	11,0	0,0	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,7	5,4	3,4	2,6	2,5	1,1	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	27,1	25,7	14,2	3,5	2,8	15,7	45,4	26,6
9	Castagneto da frutto	0,0	5,6	10,8	10,3	2,0	1,2	2,2	2,2	1,3
10	Cerreta mesofila	0,0	7,0	14,4	21,9	6,6	0,9	13,5	40,7	11,8
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	13,9	54,6	59,9	13,2	10,9	12,3	9,8	7,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	1,8	24,0	48,5	39,7	22,9	36,9	7,7	0,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	86,9	272,3	277,0	153,2	90,4	86,2	39,1	15,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	5,8	52,4	82,6	22,8	10,9	10,2	12,9	2,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,9	20,6	47,0	24,2	12,7	17,0	17,6	4,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,6	7,0	2,4	0,4	8,6	4,3	0,2
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	6,8	38,9	13,7	4,9	26,5	10,5	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	4,6	26,5	45,8	13,8	5,5	38,7	45,1	9,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	4,3	8,7	4,0	2,3	0,5	4,8	3,9	4,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,6	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,3	0,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	11,8	12,4	9,3	4,7	3,5	5,2	9,3	5,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,6	0,4	0,3	0,0	0,2	0,6	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,1	0,0	1,8	7,9	21,3	120,6	102,1	22,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	37,2	70,8	133,9	83,7	48,7	56,4	52,9	22,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	1,6	4,4	2,8	1,1	0,1	0,5	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,3	2,2	1,1	0,0	0,6	0,7	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	1,1	1,5	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,8	3,1	22,2	32,3	31,3	20,2	4,3	0,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	1,9	3,5	5,3	3,2	1,5	0,3	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	1,7	5,5	15,0	31,2	38,3	32,6	22,5	10,2	3,4	0,4
9	Castagneto da frutto	0,7	1,6	4,0	7,5	7,0	6,4	4,3	2,8	1,0	0,2
10	Cerreta mesofila	0,3	2,1	6,8	17,4	30,6	29,5	20,4	7,4	1,7	0,6
11	Cerreta mesoxerofila	1,0	6,5	23,7	43,9	45,6	32,1	18,2	7,8	2,1	0,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	1,2	8,3	34,0	46,1	41,7	25,0	12,1	13,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,9	14,1	43,1	91,5	164,2	212,9	207,6	151,6	83,8	49,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	2,5	13,1	26,8	31,7	32,1	29,5	24,9	19,4	19,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,0	7,4	24,2	42,4	36,6	21,6	8,6	2,6	0,6	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,4	0,8	1,6	2,3	3,1	3,0	3,0	9,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,8	2,8	5,7	9,0	14,5	14,4	13,8	12,0	28,5
21	Ostrieto mesofilo	0,4	2,2	12,0	26,5	40,2	42,1	34,7	22,5	7,5	1,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,4	3,4	6,0	7,0	6,3	5,3	3,0	1,0	0,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,4	0,5	0,9	0,6	0,5	0,2	0,2	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,5	11,2	12,0	9,9	8,7	5,4	2,4	0,8	0,4	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,4	10,8	40,4	58,3	62,0	50,5	31,7	13,8	5,2	2,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,0	24,1	67,2	112,9	122,5	95,9	52,2	19,9	6,3	1,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,3	1,9	2,6	2,5	2,2	1,1	0,3	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	0,3	0,8	1,6	0,8	0,9	0,2	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,6	0,8	0,7	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	60,0	53,1	0,4	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,6	7,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	4,7	142,4	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	28,7	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	17,8	42,0	1,9	28,5	26,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	46,4	60,5	62,7	2,6	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	42,8	52,0	69,7	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	58,7	335,8	425,5	195,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	88,8	70,6	14,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	53,8	73,1	17,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,0	8,8	9,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	69,0	14,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	64,0	48,4	45,9	30,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	3,2	1,0	16,0	4,6	7,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	36,2	24,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,1	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	9,3	114,3	107,4	33,2	12,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	60,4	303,3	96,1	31,1	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	3,3	7,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	25,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	2,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	104,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	18,9
14	Faggeta termofila e basso montana	23,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	100,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,6
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	26,3
21	Ostrieto mesofilo	25,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	44,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	23,1
26	Querceto a roverella pioniero	60,1
27	Querceto a roverella tipico	70,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	115,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	219,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	42,6
32	Robinieta-ailanteto	4,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,2	0,2	1,1	1,2	3,9	14,5	1,4	2,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,4	0,9	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	11,6	33,5	24,4	5,9	7,0	6,8	9,7	5,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	7,6	8,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	2,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	6,4	7,0	1,8	1,4	0,5	0,7	2,0	3,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,0	10,7	22,4	8,1	7,4	33,1	15,8	1,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,6	3,4	10,7	0,3	3,1	2,8	4,1	1,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	2,5	14,7	7,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	7,8	15,0	12,8	3,7	0,4	0,2	2,1	2,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,9	3,8	6,3	3,4	3,2	4,1	1,2	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,1	17,2	19,8	4,1	2,1	10,7	2,6	0,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,2	4,9	9,3	0,6	2,6	28,1	22,6	1,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	6,8	28,6	43,8	6,2	6,3	3,2	10,4	10,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	9,1	15,2	40,7	27,1	20,0	41,2	56,3	9,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	3,0	6,5	5,8	3,4	6,5	14,2	1,7	1,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	1,0	1,6	0,4	0,5	0,7	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	1,0	1,8	2,0	7,1	7,8	4,8	0,5	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,7	0,5	0,4	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	1,5	1,7	1,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,6	24,2	30,4	17,9	11,0	7,1	4,8	1,9	0,4	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	2,5	6,6	5,5	3,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,7	3,6	5,2	5,7	4,5	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,9	19,6	34,8	25,3	11,7	3,4	1,0	0,3	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,1	0,5	1,3	2,8	6,6	6,0	5,4	2,7	0,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	5,4	6,3	8,3	3,3	1,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	1,0	3,3	6,6	8,0	8,6	6,6	6,0	2,8	1,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,4	8,4	5,2	2,4	0,9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,0	7,9	10,4	10,2	7,6	9,0	5,6	5,8	1,6	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,3	4,8	15,7	21,3	15,9	7,9	3,8	1,1	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,1	5,3	14,8	19,5	22,1	23,4	17,6	10,5	1,1	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	12,0	26,1	43,6	54,3	42,0	29,3	7,3	4,4	0,4	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,3	14,0	12,5	6,1	3,8	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,8	1,2	1,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	14,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	4,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	4,0	37,1	53,1	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	39,4	60,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	24,1	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	17,3	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	20,3	22,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	13,2	9,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	2,8	44,7	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	10,6	60,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	4,8	68,7	39,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	166,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	22,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	3,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,3
26	Querceto a roverella pioniero	9,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	352,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	5,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,8	0,4	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,2	0,3	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,3	0,4	0,3	1,4	4,9	4,1	3,2	4,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	1,1	0,8	0,0	0,1	0,8	0,6	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,2	0,1	0,0	0,8	2,1	1,4	1,0	0,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	0,4	0,1	1,3	2,3	2,4	1,3	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	34,9	52,1	32,8	15,0	36,1	99,2	53,8	28,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,3	0,6	1,0	0,1	0,5	0,9	1,5	0,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,3	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	0,3	0,8	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,3	5,3	6,5	3,7	2,3	1,3	0,4	0,1	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,3	0,5	0,7	0,9	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,4	2,1	1,9	1,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,9	1,6	2,8	2,2	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	43,6	108,8	101,8	63,3	27,6	7,1	0,5	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,8	1,2	1,4	1,1	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	5,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	2,7	2,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	337,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	6,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	12,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	35,4
11	Cerreta mesoxerofila	192,1
12	Faggeta altomontana rupestre	67,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1740,1
14	Faggeta termofila e basso montana	947,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	18,3
21	Ostrieto mesofilo	498,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	53,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,4
26	Querceto a roverella pioniero	153,8
27	Querceto a roverella tipico	80,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	582,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	17,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,5
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,8	1,1	1,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	0,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,9	0,0	0,3	0,9	0,4	1,9	4,5	3,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,8	2,9	10,6	3,5	4,5	9,7	1,6	1,9
11	Cerreta mesoxerofila	0,2	17,9	53,0	19,9	3,6	5,0	43,2	40,6	8,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	14,0	4,2	5,5	11,3	12,3	13,0	2,1	5,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	479,3	444,9	184,2	72,8	101,7	157,9	74,3	224,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,4	116,1	281,4	156,6	51,4	56,7	78,7	104,5	101,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,3	2,5	0,1	0,1	0,1	6,0	4,4	1,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,2	1,3	6,4	6,5	3,6	0,3	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	62,2	131,3	97,3	78,1	77,6	12,0	34,7	5,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	0,8	0,4	3,7	5,6	3,9	14,2	20,8	4,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,4	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2	0,4	0,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,6	2,1	1,8	4,3	13,9	14,3	58,8	53,0	5,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,7	0,5	2,8	3,5	13,2	39,2	18,2	2,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	36,0	42,0	24,3	23,6	30,4	228,4	154,6	42,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,6	3,5	3,3	0,1	0,8	8,7	0,0	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,3	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,2	0,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,9	4,8	0,9	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,9	2,8	8,1	11,2	8,1	3,0	1,1	0,2	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	31,6	22,8	25,1	37,8	38,8	23,8	9,2	2,9	0,2	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,4	4,7	12,9	20,9	17,0	8,6	1,8	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	17,1	66,9	174,3	353,3	469,6	375,4	209,4	64,1	7,7	2,3
14	Faggeta termofila e basso montana	19,0	65,7	116,8	169,2	199,0	187,5	127,4	54,5	7,1	1,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,8	4,4	3,2	1,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	1,3	3,9	4,5	4,4	2,2	1,7	0,1	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	1,1	6,8	21,2	53,3	118,0	135,2	105,3	52,2	5,3	0,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,0	6,5	11,3	9,2	12,2	8,5	4,6	0,3	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,3	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	4,6	15,0	19,1	24,4	41,1	29,6	19,6	0,2	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,6	5,1	10,9	19,8	22,6	15,6	5,2	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	18,1	38,6	68,0	122,5	162,9	116,4	50,8	4,7	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,2	2,3	6,4	6,7	1,7	0,1	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	4,9	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	6,1	149,0	15,8	14,2	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	18,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	209,9	484,1	738,4	297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	210,4	528,2	207,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	6,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	251,4	81,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,3	89,0	61,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	1,1	41,6	28,5	8,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	16,1	231,2	289,2	42,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0







Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	145,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	24,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	93,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	12,2
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	19,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	61,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,5
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,6
26	Querceto a roverella pioniero	362,1
27	Querceto a roverella tipico	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	121,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	90,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	6,9	22,6	32,6	41,1	24,7	10,9	3,3	3,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	5,4	6,9	5,2	4,0	0,9	0,0	0,1	1,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	18,2	10,4	11,2	15,0	8,0	9,7	12,5	7,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,6	2,8	2,4	3,9	2,3	0,2	0,0	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,3	5,7	5,0	3,1	0,3	0,3	1,0	1,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	24,7	16,9	4,5	1,4	0,7	0,2	0,6	12,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,6	2,7	0,8	0,4	0,0	0,0	0,1	0,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	43,5	41,7	69,1	83,0	44,4	28,8	26,6	24,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	41,8	14,8	9,6	6,6	3,4	8,3	17,2	19,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	1,2	1,9	1,6	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	15,7	13,4	10,9	13,4	5,0	10,2	10,6	10,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	7,1	26,1	35,8	31,0	21,6	13,0	6,6	3,1	0,7	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,4	5,1	6,9	4,9	2,5	1,7	1,1	0,9	0,3	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,8	15,5	21,6	23,3	16,6	8,4	2,2	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,2	0,3	1,0	2,9	3,3	3,0	1,1	0,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,0	3,8	5,1	4,2	3,2	1,6	0,3	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,5	4,7	9,1	14,7	14,7	10,2	5,4	2,1	0,4	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	0,8	1,6	1,7	1,2	1,2	0,8	0,6	0,4	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	8,1	36,8	76,8	88,6	72,0	43,5	21,6	10,3	3,6	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,6	9,8	19,6	25,3	27,0	19,0	12,1	4,6	0,8	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	1,4	0,9	0,1	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	5,2	12,8	19,4	23,6	17,0	7,9	2,7	1,1	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	11,1	82,6	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	21,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	3,5	64,4	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	6,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	3,3	12,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	14,3	46,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	3,9	4,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	34,6	285,6	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	24,5	70,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	4,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,3	54,4	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	43,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	98,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	81,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	145,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	44,8
18	Lecceta rupicola	1,2
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	20,9
21	Ostrieto mesofilo	18,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	130,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	62,2
26	Querceto a roverella pioniero	95,4
27	Querceto a roverella tipico	0,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	170,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	11,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	190,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	6,8
32	Robinetto-ailanteto	33,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	3,6	4,0	6,0	1,6	7,2	8,7	9,4	3,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,4	0,8	0,2	0,4	0,2	1,9	1,9	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	5,4	43,6	44,1	5,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	4,2	51,6	22,8	1,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,8	18,8	14,3	10,5	6,6	5,5	24,1	31,5	32,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	12,4	22,0	9,9
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,3	0,1	0,0	0,4	1,6	5,6	4,9	4,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,4	3,8	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	27,7	15,7	7,8	1,5	4,4	21,4	36,3	15,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	9,3	10,0	2,2	1,8	3,5	11,8	10,8	12,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	8,6	51,2	31,8	3,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,8	0,7	0,2	0,5	2,9	51,9	89,9	21,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	8,6	1,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	21,5	11,2	4,6	2,8	10,6	61,8	49,9	27,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	8,6	9,6	3,7	1,8	0,3	1,4	2,0	5,9
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,4	11,2	9,7	6,0	5,8	3,5	1,9	0,9	0,3	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,0	1,6	0,9	1,2	1,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	7,7	16,8	21,7	20,3	30,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	2,0	3,7	7,2	10,3	15,5	16,3	14,7	7,3	3,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	41,3	25,4	28,7	23,2	15,5	7,8	2,5	0,8	0,3	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	1,3	8,4	13,7	11,5	7,0	2,5	0,4	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,7	5,4	4,3	3,8	3,5	1,9	1,2	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,4	3,2	5,2	4,4	2,6	1,5	0,8	0,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,9	9,0	21,2	29,4	25,2	18,5	12,1	7,9	3,2	2,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	44,9	9,5	3,6	1,9	1,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,1	5,2	10,5	17,0	23,0	20,0	13,2	4,6	0,7	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,9	18,0	51,9	41,0	26,8	16,4	8,8	5,2	0,9	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,4	2,8	3,2	4,0	1,2	0,3	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	9,0	31,3	36,0	28,5	27,1	25,3	20,6	9,3	2,1	1,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,5	2,2	2,9	1,2	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,9	5,9	7,2	6,6	5,2	2,9	1,7	0,7	0,3	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	5,8	5,7	18,9	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	4,7	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	35,9	39,2	17,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	35,1	38,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	144,2	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	21,8	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	15,6	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	12,9	68,5	40,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	61,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	17,5	44,4	24,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	32,3	24,9	87,3	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	4,8	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	24,3	90,2	60,5	15,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	114,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,2
11	Cerreta mesoxerofila	52,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	31,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	28,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	9,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	23,5
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,5
26	Querceto a roverella pioniero	1385,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	32,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	12,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	
33	Variante Abete bianco	


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	12,7	6,3	2,3	3,2	21,5	43,1	13,1	12,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,8	6,2	22,4	8,0	5,3	5,9	2,2	0,6	1,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,5	0,1	0,6	1,9	5,1	12,2	6,5	3,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	5,9	20,2	0,7	0,5	0,6	0,3	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,1	1,6	0,8	0,3	1,9	2,6	0,5	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,5	2,1	0,9	3,7	7,3	7,7	0,3	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,5	1,3	0,8	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	239,4	362,2	70,5	45,2	126,1	298,2	137,5	106,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	5,1	3,0	1,2	0,0	0,9	15,0	4,2	2,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	1,1	3,9	2,3	0,8	1,1	1,4	2,0	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,5	21,1	20,0	21,2	19,4	13,5	8,0	2,8	0,7	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	12,2	11,6	8,9	8,4	6,9	3,3	1,0	0,3	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,2	9,8	10,2	5,4	2,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,4	0,8	2,1	2,3	4,4	6,7	6,3	4,3	1,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,8	3,1	1,3	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,0	2,2	2,8	5,9	5,6	3,4	1,4	0,8	0,5	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,2	1,3	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	80,5	223,7	236,3	223,4	202,1	164,0	127,2	78,2	36,8	12,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,1	7,7	4,2	4,2	4,9	4,9	2,9	0,4	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,1	4,5	2,9	1,8	1,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	5,5	34,8	60,3	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	41,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,5	24,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	8,6	6,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	104,6	687,3	396,2	189,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	14,9	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	12,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	85,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	33,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	203,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,3
26	Querceto a roverella pioniero	4,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1033,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	20,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,4	1,9	0,9	1,9	18,9	48,8	9,9	1,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	2,2	15,2	3,5	3,5	6,9	2,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,6	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3	43,6	114,9	23,5	9,1	7,5	1,8	0,7	1,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,3	2,4	0,3	0,2	1,8	3,0	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	1,7	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,0	103,9	262,2	57,8	41,6	138,4	260,8	106,0	62,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,3	3,5	0,0	0,2	0,9	10,2	2,6	0,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,1	15,8	20,1	15,2	13,4	9,7	4,9	1,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,6	2,9	7,2	7,4	6,8	4,6	1,9	0,6	0,2	0,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	0,9	0,8	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	5,4	12,3	24,0	32,1	42,5	39,1	25,9	14,8	5,6	1,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,0	3,3	1,9	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	1,5	1,3	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	86,3	169,5	176,0	157,6	140,8	122,2	94,0	52,7	21,7	11,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,4	3,0	3,5	3,6	3,6	3,2	1,5	0,2	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	30,9	17,9	25,2	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	10,4	24,1	120,8	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	105,1	269,8	303,9	354,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	4,8	0,1	14,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	10,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	50,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	71,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	7,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,8	1,3	1,4	0,5	0,5	1,0	1,9	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,3	31,8	14,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	18,3	33,8	17,1	0,1	0,0	0,0	0,1	2,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	0,3	0,7	1,5	2,1	3,2	2,0	0,5	0,0	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,9	3,0	1,8	1,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	1,0	3,9	7,9	10,5	10,8	8,5	5,0	1,7	0,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,8	2,6	6,8	15,8	16,7	16,0	9,0	2,8	1,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	2,3	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	10,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	12,5	37,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	3,8	57,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	18,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	25,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	49,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	483,6
14	Faggeta termofila e basso montana	83,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	14,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	403,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,1
26	Querceto a roverella pioniero	8,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	273,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	42,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	22,1
32	Robinieta-ailanteto	5,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,3	5,5	6,7	3,3	1,1	0,9	0,6	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,2	12,5	8,6	1,6	0,7	0,1	0,1	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	3,8	17,0	19,1	3,8	2,1	2,3	0,8	0,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	75,6	229,1	120,1	21,1	14,3	10,0	4,3	8,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	7,4	38,2	18,5	3,3	4,7	6,2	3,0	2,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,9	7,7	2,9	0,5	0,2	0,0	0,1	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	57,7	163,8	95,8	33,1	28,4	10,1	2,3	12,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,7	0,9	0,5	0,6	0,9	0,2	0,1	1,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	3,8	3,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	24,9	115,0	86,1	22,1	8,4	1,4	4,2	11,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,3	4,8	7,8	14,8	10,8	1,4	0,0	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,2	2,6	6,1	10,3	2,8	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	1,9	2,0	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	0,3	0,8	3,4	5,9	3,8	3,6	0,4	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	2,0	6,2	8,1	5,5	2,3	0,9	0,2	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,4	1,2	5,3	10,4	12,8	10,3	6,5	1,8	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	11,4	22,9	43,7	86,9	114,7	98,8	63,1	32,3	7,2	2,6
14	Faggeta termofila e basso montana	3,2	6,3	8,5	13,2	18,1	16,3	9,8	5,0	2,2	1,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	1,7	3,6	4,0	2,5	1,4	0,5	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	12,8	30,9	36,4	41,3	56,0	82,1	75,9	52,6	14,6	1,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,5	2,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	0,7	1,0	1,8	1,6	1,5	0,7	0,4	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,3	25,8	46,5	48,1	41,9	43,2	34,2	21,8	4,0	1,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,3	2,4	9,2	11,0	9,8	6,6	2,4	0,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	2,5	8,1	5,7	3,4	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,4	2,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,7	7,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	2,1	14,9	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	11,0	30,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	138,9	215,7	111,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	55,0	25,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	1,2	6,3	2,0	2,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	106,2	223,1	73,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	1,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	37,3	153,4	72,2	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	3,2	26,5	12,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	16,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	204,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	199,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	2,2
11	Cerreta mesoxerofila	12,2
12	Faggeta altomontana rupestre	186,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1404,5
14	Faggeta termofila e basso montana	157,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	221,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	77,5
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	204,0
21	Ostrieto mesofilo	74,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	73,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	3,8
25	Pioppo-saliceto ripariale	43,9
26	Querceto a roverella pioniero	192,8
27	Querceto a roverella tipico	232,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	175,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	419,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	103,8
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	1,2	0,9	0,2	0,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	3,3	5,8	11,6	21,6	60,3	73,1	23,8	4,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	10,5	24,2	15,3	9,9	8,7	55,7	54,8	20,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4	5,9	4,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,7	38,2	38,7	19,3	13,8	8,2	9,3	23,6	34,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,9	201,6	384,0	165,2	83,8	140,7	161,8	144,2	121,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	22,3	28,3	14,0	4,4	7,0	16,0	42,4	22,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	7,0	24,6	4,1	4,0	35,0	96,8	39,4	10,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,2	0,0	0,0	2,3	47,1	20,9	6,4	0,6
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	9,8	42,6	5,2	4,2	19,5	44,7	54,7	23,3
21	Ostrieto mesofilo	0,1	22,4	15,4	2,6	0,9	2,2	6,1	14,7	10,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	9,8	11,2	2,0	0,3	1,0	16,4	20,1	13,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,0	7,3	2,4	2,3	4,3	8,5	7,6	4,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,6	9,8	8,6	2,0	1,4	13,0	104,2	42,3	10,9
27	Querceto a roverella tipico	0,1	29,2	13,4	4,0	3,7	19,3	59,6	66,6	36,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	42,5	27,6	3,5	1,0	2,1	23,7	40,0	35,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5	44,3	38,5	12,2	11,4	63,1	109,5	96,7	43,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,9	11,3	7,0	6,9	9,9	41,7	22,7	2,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1	0,7	0,8	0,3	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	4,4	20,9	38,4	36,2	37,6	32,4	25,8	8,1	0,6	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,2	42,4	61,2	38,3	25,8	15,7	8,3	1,5	0,2	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,6	0,7	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,3	0,7	2,6	3,5	2,8	1,6	0,6	0,1	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	4,0	6,2	12,7	26,8	41,7	43,0	29,8	16,0	5,4	1,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	37,7	101,0	196,6	301,4	324,4	242,3	136,9	48,1	12,9	3,2
14	Faggeta termofila e basso montana	9,3	24,9	34,9	32,8	25,4	15,7	9,1	4,4	0,8	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,6	20,4	47,5	49,6	46,1	32,1	19,2	3,2	0,2	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,7	3,9	14,5	21,1	19,1	12,6	4,9	0,6	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,5	10,0	25,9	30,4	22,8	22,5	25,9	24,2	21,3	19,6
21	Ostrieto mesofilo	1,4	5,0	8,8	12,4	14,4	11,7	8,9	5,3	3,0	3,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,8	6,7	12,4	14,6	14,0	12,9	8,3	2,3	0,3	0,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	1,2	0,6	0,6	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,8	12,5	11,2	8,8	4,2	1,4	0,7	0,2	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	7,4	17,8	26,1	29,3	25,0	27,8	26,7	24,0	7,6	1,0
27	Querceto a roverella tipico	6,7	16,7	35,5	46,0	43,0	37,6	26,1	13,9	5,5	1,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,2	18,1	32,0	38,6	33,6	24,8	14,5	6,9	2,0	1,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	24,3	52,3	68,6	73,7	70,2	63,8	37,5	23,2	5,1	1,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,8	7,3	15,4	22,1	23,4	18,8	10,8	2,6	0,5	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	47,9	74,0	55,5	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	23,2	118,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	21,4	43,1	106,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	730,0	226,7	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	2,9	15,9	57,1	133,8	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	4,8	39,7	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	2,9	40,5	99,0	60,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	18,2	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	23,3	31,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	2,2	3,5	3,1	34,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	31,9	69,1	70,8	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	12,3	80,8	117,7	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	6,2	49,1	96,4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	4,7	96,5	211,7	96,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	39,3	54,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	53,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	54,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	3,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	40,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	106,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,8
26	Querceto a roverella pioniero	60,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	539,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	316,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2
32	Robinieta-aillanteto	10,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	6,6	5,3	1,6	0,1	2,1	7,5	19,9	10,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	10,0	15,4	10,2	4,0	1,9	2,5	3,3	6,9
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	9,7	6,8	2,0	1,3	0,4	0,9	7,1	12,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	25,0	37,8	26,6	1,9	0,1	0,0	0,3	15,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,1	0,8	0,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	15,2	16,3	7,2	1,9	0,7	1,4	8,3	9,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,2	112,3	163,3	63,0	9,5	11,5	29,5	62,4	86,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	25,8	81,7	19,1	9,4	19,7	47,4	78,1	34,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,3	1,4	0,4	0,1	0,1	1,9	3,4	1,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,0	11,7	18,7	11,7	5,1	2,9	1,0	0,4	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	10,9	18,0	12,3	6,3	3,7	2,1	0,6	0,3	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,4	0,5	1,1	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,1	8,8	10,9	9,1	5,6	2,9	0,9	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	1,5	7,9	17,0	24,6	25,7	16,0	11,1	3,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,4	10,1	16,3	13,6	9,3	5,3	2,2	0,4	0,0	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	16,3	43,5	88,0	107,5	110,1	88,3	58,6	22,5	3,8	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	8,5	22,8	39,1	53,7	66,1	57,8	45,4	19,8	2,9	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,4	1,7	1,6	1,8	2,0	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	45,9	7,6	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,6	53,5	0,0	0,0	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,4	18,7	5,9	10,3	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	20,2	68,0	18,5	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	2,0	46,2	12,6	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	10,0	185,4	271,9	71,9	0,2	539,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	24,6	198,9	89,7	3,1	316,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	1,7	8,4	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	68,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	197,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	19,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	13,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	52,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	650,8
14	Faggeta termofila e basso montana	336,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	51,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	1,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	18,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,2
26	Querceto a roverella pioniero	120,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	211,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	826,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	81,5
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	6,6	6,6	35,8	14,5	1,0	0,7	0,5	3,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	41,7	51,7	53,7	22,3	4,9	0,4	4,7	18,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,2	9,3	4,1	0,9	0,0	0,9	0,8	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,1	5,6	4,2	1,2	0,0	0,0	0,1	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	3,3	4,6	22,4	19,8	1,5	0,1	0,0	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	130,2	178,6	123,0	30,2	1,6	1,8	42,4	143,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	33,0	77,4	55,1	14,7	0,8	0,2	54,6	100,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,9	14,7	8,1	1,0	0,1	1,3	6,8	6,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,7	13,1	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,9	4,6	2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	24,5	32,4	29,0	3,0	0,2	0,9	14,1	15,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	39,8	112,5	34,9	3,3	0,1	0,5	8,6	11,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	148,8	212,7	179,1	37,3	2,7	50,5	98,4	96,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	15,1	11,0	22,5	2,1	0,0	0,0	4,7	26,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,1	5,7	7,1	9,0	18,2	13,1	12,1	2,0	0,4	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,6	9,4	31,7	47,7	41,3	34,6	17,3	10,6	3,4	1,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	3,4	7,2	4,7	2,3	1,1	0,5	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5	2,8	3,9	3,0	1,8	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,4	0,3	1,2	3,7	13,8	12,6	14,7	4,9	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2,2	5,6	34,1	70,3	132,0	171,4	137,2	75,1	19,5	3,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	1,2	6,9	16,9	41,3	84,6	84,0	70,0	25,8	5,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,9	20,9	8,3	4,7	3,5	1,4	0,9	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,2	1,8	5,3	5,9	4,1	1,3	0,2	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,0	1,9	1,7	1,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	4,6	12,8	16,0	21,1	26,0	22,1	12,6	4,3	0,4	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,0	21,8	28,7	37,4	46,3	39,0	24,0	5,9	1,1	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	6,2	32,8	91,2	139,3	186,1	173,9	123,2	57,3	14,4	1,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	0,6	5,3	17,6	25,5	19,4	9,3	3,3	0,6	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	8,9	33,6	22,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	25,2	13,8	16,1	15,7	75,9	34,4	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	4,7	14,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,3	4,8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	24,5	14,3	4,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	332,9	216,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	90,4	169,0	52,8	10,2	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	28,9	20,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	2,6	0,3	5,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	23,7	86,5	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	52,7	145,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	8,9	120,6	385,3	254,0	57,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	50,7	17,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	516,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1837,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	126,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	430,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	28,0
9	Castagneto da frutto	25,5
10	Cerreta mesofila	20,9
11	Cerreta mesoxerofila	501,5
12	Faggeta altomontana rupestre	168,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2938,5
14	Faggeta termofila e basso montana	1038,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1429,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	183,3
21	Ostrieto mesofilo	570,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	411,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	118,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	427,2
26	Querceto a roverella pioniero	1077,3
27	Querceto a roverella tipico	186,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3162,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2354,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1993,8
32	Robinetto-ailanteto	240,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,4	10,5	26,0	39,4	96,5	148,2	122,6	56,3	16,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,4	108,6	157,4	101,4	160,7	643,6	491,3	134,4	39,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	3,7	13,7	34,7	35,1	31,5	7,3	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	19,6	27,1	32,6	74,5	130,9	88,5	41,6	15,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	8,3	6,8	6,1	2,4	0,1	0,0	0,1	4,0
9	Castagneto da frutto	0,0	8,2	3,4	1,2	1,3	1,7	4,4	2,3	3,0
10	Cerreta mesofila	0,0	6,9	8,8	3,0	1,5	0,5	0,1	0,0	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	13,0	19,7	55,9	64,8	197,7	123,3	18,5	8,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	24,4	12,8	8,7	8,0	37,5	42,3	19,2	16,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	717,4	687,0	306,3	128,3	117,6	257,1	310,8	413,7
14	Faggeta termofila e basso montana	1,7	94,4	171,1	79,8	115,6	195,1	178,4	133,2	69,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	132,7	183,4	111,2	138,3	280,3	268,2	191,5	122,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	30,1	61,8	18,0	19,0	25,9	12,2	7,8	8,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0	194,6	217,9	42,6	12,9	10,5	13,4	23,2	55,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	111,2	105,4	43,8	45,3	22,6	19,5	33,5	29,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	39,4	32,6	9,4	6,6	5,4	5,8	6,4	13,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	67,4	54,6	40,2	36,5	58,6	52,3	58,9	58,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	68,0	110,5	83,9	142,5	247,4	268,2	111,2	45,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	13,2	23,3	20,0	21,8	56,1	26,1	19,7	5,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,1	476,5	599,5	446,3	309,2	344,3	371,6	343,7	270,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,6	281,4	335,6	152,7	191,2	301,7	415,8	398,7	276,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	200,4	193,5	123,2	176,2	362,6	455,8	268,5	213,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	30,8	66,7	26,1	15,1	23,0	36,8	26,6	15,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	24,2	90,0	118,3	106,3	78,6	47,3	26,1	17,0	6,0	2,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	62,2	116,9	200,5	230,9	292,7	333,7	295,1	196,2	81,1	28,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,7	22,6	39,6	30,7	17,6	9,0	3,7	1,6	0,2	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	18,4	50,9	72,7	84,9	95,2	60,0	37,6	7,4	1,8	1,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,2	2,0	4,6	7,5	6,7	4,3	1,9	0,6	0,2	0,0
9	Castagneto da frutto	1,0	3,7	6,5	5,9	4,5	2,4	1,0	0,4	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	4,0	2,2	0,7	0,9	1,4	2,7	3,3	3,2	1,9	0,6
11	Cerreta mesoxerofila	2,9	22,2	70,4	120,1	112,5	82,6	48,8	24,8	11,6	5,6
12	Faggeta altomontana rupestre	4,5	11,1	14,1	17,8	20,1	26,9	28,8	22,2	16,5	6,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	28,2	130,1	320,7	506,8	580,9	553,7	411,8	257,4	111,0	37,9
14	Faggeta termofila e basso montana	22,4	107,1	188,3	206,4	178,3	145,0	91,6	63,1	27,8	8,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	92,7	238,9	332,3	314,0	221,2	126,8	61,8	25,5	11,0	4,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,2	4,9	17,1	31,1	41,1	38,0	27,8	15,1	4,8	2,3
21	Ostrieto mesofilo	11,7	27,2	45,6	73,7	105,2	118,3	93,9	57,7	25,1	11,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	8,9	21,6	48,9	76,7	93,2	78,9	52,0	22,2	5,8	3,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	4,2	10,9	13,2	20,0	26,1	22,8	14,7	5,6	1,1	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	116,6	87,9	58,2	50,5	41,5	33,0	21,2	11,3	5,1	2,0
26	Querceto a roverella pioniero	36,8	136,5	234,7	261,5	206,7	127,5	50,5	17,6	4,6	0,9
27	Querceto a roverella tipico	1,8	8,5	23,4	43,5	45,3	36,6	17,3	8,2	1,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	102,7	329,5	586,9	715,8	649,6	435,9	227,2	84,6	24,6	6,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	59,6	208,8	408,2	508,5	473,2	354,0	205,9	100,6	27,9	7,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	20,8	135,4	300,7	393,9	422,4	352,5	232,1	99,5	28,9	7,6
32	Robinieta-ailanteto	16,0	36,8	50,7	55,2	44,8	24,3	9,4	2,5	0,4	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	84,6	279,5	152,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	332,6	384,4	249,4	389,4	324,4	124,6	11,2	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	24,6	12,9	23,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	118,4	223,2	87,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	15,5	10,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	6,1	12,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	225,9	239,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	51,4	86,5	28,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	580,1	1485,9	680,6	172,6	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,3	85,4	429,2	472,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	11,2	516,8	465,3	263,2	146,3	26,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	5,0	34,9	87,0	54,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	246,8	248,6	40,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	15,8	233,5	147,8	14,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	61,2	19,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	45,3	207,2	75,3	79,4	17,8	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	318,9	577,7	171,3	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	27,0	82,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	1051,5	1517,4	524,2	68,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,8	307,7	1314,1	664,5	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	3,6	181,8	834,8	767,6	191,9	11,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	3,0	183,8	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	160,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	74,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	26,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	61,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	5,7
11	Cerreta mesoxerofila	93,2
12	Faggeta altomontana rupestre	250,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2560,4
14	Faggeta termofila e basso montana	456,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	35,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	220,8
21	Ostrieto mesofilo	30,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	129,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	22,3
26	Querceto a roverella pioniero	309,4
27	Querceto a roverella tipico	244,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	762,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	66,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	9,3
32	Robinetto-ailanteto	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	19,4	15,8	14,2	16,0	4,6	31,2	41,6	17,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	7,6	10,9	15,0	8,4	2,1	10,0	9,1	11,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,0	5,5	8,3	6,9	0,7	1,5	1,3	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	4,7	11,5	7,4	3,1	4,6	12,7	13,5	4,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,4	1,2	0,9	1,8	1,1	0,3	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,5	18,4	16,4	11,4	14,2	3,8	3,0	11,3	14,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	40,5	55,1	31,6	19,2	10,2	16,9	46,3	31,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3,8	673,5	697,3	412,4	196,1	85,3	78,0	155,2	258,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,5	133,9	118,4	60,2	31,4	7,1	14,5	36,0	54,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,9	6,5	7,3	2,6	0,7	4,5	6,0	3,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	24,0	36,7	40,4	45,1	3,2	18,0	39,5	14,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	3,4	4,5	8,2	6,3	0,2	0,0	1,0	6,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	7,2	35,2	23,7	7,7	6,3	13,5	25,5	10,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	4,6	3,0	1,2	0,8	0,1	2,0	5,3	5,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	51,9	56,5	49,8	37,4	7,5	26,8	38,3	40,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	45,9	54,6	43,3	34,8	2,1	14,2	17,9	31,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,6	218,7	116,1	66,4	40,4	8,6	10,5	46,9	254,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,4	2,6	2,3	0,9	0,2	31,3	17,5	9,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,5	1,0	0,3	1,4	1,3	2,9	1,9	0,1
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	14,1	34,1	53,1	36,5	14,8	5,1	2,7	0,3	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	4,5	16,3	18,2	14,9	8,8	4,5	3,7	2,3	0,6	0,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,9	5,5	10,0	6,6	2,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,3	12,7	13,6	10,6	6,7	5,0	3,8	2,1	0,8	1,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	1,9	2,6	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	9,1	18,4	21,0	20,5	14,6	6,6	2,6	0,3	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,9	6,0	20,4	48,9	67,9	54,3	35,8	14,2	2,1	0,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	109,3	326,9	593,6	691,9	491,4	240,6	84,9	18,3	3,0	0,5
14	Faggeta termofila e basso montana	24,4	84,8	131,3	110,7	65,9	29,2	9,4	0,9	0,2	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,0	9,3	10,2	6,7	3,6	1,5	0,5	0,2	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,0	22,3	41,8	47,2	40,7	23,6	14,5	11,4	8,0	7,5
21	Ostrieto mesofilo	0,2	1,9	4,4	7,8	6,6	4,4	2,9	1,6	0,3	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,8	6,6	11,3	12,0	14,6	22,5	25,7	19,5	11,5	3,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,9	3,8	5,8	5,6	3,8	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	26,2	70,5	74,4	59,4	42,0	24,9	8,6	3,2	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,3	19,2	33,7	43,8	47,7	42,9	28,5	16,4	4,9	1,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	29,1	75,0	111,2	147,1	167,0	130,2	76,9	24,3	1,9	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5	2,8	3,9	4,4	9,2	16,0	16,5	11,3	1,6	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	1,4	1,7	1,9	2,2	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	31,2	111,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	28,5	25,2	4,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,1	11,2	20,6	17,9	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	30,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	24,3	158,2	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	320,6		973,5	187,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,4	279,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	6,1	1,1	0,1	22,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	17,6	90,8	58,6	50,1	1,5	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	12,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	25,4	25,7	63,6	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	13,5	4,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	32,8	177,8	87,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	54,9	98,7	65,6	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	38,3	288,6	329,7	77,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	2,9	52,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	17,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	17,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	962,7
14	Faggeta termofila e basso montana	259,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	58,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	3,6
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	13,8
21	Ostrieto mesofilo	129,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	668,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,3
26	Querceto a roverella pioniero	1,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	149,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	21,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	1,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,5	2,2	4,2	4,5	4,3	0,7	0,5	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	0,5	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	5,6	9,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	300,1	343,9	133,3	35,8	4,3	1,8	25,6	117,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	74,7	58,9	40,2	31,8	4,3	0,6	5,4	44,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,8	31,4	9,5	2,6	4,5	2,8	1,0	1,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	1,9	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,5	4,8	6,4	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	23,1	43,7	35,8	8,3	0,9	0,4	2,6	14,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	133,9	247,1	144,1	54,4	19,6	16,6	11,5	41,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,2	2,0	0,4	0,2	0,8	0,4	0,4	0,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	25,3	54,5	49,1	6,8	0,6	0,5	1,7	10,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,7	4,3	6,4	5,9	0,0	0,0	0,4	1,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,4	2,5	2,6	2,4	2,7	2,1	1,5	0,9	0,5	0,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,5	2,3	5,8	4,5	2,0	1,0	0,6	0,2	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,7	16,0	57,9	151,8	257,1	235,9	170,1	57,8	10,0	1,5
14	Faggeta termofila e basso montana	1,9	6,2	21,9	49,5	68,3	59,0	37,8	12,8	2,4	0,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,9	13,1	10,3	9,1	7,3	4,6	3,1	1,6	0,8	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,7	0,7	0,9	0,7
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3	0,8	1,1	1,6	1,8	2,3	2,3	1,6	1,2	0,9
21	Ostrieto mesofilo	0,5	3,6	14,2	27,5	35,0	27,9	14,4	5,6	0,5	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	17,8	54,3	81,7	113,3	128,9	116,2	85,2	46,4	17,6	7,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,8	2,0	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,7	25,5	22,0	23,8	25,6	22,8	12,7	8,0	1,9	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5	1,1	2,8	3,7	5,0	3,9	2,7	1,0	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	4,9	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	2,9	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	151,1	426,2	259,2	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	142,3	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	47,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	6,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	103,6	9,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	95,9	470,4	95,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	4,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	66,0	49,9	23,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,4	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1395,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	237,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	478,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2526,7
14	Faggeta termofila e basso montana	191,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	24,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	162,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	11,2
26	Querceto a roverella pioniero	29,7
27	Querceto a roverella tipico	81,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	658,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	5,3
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0

Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,0	221,8	181,7	93,4	42,2	84,7	411,5	211,1	148,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	20,4	60,3	15,8	13,2	16,0	50,5	44,3	17,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,0	101,6	91,5	25,6	5,1	21,4	110,6	67,7	54,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,5	455,7	813,2	193,8	38,7	24,6	276,9	418,8	300,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	44,0	3,5	0,6	1,1	28,3	36,6	31,4	46,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	7,0	10,5	1,0	0,1	0,7	1,7	0,9	2,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	37,6	29,0	5,5	6,2	10,0	30,0	26,5	17,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,8	1,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	8,7	9,6	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,8	60,8	13,1	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	76,7	164,3	53,0	14,8	15,0	133,1	151,8	49,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	2,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,1	0,1	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	54,2	153,0	216,6	228,9	232,3	210,1	157,2	97,2	28,0	17,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,5	26,5	42,4	46,4	44,4	36,4	22,0	8,1	1,8	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	19,1	56,6	76,4	82,1	82,0	73,4	47,5	29,6	8,2	3,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	127,8	374,6	499,4	489,5	408,3	298,4	193,7	93,9	30,5	8,8
14	Faggeta termofila e basso montana	4,8	15,0	37,3	43,2	34,8	23,2	15,6	9,0	6,1	2,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	2,6	4,8	3,0	2,9	3,5	4,4	1,9	0,9	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,0	10,7	23,4	32,7	39,5	29,8	17,3	4,8	0,9	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	0,7	2,4	3,1	2,4	1,6	0,6	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	1,7	3,9	5,1	9,6	3,8	5,2	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	1,2	6,3	17,1	18,3	16,6	8,8	7,4	4,2	1,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	16,2	46,0	91,3	135,4	146,2	115,7	67,1	26,2	7,9	6,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	0,4	1,4	3,1	2,6	1,7	0,6	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	1,0	2,2	1,0	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	149,0	131,9	205,0	701,1	195,5	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	3,4	83,4	115,9	32,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	118,2	180,8	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	70,4	785,6	1437,3	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	168,6	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	21,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	104,7	49,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	5,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	6,8	18,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	19,9	32,4	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	14,6	372,7	245,3	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

