






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	318,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	452,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	284,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	121,5
11	Cerreta mesoxerofila	111,1
12	Faggeta altomontana rupestre	130,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	201,0
14	Faggeta termofila e basso montana	143,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	151,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	13,1
18	Lecceta rupicola	2,2
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	166,9
21	Ostrieto mesofilo	73,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	324,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	23,0
26	Querceto a roverella pioniero	134,7
27	Querceto a roverella tipico	86,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	698,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	156,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	6,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	10,5	16,4	39,3	38,8	85,0	88,5	28,6	10,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	51,1	22,4	9,6	20,8	73,9	156,8	83,5	34,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,6	5,4	4,1	14,2	57,7	155,9	38,0	7,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	20,9	48,9	13,2	7,3	2,9	4,7	14,0	9,7
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	21,1	44,1	30,7	2,7	0,5	2,0	4,2	5,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	19,8	5,1	2,1	4,7	8,5	63,2	18,6	8,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	50,4	11,9	1,6	13,0	33,9	29,8	16,7	43,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	53,4	45,2	11,2	0,8	0,5	1,1	8,3	23,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	31,6	47,9	14,8	4,4	9,5	16,1	13,4	13,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,6	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	5,4	0,5	3,0	10,1	41,8	79,5	19,9	6,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	6,2	33,1	24,1	1,5	0,5	0,9	4,7	2,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	63,6	157,9	61,9	10,1	2,0	2,0	6,8	20,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,1	6,6	1,6	0,3	1,3	8,7	3,1	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	10,5	14,2	18,2	13,2	32,0	29,9	13,1	3,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,8	4,5	13,4	9,4	17,5	35,0	5,8	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	42,0	80,4	88,6	36,2	106,8	205,9	100,1	38,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	11,4	8,6	10,1	10,4	23,9	35,2	32,4	24,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	1,5	3,7	0,5	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	6,1	30,8	60,1	80,5	70,3	45,0	20,4	4,3	0,5	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	7,9	20,5	26,3	32,4	64,1	106,0	90,1	61,9	23,7	19,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,9	38,5	62,9	57,1	51,6	40,5	22,9	8,8	0,7	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	3,3	12,6	24,0	31,2	24,6	14,9	8,9	1,9	0,1	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,8	5,0	13,8	25,9	28,0	20,6	9,8	6,4	0,9	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,5	3,1	11,1	15,3	14,1	23,0	27,8	16,4	7,4	11,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,4	5,9	13,2	24,4	31,4	35,6	30,7	23,3	12,4	22,7
14	Faggeta termofila e basso montana	1,2	3,0	8,3	18,7	31,2	30,4	21,7	11,8	6,1	11,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,7	22,0	34,6	37,6	26,6	14,0	7,6	2,4	0,4	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,8	5,1	3,2	1,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	1,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,4	2,2	13,8	49,2	48,1	39,9	5,0	1,7	6,4
21	Ostrieto mesofilo	0,1	2,4	4,7	13,0	22,0	18,2	11,1	2,1	0,2	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,0	6,7	14,8	30,6	56,5	80,9	71,1	48,2	12,0	1,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,3	0,9	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,1	10,0	4,7	2,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,2	8,4	17,4	34,5	36,4	23,3	9,5	1,9	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,2	1,8	4,3	12,5	27,3	22,9	15,4	2,0	0,1	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,8	39,4	100,9	147,4	165,8	129,9	72,3	30,3	6,9	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,9	14,5	23,1	35,2	36,9	27,2	12,5	2,5	0,3	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,3	2,3	1,2	0,7	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	31,2	87,6	194,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,4	16,3	123,7	232,1	72,5	4,8	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	23,0	89,7	114,2	40,0	14,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	47,9	42,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	26,3	63,4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	38,0	23,3	51,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	29,4	77,1	67,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	42,7	68,7	21,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	51,0	69,9	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	50,1	78,4	31,6	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	53,7	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	51,7	216,7	54,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	3,5	94,4	32,5	1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,2	58,9	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	109,4	321,0	161,1	71,7	25,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	19,6	75,8	60,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	479,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	175,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	106,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	66,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	31,5
26	Querceto a roverella pioniero	67,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	120,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	176,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	1,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	7,9	14,8	20,9	62,4	159,7	151,8	47,4	14,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	7,6	5,5	5,1	35,6	71,7	32,3	11,6	6,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,4	5,1	23,7	14,4	3,2	11,3	28,9	19,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,3	3,1	5,2	5,3	10,2	24,5	9,7	6,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,7	1,8	2,6	2,4	3,1	7,1	6,4	4,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,9	0,5	1,4	11,0	37,6	9,7	3,7	2,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,0	9,3	17,6	14,2	37,5	25,7	10,5	3,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	8,1	4,8	2,7	23,0	81,5	38,7	10,9	6,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,2	0,4	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	2,8	14,9	38,2	55,9	66,6	81,3	83,8	66,1	40,9	29,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,3	14,9	27,4	30,0	26,9	27,5	21,3	16,0	6,3	3,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,4	2,3	4,8	7,7	12,2	19,9	17,0	16,5	8,1	17,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,7	8,0	17,7	19,0	12,0	5,7	1,8	0,7	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,9	6,9	9,4	7,4	2,9	1,4	0,7	0,3	0,3	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	1,0	4,6	8,4	8,3	7,1	13,0	8,2	11,6	3,3	2,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,3	17,1	28,5	27,8	20,0	13,2	6,3	2,8	1,1	0,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,1	7,8	23,9	47,1	47,4	32,1	13,0	2,2	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	38,4	82,8	193,9	159,7	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,8	32,9	50,7	41,7	40,0	3,7	3,4	2,5	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	50,7	48,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	2,0	35,1	26,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	2,8	22,8	1,3	2,1	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,8	10,4	11,5	15,9	26,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	3,7	58,0	43,4	8,9	6,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	74,0	73,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	15,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	43,8
16	Lecceta costiera termofila	5,4
17	Lecceta mesoxerofila	4,3
18	Lecceta rupicola	1,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	20,7
26	Querceto a roverella pioniero	25,5
27	Querceto a roverella tipico	7,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	280,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,7	7,1	3,5	2,6	1,9	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,1	4,3	1,8	0,6	2,8	13,0	17,0	2,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	2,7	1,2	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,2	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,0	3,5	4,7	1,2	0,7	2,9	4,0	1,4	1,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,2	1,0	1,7	2,2	5,2	7,7	4,2	2,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	1,1	0,7	2,8	1,7	0,5	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	8,8	19,4	18,4	10,6	16,9	96,2	94,2	15,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	1,4	2,5	1,3	3,0	1,8	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,9	2,0	2,3	3,6	3,0	1,7	0,9	0,4	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,9	9,6	11,6	9,2	4,4	2,9	1,6	1,4	0,7	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	1,4	1,6	0,8	0,2
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,1	1,4	0,9	0,2
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,5	0,2	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	11,1	4,8	1,9	0,9	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	1,3	4,6	6,4	4,8	1,8	1,1	1,3	1,5	1,3	1,5
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,3	1,2	1,7	1,2	1,0	0,6	0,9	0,2	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,6	16,9	35,3	47,8	60,4	55,8	34,1	17,9	4,4	1,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,5	1,5	2,2	1,9	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	3,8	9,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	38,9	1,7	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	1,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	5,9	0,1	2,8	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	2,1	2,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	80,3	120,6	57,2	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	3,7	1,0	1,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	168,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	110,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	103,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	28,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	121,9
9	Castagneto da frutto	1169,9
10	Cerreta mesofila	2426,9
11	Cerreta mesoxerofila	817,6
12	Faggeta altomontana rupestre	38,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	66,6
14	Faggeta termofila e basso montana	622,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	157,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	12,6
21	Ostrieto mesofilo	4,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	12,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	93,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	265,7
26	Querceto a roverella pioniero	7,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	25,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	78,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	296,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	23,9	21,5	21,7	16,0	20,1	20,1	23,5	22,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	17,3	22,2	5,7	3,1	6,5	21,9	25,0	8,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	9,9	10,4	9,7	11,3	18,5	11,3	13,7	19,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	4,7	4,3	3,9	4,7	3,7	1,2	1,5	3,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	10,0	20,5	25,4	11,8	7,4	12,2	21,5	13,1
9	Castagneto da frutto	0,8	204,8	240,1	198,4	72,6	34,1	53,1	155,8	210,1
10	Cerreta mesofila	1,7	253,7	229,9	317,0	406,2	319,5	303,6	362,9	232,3
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	51,8	47,4	82,7	128,7	174,1	179,5	103,5	49,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	5,0	7,8	5,4	1,0	4,1	6,2	5,0	3,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	21,3	21,2	2,4	8,9	5,7	3,5	1,4	2,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	115,1	74,3	67,0	15,1	35,3	77,5	104,6	133,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	20,5	20,0	17,3	24,9	19,8	24,6	17,9	12,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,8	2,4	2,3	1,3	0,6	0,8	1,0	3,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	2,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,8	5,5	0,2	0,0	0,0	0,8	1,5	1,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	11,8	10,0	13,9	8,1	5,0	6,3	18,9	18,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	46,8	32,8	25,2	17,5	14,7	35,0	46,2	47,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,6	2,2	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,3	1,1	0,8	2,8	11,3	3,4	5,0	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	8,2	6,3	10,6	7,1	4,0	5,5	18,6	18,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	30,1	45,8	20,9	11,9	24,4	68,3	62,7	32,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	3,9	13,4	28,9	40,0	37,2	27,4	13,7	3,8	0,4	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	4,4	16,5	26,8	26,3	20,3	10,7	4,3	1,2	0,1	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,2	4,1	11,2	18,7	23,2	22,0	15,0	6,9	1,3	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,5	2,5	5,0	6,6	6,8	4,5	1,8	0,3	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	5,1	16,2	23,1	25,3	22,4	15,5	9,2	3,8	1,1	0,2
9	Castagneto da frutto	34,0	99,9	169,6	215,5	228,2	193,5	132,4	65,6	25,1	6,1
10	Cerreta mesofila	58,5	179,9	351,5	471,8	515,9	419,4	263,7	121,0	36,3	8,8
11	Cerreta mesoxerofila	13,3	37,4	95,6	156,3	187,1	159,8	103,7	49,7	12,4	2,2
12	Faggeta altomontana rupestre	2,2	5,1	6,5	8,0	7,3	5,3	2,6	0,7	0,5	0,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	1,0	4,0	11,3	16,6	16,4	10,6	5,0	1,1	0,3
14	Faggeta termofila e basso montana	8,0	33,3	77,0	112,8	130,3	112,1	79,8	44,5	18,0	6,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,7	16,4	27,7	35,6	30,8	20,2	10,8	3,7	0,9	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,3	0,4	1,0	1,4	2,3	2,7	2,2	1,6	0,7
21	Ostrieto mesofilo	0,3	0,9	0,9	1,2	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,8	2,2	2,4	2,1	1,9	1,9	1,1	0,2	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	5,3	12,8	16,7	17,4	15,9	12,4	7,4	3,3	1,4	0,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,7	30,9	41,6	44,9	44,6	33,5	20,7	9,8	3,2	0,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	0,4	0,6	1,2	2,3	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	0,6	2,5	5,7	6,1	5,7	3,2	1,3	0,2	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,5	6,3	10,1	12,4	14,4	14,1	10,5	5,5	2,1	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	5,3	25,0	45,8	65,0	64,3	47,0	28,6	11,2	3,6	0,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	102,9	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	48,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	32,3	0,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,9	448,6	696,9	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	7,6	877,1	1406,3	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	3,4	509,3	294,1	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	11,2	15,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	16,8	32,3	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	412,1	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,7	118,1	29,2	8,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	61,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	13,3	199,7	52,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	1,3	10,7	12,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	119,5	137,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	32,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	3,3
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	371,6
9	Castagneto da frutto	14,1
10	Cerreta mesofila	434,9
11	Cerreta mesoxerofila	339,6
12	Faggeta altomontana rupestre	230,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1527,2
14	Faggeta termofila e basso montana	392,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	60,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	18,4
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	27,8
21	Ostrieto mesofilo	408,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	18,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	19,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	81,7
26	Querceto a roverella pioniero	10,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	520,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	8,9
32	Robinetto-aillanteto	0,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,6	9,2	12,3	7,2	1,3	0,1	0,5	0,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,0	1,0	2,1	2,4	1,4	0,0	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	96,7	113,8	47,9	12,6	4,7	15,2	23,6	57,1
9	Castagneto da frutto	0,0	5,8	3,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	3,3
10	Cerreta mesofila	0,0	56,3	70,8	78,5	85,8	43,6	26,5	39,5	34,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	101,9	78,9	56,6	18,9	5,9	2,3	9,6	65,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	55,6	87,3	45,6	10,4	1,8	4,0	7,7	18,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,7	360,6	402,5	248,6	83,5	24,7	94,0	144,6	168,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	113,7	167,4	30,0	1,8	0,8	2,8	20,2	55,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	11,0	10,6	12,1	6,3	3,2	1,2	3,3	12,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	2,6	1,7	4,0	3,5	1,9	1,5	0,7	2,5
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,3	5,5	9,8	9,6	1,4	0,0	0,0	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,1	80,2	92,3	48,7	55,4	30,5	11,6	29,9	60,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,6	8,6	5,2	0,3	0,0	0,1	1,1	1,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	6,8	5,0	3,5	0,1	0,0	0,0	0,7	3,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	17,4	19,6	10,8	4,6	4,1	2,2	5,7	17,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,3	3,4	0,0	0,4	0,1	0,1	1,4	1,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	107,3	148,0	99,8	54,9	48,7	28,1	9,6	23,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,9	3,6	0,3	0,0	0,0	1,6	1,5	0,9
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	1,2	3,9	5,6	7,7	6,4	5,2	1,4	0,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,4	0,9	1,6	2,0	1,5	0,7	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,1
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	3,0	10,6	40,6	77,0	89,2	72,2	45,3	22,7	8,2	2,9
9	Castagneto da frutto	0,0	0,3	1,1	2,6	3,1	3,2	1,6	1,5	0,5	0,1
10	Cerreta mesofila	2,8	13,1	42,8	84,4	108,7	89,1	56,0	26,0	9,3	2,7
11	Cerreta mesoxerofila	3,9	22,6	56,6	91,4	78,2	51,0	22,6	8,8	3,3	1,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,3	2,0	8,6	19,5	26,7	29,3	29,3	27,7	23,8	63,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	14,6	58,0	94,2	133,3	198,4	263,1	263,5	225,2	141,8	135,1
14	Faggeta termofila e basso montana	2,4	9,6	30,4	49,2	53,7	50,5	50,6	50,9	41,1	53,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,7	4,4	9,8	12,6	12,3	9,4	5,7	3,4	1,3	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,4	1,1	1,0	0,9	1,0	1,2	1,3	11,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,4	0,7	1,7	2,7	3,9	3,4	3,3	11,4
21	Ostrieto mesofilo	7,1	29,6	60,0	86,1	77,7	55,4	34,7	23,2	15,6	19,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3	0,8	1,5	2,6	4,1	3,7	2,6	1,8	0,7	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	0,4	2,3	4,1	4,2	3,0	2,6	1,6	1,0	0,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,5	11,5	14,9	17,3	14,7	9,0	4,7	2,4	0,5	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	0,9	2,0	2,8	1,7	1,3	0,6	0,7	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	12,4	36,6	80,0	119,1	114,9	81,1	47,7	17,8	7,0	3,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	0,1	0,1	0,5	1,1	2,4	2,5	1,6	0,5	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	5,5	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	1,6	5,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	84,7	191,7	58,5	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	8,5	0,7	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	213,4	205,2	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,1	164,9	147,2	27,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	14,2	14,5	35,3	111,8	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	172,1	522,2	508,0	302,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	42,4	175,1	155,4	17,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	38,8	11,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	2,9	10,4	4,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	2,2	11,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	19,5	250,1	100,9	23,9	13,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	2,4	13,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	8,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	6,5	63,4	10,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,8	6,2	2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,0	205,0	238,1	66,4	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	468,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	53,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	120,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	11,6
18	Lecceta rupicola	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	130,6
21	Ostrieto mesofilo	30,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	572,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,3
26	Querceto a roverella pioniero	347,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	274,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	537,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	24,5
32	Robinetto-ailanteto	14,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	20,5	66,6	90,3	52,2	97,2	88,1	35,0	18,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	8,9	7,2	8,0	2,6	2,3	1,8	5,9	16,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	11,1	24,0	24,4	14,2	9,1	22,1	8,4	6,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	3,1	2,9	2,6	0,8	0,0	0,1	0,3	1,8
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	18,1	44,4	9,3	1,2	0,9	5,7	22,7	28,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	8,1	15,3	5,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,7	153,9	210,4	38,3	6,0	4,5	8,0	56,3	94,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,1	3,7	0,6	0,0	0,5	0,6	2,2	4,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	20,1	38,4	50,0	24,8	36,8	75,8	73,1	28,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	60,5	78,0	50,8	14,2	9,1	18,5	16,3	26,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	87,6	147,2	71,3	28,0	38,4	54,2	39,0	71,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	1,2	1,6	6,6	8,3	2,3	0,4	1,3	2,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,5	7,0	0,2	0,6	1,7	2,2	1,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	20,5	74,0	101,4	105,4	85,3	46,9	24,0	8,9	1,4	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,9	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,3	1,0	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,5	13,8	7,8	5,9	6,1	6,6	4,8	2,3	0,4	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,7	17,0	27,9	27,6	22,1	11,7	7,1	0,9	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,7	4,5	3,0	1,7	1,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,4	11,6	15,5	24,0	27,1	24,6	16,0	6,2	0,9	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,2	1,7	4,5	6,4	7,2	5,6	3,6	1,0	0,3	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	17,0	46,7	74,2	98,9	112,8	103,9	74,3	37,4	6,1	1,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	0,8	3,3	4,6	4,8	2,5	1,1	0,2	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	16,7	44,8	67,1	81,6	68,4	39,6	20,3	6,4	2,5	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	16,2	38,9	55,1	53,3	48,1	36,3	19,3	5,8	1,3	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	21,4	73,3	116,0	120,8	99,5	63,0	32,2	9,7	0,9	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	7,3	13,6	2,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,1	1,2	2,9	5,0	3,3	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	24,7	201,5	230,1	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	3,1	22,8	1,5	21,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	10,6	60,0	39,7	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,1	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	6,7	55,3	55,4	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	12,6	124,6	306,8	122,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	3,4	12,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	31,7	117,1	186,5	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	5,0	84,9	87,1	95,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	9,8	135,2	356,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	10,8	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	116,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	23,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	13,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	39,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6
26	Querceto a roverella pioniero	16,7
27	Querceto a roverella tipico	10,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	817,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	229,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	41,8	29,5	10,5	6,2	6,7	3,3	7,6	10,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	8,5	8,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,5	3,1	3,3	3,5	3,2	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	28,2	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	8,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,0	7,5	4,8	0,1	0,0	0,7	0,6	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,1	0,2	4,1	4,9	0,4	0,5	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	250,5	229,1	96,4	47,8	43,2	22,6	42,6	84,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	73,4	82,1	21,2	7,3	8,3	11,0	13,6	12,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,4	17,7	24,4	19,1	12,4	11,2	9,5	6,7	4,7	1,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,6	3,5	3,9	3,6	3,3	3,3	2,6	1,7	0,8	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	5,0	3,5	2,6	0,8	0,8	0,3	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,6	2,0	4,1	7,7	9,6	7,6	5,9	1,6	0,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	2,7	5,7	3,8	2,3	0,9	0,3	0,1	0,0	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,5	2,2	5,3	2,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	50,0	172,0	193,1	150,7	105,2	68,5	41,9	22,9	9,4	3,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	11,5	23,0	42,2	42,5	37,2	32,2	22,0	12,9	4,9	0,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	15,9	36,3	22,2	17,0	19,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	15,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,1	12,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	1,3	3,7	0,0	3,3	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	167,8	310,2	193,7	128,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	28,1	97,7	59,3	31,9	7,3	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	318,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	217,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	88,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	36,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	444,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	235,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	108,3
18	Lecceta rupicola	14,1
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	52,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	33,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,0
26	Querceto a roverella pioniero	457,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	103,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	31,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	78,0
32	Robinieta-ailanteto	4,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,2	13,6	73,9	50,9	78,9	82,6	13,3	3,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	32,7	51,8	26,8	13,2	17,0	30,5	28,7	16,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	2,2	10,3	8,4	4,0	15,7	28,6	14,3	4,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	2,7	2,5	2,5	1,5	3,8	12,0	9,0	2,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,9	76,2	138,7	78,3	46,1	24,0	21,8	22,5	35,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,9	20,1	76,5	30,4	37,6	52,7	13,7	1,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	1,6	4,7	10,5	12,3	30,7	32,8	13,2	2,6
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	2,9	4,4	1,3	3,5	1,9	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,2	6,8	4,8	1,5	6,9	17,8	7,1	5,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	10,1	10,1	5,5	2,2	0,4	1,5	1,3	2,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	1,0	1,0	1,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,4	12,8	20,7	62,6	84,5	83,9	137,6	44,6	10,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	15,8	16,2	18,0	10,7	7,6	10,4	16,7	8,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	16,5	12,1	0,9	0,0	0,2	1,2	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	19,4	34,3	4,8	1,8	0,4	0,6	8,4	8,2
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,8	1,0	0,9	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,6	8,7	34,2	76,3	97,4	67,4	25,4	5,3	1,1	0,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	18,0	35,0	54,8	47,8	32,5	13,9	7,3	3,9	2,4	1,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	13,5	28,2	20,8	13,9	9,1	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,8	2,4	3,5	4,3	5,2	6,3	5,9	4,7	1,8	0,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	23,3	60,4	98,3	103,8	83,0	47,2	18,1	7,8	2,1	0,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	24,2	50,6	49,3	49,6	36,8	16,1	6,9	1,4	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	8,7	23,7	12,1	15,7	18,7	16,4	9,2	3,3	0,5	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,4	0,4	1,6	2,4	3,6	2,9	1,7	1,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,9	1,8	3,5	6,4	10,2	11,1	9,2	5,7	2,2	0,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,7	3,7	7,7	7,6	5,8	3,8	2,5	1,1	0,4	0,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,6	0,6	0,7	0,6	1,2	0,7	0,5	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	22,8	64,2	90,0	109,6	94,8	51,7	19,6	4,6	0,5	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	8,6	23,4	29,0	19,7	12,3	6,3	3,5	0,9	0,2	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,2	0,7	3,0	7,6	8,3	7,3	3,4	0,6	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,4	7,9	15,7	19,5	16,6	9,4	5,2	1,2	0,1	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,5	1,5	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	7,1	66,2	192,6	49,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	133,3	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	22,4	40,6	2,2	10,9	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	12,8	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	302,6	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	23,7	165,0	30,9	9,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	11,6	24,8	37,7	34,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	5,2	8,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,8	25,3	22,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	6,0	23,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	3,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	12,7	88,6	136,4	140,5	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,7	16,0	19,2	50,7	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	3,0	13,9	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	50,2	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	308,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	82,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	89,7
11	Cerreta mesoxerofila	104,8
12	Faggeta altomontana rupestre	247,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2330,9
14	Faggeta termofila e basso montana	266,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	139,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	12,3
20	Orno-ostrieto pioniero	143,9
21	Ostrieto mesofilo	1,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	9,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	64,8
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	96,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	34,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	7,4	12,4	29,9	44,2	64,5	91,2	49,3	9,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,4	1,5	12,1	5,2	16,7	32,8	11,4	0,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	41,0	6,3	0,1	5,3	17,3	1,3	3,2	15,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,1	4,9	70,6	27,5	1,7	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	40,6	41,6	6,3	4,2	23,7	79,4	31,8	19,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	468,4	396,8	336,5	120,0	174,5	240,6	262,1	331,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,6	42,1	36,2	63,3	14,4	18,8	48,0	30,8	12,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	27,7	19,8	10,2	4,9	27,2	31,6	14,8	3,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	1,4	1,5	2,6	1,3	0,6	1,1	1,5	2,2
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,1	3,2	22,6	71,6	40,9	5,3	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	4,5	2,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,1	1,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	16,5	3,3	0,5	0,3	0,8	4,7	17,5	21,1
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	16,7	10,7	8,2	5,7	12,3	16,2	16,3	10,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	3,8	4,2	4,8	1,3	0,5	7,6	6,6	5,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,3	9,6	19,5	31,6	55,5	64,0	56,0	31,7	16,4	22,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,6	7,3	22,4	28,8	16,1	4,7	0,9	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,5	5,4	31,6	30,2	13,4	5,3	2,0	0,9	0,4	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	7,7	36,8	32,7	15,0	7,1	3,0	1,4	0,7	0,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	1,0	5,7	17,2	36,9	51,9	56,1	40,6	25,0	12,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	34,0	93,5	171,4	282,3	403,3	467,9	394,2	281,6	134,3	68,3
14	Faggeta termofila e basso montana	9,7	22,4	38,4	51,8	51,1	39,7	27,2	15,9	7,5	2,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,1	14,5	44,6	39,3	20,7	9,3	4,8	1,4	0,6	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,8	1,4	1,3	1,7	6,1
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,7	3,5	5,7	8,7	27,8	27,2	32,6	21,4	16,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,4	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,9	1,9	2,0	1,5	2,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,2	0,9	1,6	4,2	7,6	11,1	12,1	11,3	15,7
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,9	20,1	17,6	16,8	11,0	4,2	1,5	0,4	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,9	4,4	4,8	3,7	3,4	4,8	4,7	4,8	1,9	1,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	2,7	5,4	60,4	131,8	54,4	1,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	47,6	162,9	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,8	817,0	988,3	399,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	130,5	25,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,3	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	71,4	47,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	16,1	34,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	16,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	10,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	176,3
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	288,9
11	Cerreta mesoxerofila	4,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	89,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	8,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	72,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	8,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	48,7
26	Querceto a roverella pioniero	10,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	108,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	8,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,8	1,3	1,3	0,9	1,7	2,1	1,0	1,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,1	1,7	0,3	0,3	0,3	0,4	2,9	2,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,8	25,6	44,6	32,9	13,1	9,6	13,4	21,1	15,1
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	5,6	23,8	28,1	23,1	16,4	34,9	68,9	56,4	31,6
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,6	0,8	0,3	0,0	0,0	0,2	1,5	0,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	16,5	19,7	12,9	5,4	6,8	5,5	7,7	15,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,5	1,3	2,4	3,0	0,8	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	21,8	26,1	10,5	2,2	0,4	0,3	1,9	9,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,8	0,9	0,1	0,1	0,8	1,9	3,0	1,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	8,9	5,6	2,6	1,7	4,6	6,6	10,5	8,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,3	0,5	2,2	3,6	2,2	1,0	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	17,9	19,7	13,5	6,2	8,9	11,3	12,9	18,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,7	2,3	2,3	0,9	0,5	1,0	0,9	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,8	0,0	0,1	0,4	1,0	0,4	0,4	0,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,3	0,5	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,5	1,6	2,2	1,5	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,5	3,7	2,1	1,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	23,1	32,4	42,3	38,6	23,2	11,8	3,8	0,8	0,2	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	62,4	73,0	73,4	46,5	22,2	7,8	2,7	0,7	0,1	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,7	1,5	0,8	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	13,2	22,5	24,8	14,5	8,2	3,2	2,1	0,9	0,3	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,7	2,7	2,6	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,6	2,9	5,9	8,8	13,8	14,9	12,6	8,0	3,9	1,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,8	2,1	2,5	1,9	0,9	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	21,1	13,3	7,4	3,6	1,9	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	1,4	2,5	2,4	1,7	0,9	0,7	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,3	8,5	17,1	24,9	25,6	17,2	8,6	3,7	0,7	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5	0,4	0,4	1,9	2,0	2,1	0,6	0,4	0,2	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,6	1,0	1,3	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	3,7	4,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	60,2	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	130,8	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	10,1	65,1	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	7,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	62,8	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	4,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	30,5	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	8,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	67,1	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	8,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	47,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	17,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	7,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,3
14	Faggeta termofila e basso montana	61,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	258,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	89,0
21	Ostrieto mesofilo	0,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	58,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	68,7
26	Querceto a roverella pioniero	151,7
27	Querceto a roverella tipico	45,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	328,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	436,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	23,1
32	Robinetto-aillanteto	2,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	12,2	31,6	0,0	0,8	2,2	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	1,2	0,7	0,0	1,3	3,8	7,0	3,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	2,0	2,1	0,5	0,6	0,1	0,0	0,3	2,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,1	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	17,4	10,3	2,2	0,8	0,4	2,6	14,1	13,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	9,3	24,9	36,1	5,0	11,5	58,0	86,6	27,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	7,0	39,4	19,5	1,6	4,1	8,5	5,0	4,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	13,9	41,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	6,0	9,0	4,6	2,1	2,4	13,8	24,7	6,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,4	13,9	16,2	5,9	12,4	40,4	47,5	11,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	1,8	5,3	3,6	1,6	27,5	5,2	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	20,0	89,6	108,5	17,8	9,1	32,7	43,5	7,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	23,9	45,8	40,0	12,5	18,5	127,4	137,5	31,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	3,3	4,0	0,1	0,0	0,0	7,9	5,8	2,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,2	0,0	0,1	0,5	0,5	1,1	0,2	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	0,3	1,9	4,9	7,4	13,5	10,2	7,9	0,8	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	3,2	6,9	4,3	1,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,4	0,8	1,2	1,8	1,7	1,4	0,3	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,4	2,1	4,5	8,0	15,8	14,8	10,7	4,0	0,8	0,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,5	39,5	86,0	67,8	34,6	15,7	7,7	2,6	0,8	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	1,0	2,5	5,3	11,7	26,0	20,2	17,4	3,3	1,5
21	Ostrieto mesofilo	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	1,0	4,2	8,3	13,7	14,1	10,7	4,4	1,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,0	14,9	15,7	12,4	7,4	3,9	1,6	0,6	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	2,8	14,1	24,9	27,6	30,1	25,3	17,4	8,0	1,3	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,1	2,1	4,7	5,0	9,0	10,2	10,4	2,5	0,6	0,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,9	14,4	32,5	42,8	64,9	69,5	57,5	35,1	7,6	1,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,6	11,8	33,0	64,3	109,6	102,3	77,0	27,6	5,9	2,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	0,2	0,6	0,9	6,6	8,2	5,7	0,7	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	25,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	4,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	27,0	21,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	137,3	116,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	43,6	11,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	43,3	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	2,1	45,0	20,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	2,2	66,4	64,9	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	31,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	11,6	134,3	139,2	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	137,4	250,7	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	12,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	17,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	132,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	18,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	33,0
21	Ostrieto mesofilo	34,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	345,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,7
26	Querceto a roverella pioniero	119,4
27	Querceto a roverella tipico	25,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	249,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,1	1,6	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	1,9	3,9	4,2	0,8	0,1	0,2	0,4	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	4,6	3,1	2,1	0,8	0,1	0,1	3,3	3,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	54,6	22,8	9,9	3,3	0,7	0,5	13,7	27,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,5	0,5	0,6	0,6	1,7	6,5	0,3	1,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,4	2,9	8,6	10,4	4,9	0,7	0,5	1,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	4,0	7,5	5,1	1,7	0,1	0,0	1,3	14,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	109,8	60,1	39,7	17,3	1,3	0,4	19,7	96,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	7,8	7,1	16,8	81,2	2,6	0,4	0,6	2,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,2	4,0	7,2	8,4	1,2	0,2	1,4	1,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	115,5	45,2	13,9	38,7	2,1	0,3	2,6	31,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,6	1,6	0,7	0,4	0,6	0,2	2,1	3,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,4	1,9	1,5	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,0	3,5	3,9	2,1	1,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,6	3,1	5,5	5,1	2,4	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	4,3	16,5	29,7	31,9	25,6	15,9	7,5	1,1	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,1	3,2	3,1	3,4	3,3	1,6	0,7	0,4	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	3,6	7,5	5,3	4,0	3,9	3,9	2,5	1,2	0,5	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,7	2,4	5,7	8,7	8,7	5,5	2,2	0,4	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,7	22,5	46,4	55,7	54,1	50,7	45,2	32,3	20,4	14,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,4	10,2	12,0	14,6	34,6	30,3	13,9	0,2	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,0	4,0	5,2	5,7	5,0	2,6	1,2	0,5	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	15,5	12,6	11,9	30,5	51,2	60,6	37,0	25,2	4,4	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,5	1,7	1,7	1,9	1,1	0,9	0,6	0,3	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,5	4,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	10,2	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	76,5	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	10,4	19,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	101,7	189,5	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	43,8	69,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	3,8	9,8	9,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	84,5	137,1	27,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	469,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	39,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	364,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1123,4
14	Faggeta termofila e basso montana	206,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	89,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	35,8
25	Pioppo-saliceto ripariale	28,3
26	Querceto a roverella pioniero	92,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	159,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	220,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	310,4
32	Robinetto-aillanteto	0,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,4	36,4	47,0	81,5	124,5	95,6	41,0	17,4	25,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,8	1,3	2,8	9,6	10,8	11,1	3,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	52,8	68,6	56,7	31,8	26,7	50,2	41,4	36,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	191,0	241,4	227,7	100,3	59,0	148,9	85,8	68,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	15,3	9,9	22,2	20,2	41,2	69,5	20,7	7,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	7,1	4,9	5,9	7,8	26,0	23,4	11,5	2,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	4,0	7,2	8,5	11,9	3,5	0,6	0,0	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,8	6,3	4,4	2,5	3,9	4,3	2,5	1,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	26,1	26,4	6,7	8,4	7,7	6,5	3,9	6,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	15,8	25,3	21,4	24,1	26,8	30,2	12,4	3,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	6,4	16,0	22,5	17,3	19,1	86,2	43,0	10,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	18,6	27,8	84,1	47,9	34,0	57,2	33,1	7,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	19,5	61,0	89,1	102,2	84,4	63,8	29,0	13,6	4,2	2,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	2,8	7,2	9,7	9,0	4,9	3,9	1,3	0,4	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	14,2	28,3	48,6	53,3	56,5	51,2	44,2	28,9	15,1	24,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	23,8	56,9	119,7	184,9	222,7	208,9	157,9	89,9	34,6	24,1
14	Faggeta termofila e basso montana	2,2	7,0	9,9	18,2	31,6	45,1	42,5	29,1	13,5	6,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,3	11,7	19,1	21,0	15,2	8,7	4,5	2,8	1,0	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	3,1	4,1	5,3	6,7	7,2	4,8	3,7	0,7	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,6	6,1	4,7	4,0	3,3	3,3	2,1	1,4	0,5	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,9	4,1	10,0	18,9	23,4	20,5	11,5	2,3	0,3	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,3	17,2	28,6	30,5	28,5	20,9	13,9	8,1	4,1	3,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	2,8	13,2	26,3	42,0	48,0	43,4	29,2	12,0	3,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	19,1	17,2	24,3	46,3	64,2	56,4	45,2	21,7	11,5	4,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	16,5	101,2	128,3	206,9	16,1	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	17,0	13,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	57,2	132,5	93,1	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1	500,2	434,4	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	58,6	78,4	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	45,7	14,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	31,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,3	19,6	4,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	66,9	19,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	1,2	46,9	72,0	20,5	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,2	51,9	75,3	50,9	40,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	176,3	100,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	600,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	650,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	10,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	183,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1625,6
14	Faggeta termofila e basso montana	330,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	74,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	83,9
18	Lecceta rupicola	138,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	185,1
21	Ostrieto mesofilo	70,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	85,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	61,4
26	Querceto a roverella pioniero	165,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	77,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	14,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	290,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	218,1
32	Robinetto-ailanteto	11,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,4	61,9	65,9	19,9	11,5	74,3	161,4	150,5	54,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	9,8	12,8	17,7	24,3	74,5	245,8	225,8	40,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	2,8	2,8	1,5	0,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	1,6	1,2	0,2	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	0,1	9,0	29,5	39,1	44,9	49,5	11,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,7	100,0	100,9	75,6	40,7	112,8	424,3	556,4	214,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,9	60,9	33,6	17,4	10,9	28,9	55,7	59,8	62,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	10,2	3,4	1,6	3,2	13,0	11,4	12,6	18,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	45,5	31,1	3,9	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,8	11,0	38,1	63,8	22,8	1,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	16,1	6,0	3,3	15,3	54,3	49,5	33,8	6,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0	25,9	14,5	4,8	1,4	3,3	5,6	3,3	11,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	19,7	19,0	0,3	3,2	19,1	13,5	4,4	6,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	11,3	5,2	0,7	1,8	7,3	13,7	11,1	10,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	24,1	43,7	2,2	1,7	12,8	54,5	18,3	7,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	8,5	1,9	1,8	6,2	15,6	15,0	11,5	17,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	11,1	0,5	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	41,0	25,6	1,2	7,3	62,0	57,2	58,8	37,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	44,1	32,9	9,3	9,2	21,3	35,8	29,0	36,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	6,8	2,3	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	23,3	83,4	128,2	98,5	89,6	79,7	63,4	26,7	5,7	1,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	15,8	55,5	94,8	70,8	93,5	113,9	98,1	72,2	24,9	11,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,8	2,6	4,0	1,5	0,8	0,3	0,1	0,1	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,7	1,2	0,9	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,9	1,9	4,3	9,7	18,5	36,9	39,2	36,2	21,3	14,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	40,2	149,0	320,0	359,4	317,7	249,0	130,2	49,0	10,0	1,1
14	Faggeta termofila e basso montana	31,6	47,9	49,5	52,9	51,1	45,7	30,4	16,4	4,7	0,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,9	9,8	16,4	15,6	10,5	6,8	4,6	2,0	0,4	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,1	1,1	8,2	16,6	22,4	18,7	12,6	4,2
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8	5,6	20,6	27,6	30,5	53,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	1,1	3,5	14,3	31,7	40,0	36,4	27,3	30,5
21	Ostrieto mesofilo	1,6	4,2	5,1	6,9	10,8	14,3	11,6	8,2	5,7	2,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3	2,0	5,4	7,9	12,0	18,0	16,4	12,4	6,3	4,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,3	10,8	8,2	6,7	6,5	5,2	3,7	1,9	0,7	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	3,3	19,6	23,6	15,4	19,2	32,5	27,4	18,0	4,1	1,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,7	13,1	7,1	8,5	12,8	12,4	8,6	3,9	1,3	0,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	0,3	1,9	3,6	3,9	3,0	1,0	0,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,5	11,5	22,6	31,1	49,6	68,9	50,3	37,9	11,3	5,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	8,5	26,9	43,6	44,3	36,5	28,1	17,4	8,6	3,2	0,9
32	Robiniato-ailanteto	0,1	0,6	1,1	2,0	2,9	2,0	1,1	0,6	0,3	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	49,4	246,1	155,9	132,7	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	5,3	57,5	126,9	41,6	100,7	166,3	95,8	16,6	31,7	8,5	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,3	1,7	4,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,1	0,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	51,5	75,8	23,3	8,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	126,2	519,6	555,0	386,1	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	2,2	47,4	135,7	128,4	11,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	46,3	18,9	8,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	5,9	44,8	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	22,9	42,2	45,0	27,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	29,7	50,0	62,3	34,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	13,3	49,2	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,9	35,2	38,8	4,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	30,9	12,0	11,4	6,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	28,4	96,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	39,9	30,3	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,2	9,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,2	91,2	110,0	85,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	2,4	44,3	139,7	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	3,7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	19,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	113,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	2,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	103,0
11	Cerreta mesoxerofila	61,9
12	Faggeta altomontana rupestre	24,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1019,6
14	Faggeta termofila e basso montana	216,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	153,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,7
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	18,8
21	Ostrieto mesofilo	361,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	303,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	38,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	331,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	12,8
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,4	10,3	1,1	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,5	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	8,0	3,3	1,3	3,3	15,3	44,3	26,9	11,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,7	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	0,4
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,4	17,0	2,0	4,8	7,6	13,6	22,4	16,9	18,4
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	3,1	0,9	0,5	1,6	9,0	27,3	12,7	6,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	0,1	0,1	0,7	4,5	16,8	1,6	0,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,9	255,3	369,7	39,5	19,6	32,1	148,9	87,1	66,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	84,7	20,9	5,2	2,1	14,1	41,5	18,4	29,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	14,4	5,4	1,0	2,7	25,8	60,0	30,0	13,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	4,4	12,2	1,1	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	102,8	41,8	4,0	5,1	44,9	87,9	33,7	41,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	93,1	11,7	2,7	5,5	35,8	69,8	35,6	49,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,8	3,7	4,1	2,0	3,2	5,6	8,3	5,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	50,0	5,8	1,5	5,1	58,4	136,4	43,5	30,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,2	0,2	0,1	0,2	1,2	5,7	1,0	1,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,7	10,0	1,2	0,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	1,3	3,5	7,0	5,2	2,6	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,4	41,8	38,0	15,8	6,7	2,9	1,2	0,4	0,2	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,3	0,2	0,4	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	14,4	26,1	28,1	17,6	9,8	5,2	1,6	0,3	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	13,1	11,9	10,3	7,8	7,5	5,4	3,7	1,4	0,5	0,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,3	1,0	1,7	3,4	5,8	6,4	4,5	1,2	0,1	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	25,2	72,6	148,5	198,0	221,6	188,0	120,5	40,2	4,9	0,3
14	Faggeta termofila e basso montana	2,5	8,0	18,5	36,0	52,0	48,0	30,8	14,8	4,4	1,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,0	24,9	38,5	32,5	22,0	12,5	8,7	3,0	0,8	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,6	1,3	3,5	4,7	4,5	2,5	0,9	0,6	0,0
21	Ostrieto mesofilo	1,8	7,2	19,5	38,2	60,1	76,3	66,9	51,6	25,3	14,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,8	8,3	18,8	42,0	66,7	69,9	47,8	34,7	10,5	2,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	22,8	9,1	3,9	1,7	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,5	17,7	46,7	68,2	77,4	57,6	39,5	14,9	4,8	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,3	1,4	1,1	1,6	2,3	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,4	0,9	2,0	4,2	3,7	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,0	42,1	60,0	8,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	101,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	49,0	4,2	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	19,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	307,6	550,8	147,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	154,9	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	18,9	16,0	36,3	62,5	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,3	8,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	1,2	37,5	163,5	155,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	43,9	168,4	70,0	21,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	99,4	166,0	56,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	4,0	5,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	446,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	43,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	4,3
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	775,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4779,2
14	Faggeta termofila e basso montana	91,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	48,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	45,8
21	Ostrieto mesofilo	3,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	10,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	92,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	61,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	346,4
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	19,7	42,2	58,9	66,8	48,3	103,3	81,3	25,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	4,0	2,7	5,8	4,7	5,5	7,9	6,2	6,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,1	0,4	1,1	0,5	0,9	1,1	0,1	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	99,9	145,5	126,7	136,4	88,1	104,3	40,2	34,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,1	771,0	820,7	636,9	503,0	398,9	553,3	616,1	473,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	22,8	7,2	6,8	5,7	3,6	3,4	9,1	32,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	7,6	4,8	11,3	7,8	6,5	3,9	1,8	5,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,6	1,0	3,0	3,4	15,2	16,4	5,6	0,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,5	2,4	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	1,5	0,4	1,9	2,8	3,3	0,3	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	8,9	10,9	12,0	8,2	9,3	8,5	15,0	19,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	8,9	6,7	9,9	8,0	10,1	9,7	2,7	5,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	6,6	7,5	33,1	36,6	86,5	94,7	63,7	17,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	5,7	26,0	66,5	93,5	110,3	81,7	51,5	9,7	1,0	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,7	10,9	13,8	10,7	3,8	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,2	0,7	0,8	1,1	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	2,2	7,5	27,9	86,6	180,8	204,7	157,3	77,5	22,2	8,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	199,2	438,2	666,8	850,0	972,5	805,2	527,6	229,6	69,4	20,6
14	Faggeta termofila e basso montana	2,1	6,0	16,2	20,3	18,4	13,3	7,7	4,2	1,5	1,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,5	6,2	12,5	12,6	8,5	4,2	1,6	0,3	0,2	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,6	1,7	3,5	6,5	10,4	9,0	7,6	4,6	1,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,4	0,6	1,1	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	3,0	2,8	2,0	0,5	0,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	23,8	14,8	17,0	19,6	11,6	3,6	1,2	0,4	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	4,2	5,9	9,4	12,4	13,7	9,5	5,3	1,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,8	12,4	37,1	61,1	75,5	73,2	50,6	25,7	5,5	0,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	35,4	69,7	259,4	12,9	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	75,7	587,3	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	1039,2	2335,6	1240,3	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	68,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	37,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	21,8	21,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	230,4	48,1	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	18,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	31,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	35,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	2,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	60,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	7,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	6,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	26,7
26	Querceto a roverella pioniero	66,3
27	Querceto a roverella tipico	49,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	33,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	179,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	3,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	1,4	0,7	0,0	0,0	0,1	3,8	9,8	2,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	0,3	0,6	6,3	7,6	9,1	5,1	2,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	5,5	10,5	4,3	2,1	2,7	5,4	3,5	1,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,6	0,4	0,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,4	9,2	0,6	1,2	2,4	17,2	19,3	6,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	1,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,5	2,8	0,4	0,5	2,6	5,6	4,8	5,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	10,0	3,4	0,2	5,5	6,7	18,9	11,1	10,5
27	Querceto a roverella tipico	0,1	4,8	2,6	0,0	0,0	0,0	1,3	22,6	18,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	10,8	12,6	0,0	0,4	3,3	2,5	0,7	3,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	33,0	15,4	2,8	6,5	10,2	24,7	42,2	44,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	0,9	0,6	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,0	5,2	5,4	4,0	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,1	4,4	8,6	7,2	5,2	3,1	0,7	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,4	4,7	4,2	5,5	6,5	5,9	4,0	1,9	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,5	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,4	7,7	6,4	9,2	12,8	11,2	6,4	2,7	0,6	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,5	0,5	0,4	0,8	2,3	1,6	1,7	0,1	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,1	0,1	1,1	2,1	2,2	0,7	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,0	6,2	4,9	3,6	2,6	1,8	1,0	0,4	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,3	5,7	14,6	15,2	13,2	9,2	5,3	1,4	0,2	0,2
27	Querceto a roverella tipico	2,4	8,6	14,5	11,1	7,2	3,5	1,6	0,6	0,1	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	1,5	3,8	6,1	6,7	7,7	4,7	2,9	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	6,7	14,1	19,7	23,5	30,9	37,1	26,8	14,2	5,2	1,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,1	0,6	1,1	1,0	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	8,8	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	13,9	20,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	37,8	21,1	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	4,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	18,0	8,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	37,6	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	27,6	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	9,6	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	18,1	129,1	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	331,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	51,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	36,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1262,6
14	Faggeta termofila e basso montana	385,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	133,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	118,4
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	2,9	58,6	57,9	10,2	27,9	113,7	48,7	11,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	6,7	8,9	7,4	2,8	3,5	9,7	7,4	4,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	2,4	17,1	6,0	2,1	8,5	0,2	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,5	58,1	362,0	466,3	61,6	30,8	147,7	98,0	37,7
14	Faggeta termofila e basso montana	1,6	27,0	57,0	63,4	13,6	15,7	66,0	84,9	55,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	20,1	11,4	9,0	2,6	2,0	7,0	35,8	45,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,1	0,3	0,5	0,5	0,2	0,7	0,7	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	3,8	16,0	19,9	4,6	2,1	63,8	5,8	2,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	5,1	31,2	68,5	80,0	64,1	41,5	21,9	14,5	4,1	1,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,1	12,9	16,5	11,4	5,7	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,1	1,0	2,1	4,0	9,6	8,5	8,1	2,4	0,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	9,9	41,2	116,8	232,0	294,0	267,6	179,4	89,3	26,2	6,2
14	Faggeta termofila e basso montana	18,7	55,7	79,3	77,7	65,0	46,3	25,5	12,3	4,0	0,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,5	64,8	46,2	12,7	4,3	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,5	1,2	1,3	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,4	1,7	5,5	15,5	34,0	37,5	19,9	3,4	0,4	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	47,6	114,8	129,5	0,1	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	15,6	10,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8	597,5	532,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,1	197,8	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	58,7	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	350,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	460,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	20,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	68,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1100,0
14	Faggeta termofila e basso montana	903,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	133,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	4,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	108,0
21	Ostrieto mesofilo	342,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	248,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	73,7
26	Querceto a roverella pioniero	216,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	281,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	234,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	205,5
32	Robinieta-ailanteto	39,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	4,3	13,4	34,4	14,8	27,5	116,7	126,2	13,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,6	57,1	85,3	94,2	72,4	42,5	17,8	61,0	29,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,6	8,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	1,5	1,1	0,0	0,1	0,7	1,6	0,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	6,6	3,3	6,4	10,2	5,2	13,5	20,0	2,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	336,4	237,0	179,4	139,4	21,1	5,4	28,9	152,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	221,9	123,7	125,1	91,5	44,7	35,2	110,0	151,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	20,0	37,2	16,5	4,0	1,6	13,3	32,0	9,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,5	1,5	1,5	0,6	0,0	0,1	0,7
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,5	12,5	32,4	31,0	2,6	4,5	19,8	3,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	29,7	35,5	40,7	61,8	18,3	33,9	88,6	33,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	26,0	41,3	20,6	21,1	2,9	30,4	72,9	33,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,5	13,5	6,9	0,8	0,6	11,0	25,6	9,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	6,5	33,4	42,8	21,7	3,0	24,3	77,9	6,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	23,6	109,4	45,2	2,2	1,1	25,4	57,7	17,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	29,4	82,3	63,6	15,4	1,0	10,2	22,3	10,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	22,6	23,6	27,5	61,4	24,1	10,3	25,8	10,2
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,6	6,1	4,0	0,1	0,1	3,9	21,4	2,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,4	4,9	19,4	46,6	94,2	86,9	67,6	22,4	5,3	2,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	21,4	60,7	89,7	95,2	79,7	59,0	31,3	16,6	4,8	2,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,3	1,6	5,5	6,1	5,2	1,8	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	1,4	0,7	1,5	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,7	1,3	6,6	17,2	17,9	15,2	6,9	2,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	7,2	29,8	68,9	116,1	196,6	248,0	221,5	141,4	54,8	15,7
14	Faggeta termofila e basso montana	3,6	15,2	36,4	62,6	122,4	214,0	203,3	161,7	67,9	16,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	21,3	34,5	29,1	23,1	13,8	8,4	2,2	0,9	0,2	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	1,2	1,0	1,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,7	1,7	6,8	15,5	25,5	22,8	21,3	8,2	5,5
21	Ostrieto mesofilo	0,5	3,2	4,4	10,6	59,6	83,5	90,9	59,0	22,8	7,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,6	2,2	11,7	45,9	62,1	61,6	36,3	17,6	10,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	14,7	17,7	12,3	9,2	8,1	5,6	3,3	1,5	0,9	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	1,1	7,0	18,5	34,4	49,3	45,4	37,1	17,8	3,9	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,5	28,8	40,1	41,5	49,3	51,9	38,5	20,6	4,8	0,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,1	8,4	14,7	21,3	38,1	58,0	47,5	36,5	6,8	1,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,0	3,7	9,5	20,6	41,6	52,2	45,3	26,2	4,9	0,5
32	Robinieta-ailanteto	6,5	6,9	9,8	8,2	4,5	2,1	1,0	0,2	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	31,4	157,4	134,0	27,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	80,0	126,5	106,0	44,3	77,0	21,2	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	2,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	25,4	16,5	6,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	324,6	429,0	308,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	400,7	323,2	64,6	11,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	74,6	24,5	24,6	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,2	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	1,9	27,2	55,5	20,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	5,8	102,3	160,9	65,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,5	58,0	110,4	79,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	50,0	13,4	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	16,1	128,4	67,3	3,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	87,6	154,5	39,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	1,0	51,0	118,0	62,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,7	55,8	108,4	38,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	15,6	20,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	100,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	103,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	1,4
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	124,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	605,3
14	Faggeta termofila e basso montana	123,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	84,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	3,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	61,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	33,8
25	Pioppo-saliceto ripariale	26,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	47,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	290,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	277,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	538,2
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	10,7	16,3	12,3	15,1	18,2	8,7	6,9	12,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	22,0	25,5	9,6	6,8	10,0	14,8	7,2	7,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	25,8	10,1	5,1	0,8	2,8	5,9	19,9	54,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	194,8	167,8	48,0	5,6	13,3	16,6	40,1	118,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	2,9	6,8	6,9	18,1	28,1	30,9	20,8	9,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,9	6,9	6,6	17,0	18,4	27,6	4,6	2,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	0,6	0,4	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,4	0,1	1,8	17,7	11,3	11,3	10,4	6,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	4,0	5,0	5,0	4,0	0,8	1,9	5,9	7,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	5,3	3,4	2,6	1,3	0,8	1,8	1,2	10,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	1,0	11,0	16,3	7,0	3,2	5,1	2,3	1,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	60,9	89,7	11,2	11,2	15,9	36,2	43,0	21,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	8,6	4,9	5,6	36,6	84,8	72,5	45,9	18,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	27,4	13,9	12,0	50,8	101,6	152,6	113,5	66,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,4	7,2	16,7	26,2	23,9	15,4	6,6	1,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,6	12,4	18,0	22,4	20,3	13,4	5,7	1,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,9	7,5	12,8	20,2	31,7	28,0	17,4	4,4	0,5	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,6	16,5	46,7	81,2	123,9	137,8	106,6	64,3	18,0	5,6
14	Faggeta termofila e basso montana	1,2	5,9	9,7	13,7	18,1	27,2	22,4	17,5	5,6	2,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	10,8	18,1	12,4	13,1	13,3	10,9	4,6	0,8	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	0,9	0,6	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,9	3,5	7,9	12,0	15,2	11,5	8,3	1,4	0,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,1	1,2	1,4	4,8	8,6	7,7	5,5	2,9	0,5	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,0	4,8	2,7	1,7	1,6	2,6	2,4	1,4	0,2	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	3,9	3,0	6,4	7,3	11,0	7,9	6,0	1,6	0,2	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	18,7	30,5	30,1	41,7	54,0	53,7	38,2	18,2	4,6	0,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,6	8,4	19,2	36,5	56,6	61,0	48,7	28,5	11,9	4,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,2	20,8	54,4	87,7	115,9	112,7	84,8	43,1	11,9	2,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	60,7	10,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	21,2	63,5	9,6	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	62,7	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	262,5	193,9	112,1	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	98,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	10,7	45,5	7,9	19,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,7	43,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	12,1	20,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	4,1	0,1	10,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	33,8	13,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	79,3	152,4	45,9	12,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	8,2	191,2	71,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	205,0	206,0	109,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	6,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	42,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,1
26	Querceto a roverella pioniero	92,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	97,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	219,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	29,3
32	Robinieta-aillanteto	18,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,2	2,1	0,4	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,9	1,0	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,6	0,8	0,3	0,5	6,0	21,1	11,5	1,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,7	0,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	5,0	1,3	3,4	4,9	27,8	28,6	13,5	7,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	12,5	2,2	0,7	1,5	9,7	33,3	24,2	12,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	6,7	1,7	1,8	14,0	53,3	80,0	46,4	15,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,2	1,2	5,2	3,5	10,7	6,1	1,8	0,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,1	0,1	0,2	0,4	6,8	4,7	3,4	1,4
32	Robiniato-ailanteto	0,6	26,2	7,5	11,7	26,4	118,6	178,0	104,4	39,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	1,9	1,4	0,5	0,3	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	15,2	17,0	7,9	1,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,4	0,9	1,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	21,9	29,5	20,9	14,3	5,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	11,7	36,9	29,4	14,6	3,5	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	14,3	57,3	70,0	46,3	21,0	7,0	2,8	0,4	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,8	1,5	2,8	7,1	7,8	6,1	2,6	0,5	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	2,0	5,9	4,1	3,5	1,6	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	27,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	87,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	39,3	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,8	33,1	126,6	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	1,8	15,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	13,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	37,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	39,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	5,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	11,1
26	Querceto a roverella pioniero	107,3
27	Querceto a roverella tipico	12,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	537,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	68,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	14,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,0	0,6	0,6	1,2	1,9	5,5	1,3	1,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,4	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	13,5	7,2	1,4	0,4	1,0	6,2	2,6	5,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,8	4,9	1,8	0,9	8,3	7,6	10,1	2,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,2	2,9	0,4	0,0	0,0	0,6	0,5	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,4	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,3	0,8	0,6	0,8	4,4	1,0	1,4	0,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	17,8	23,3	14,2	9,5	14,2	15,0	7,0	6,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,6	5,7	0,6	0,1	0,1	0,0	0,6	0,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,9	176,8	141,1	33,5	10,6	19,6	54,9	45,2	54,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5	27,1	12,4	3,5	0,8	3,4	10,4	6,2	4,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,2	0,6	3,2	2,0	2,7	3,8	1,9	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,8	2,5	2,0	2,2	2,7	2,2	0,8	0,3	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	1,2	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,7	15,4	8,7	4,2	2,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,1	6,6	10,3	9,6	6,1	2,9	1,0	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3	0,6	0,9	1,6	1,2	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,5	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,1	2,8	1,6	0,9	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	9,9	22,7	23,8	18,5	14,3	10,7	5,7	1,4	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,7	5,5	5,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	46,9	120,4	111,7	95,5	75,0	52,0	25,6	8,6	1,7	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	5,3	8,0	13,9	15,6	13,6	8,4	3,6	0,4	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,3	2,4	3,9	3,8	2,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	7,1	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	5,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	13,8	68,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	15,6	449,2	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	1,7	61,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	3,4	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	124,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	31,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	20,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	74,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	13,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	145,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	46,5
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	43,5
21	Ostrieto mesofilo	49,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	19,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	83,1
26	Querceto a roverella pioniero	31,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	48,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	30,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	353,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	18,0
32	Robinetto-ailanteto	69,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,5	0,9	2,2	4,9	23,4	67,9	23,1	1,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,8	19,1	4,6	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	8,4	7,8	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	8,4	45,1	18,9	1,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	8,1	3,9	0,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	16,0	27,1	19,9	7,6	12,4	26,1	25,3	10,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,2	13,6	16,3	13,0	3,3	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,6	6,6	11,3	14,2	9,4	1,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,1	0,7	5,3	34,4	9,0	0,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,8	8,3	7,0	1,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,8	13,1	23,7	11,8	5,0	3,1	8,8	9,1	7,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,1	15,0	1,1	0,5	2,5	6,5	1,6	0,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	13,9	24,1	2,1	1,6	2,4	2,5	1,1	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,9	2,0	0,8	0,1	1,5	12,9	10,5	1,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,7	1,6	0,5	11,9	37,9	190,5	94,7	14,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	10,0	6,2	0,4
32	Robinietao-ailanteto	0,2	10,1	20,2	20,6	1,7	1,3	7,3	5,7	2,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,3	20,0	26,3	25,9	25,5	15,5	6,5	1,9	0,4	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	4,6	7,9	9,4	6,2	3,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	3,5	9,5	5,9	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,4	1,8	8,8	17,2	19,6	14,6	7,7	4,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	1,1	0,7	0,8	1,6	2,9	3,2	2,3	1,0	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	34,9	50,1	33,3	15,5	6,7	3,2	1,4	0,4	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,3	3,7	9,5	12,3	11,2	6,4	2,3	0,7	0,2
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,3	1,4	4,7	7,7	10,4	6,7	6,0	3,1	3,1
21	Ostrieto mesofilo	0,5	3,5	5,9	10,7	12,1	10,4	4,3	1,9	0,4	0,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,5	2,6	3,2	3,4	4,2	3,1	1,9	0,6	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	54,6	11,6	5,3	3,2	3,0	2,1	1,9	1,1	0,3	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,2	2,2	3,0	3,3	6,4	7,8	5,4	1,3	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,5	4,2	5,2	6,1	9,8	9,5	8,1	2,6	0,3	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,7	7,6	9,1	3,7	3,9	2,8	2,0	0,5	0,1	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,9	7,3	31,2	71,2	100,7	76,6	38,5	14,0	6,6	4,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,6	3,3	3,9	2,8	3,4
32	Robinieta-ailanteto	9,3	13,8	15,8	13,5	9,2	4,9	2,3	0,4	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	6,0	55,3	49,8	6,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,8	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,3	44,4	21,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	8,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	135,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	12,2	32,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	27,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	13,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	74,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,6	26,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	16,9	26,4	2,3	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,6	24,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	26,4	101,5	89,1	84,7	46,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	8,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	168,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	24,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	7,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	25,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	136,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	11,5
21	Ostrieto mesofilo	39,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	17,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	27,4
26	Querceto a roverella pioniero	142,2
27	Querceto a roverella tipico	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	168,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	41,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	64,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	6,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	10,1	25,5	50,1	36,3	6,1	9,2	22,3	8,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	6,8	11,3	0,8	1,8	0,0	0,0	0,0	3,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	2,4	4,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	12,2	11,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	26,9	18,2	16,7	25,4	14,4	7,6	11,5	16,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,8	5,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	12,4	26,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	5,6	8,6	1,5	0,1	0,0	0,0	0,5	1,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,6	4,3	5,4	4,2	2,9	0,3	1,4	3,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	35,8	46,1	22,5	3,8	1,1	5,7	13,9	13,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	57,5	50,6	25,0	12,6	3,7	1,7	2,1	15,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	12,7	5,1	0,5	0,1	1,5	5,4	4,5	11,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	24,5	16,3	10,4	3,3	0,3	0,0	1,0	9,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,5	1,4	1,1	0,3	0,2	0,2	0,1	1,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,8	19,0	27,3	26,2	33,4	26,5	20,9	7,9	0,9	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,2	1,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	2,9	7,1	7,4	3,5	1,6	1,2	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,3	1,0	1,9	1,9	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,4	2,0	6,7	7,0	7,1	2,2	0,2	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	46,3	28,2	21,1	18,6	13,2	5,3	2,4	1,4	0,3	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,7	2,4	3,3	3,1	1,5	0,3	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,7	4,3	10,4	10,9	9,0	3,3	0,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	0,3	0,7	1,2	2,2	4,7	3,8	3,5	0,4	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,5	7,1	4,9	3,7	2,2	2,0	1,6	0,7	0,4	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	1,8	9,7	24,0	37,7	34,7	18,8	9,5	3,9	1,7	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,9	12,0	23,3	31,3	35,3	28,1	18,7	8,5	2,7	0,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,5	2,3	5,1	8,9	9,6	8,2	3,9	2,1	0,6	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	1,0	3,0	11,8	19,8	15,6	9,3	3,3	0,7	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,1	0,8	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	53,6	57,0	33,9	20,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,1	3,7	15,2	1,4	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	95,4	26,6	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	1,7	1,9	4,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	3,1	30,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	3,0	2,0	11,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	10,1	6,0	9,4	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,8	60,1	56,0	17,2	4,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	12,7	95,3	56,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	30,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	14,2	12,7	29,4	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	5,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	74,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	11,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	194,5
16	Lecceta costiera termofila	4,2
17	Lecceta mesoxerofila	306,7
18	Lecceta rupicola	74,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	6,7
21	Ostrieto mesofilo	3,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	121,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	87,9
26	Querceto a roverella pioniero	79,6
27	Querceto a roverella tipico	2,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	110,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	199,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	176,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	8,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	4,9	19,0	15,8	9,6	15,3	3,4	3,2	3,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	5,2	4,4	0,3	0,4	0,4	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	23,1	42,4	39,1	26,8	30,4	6,5	9,4	16,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	0,1	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	11,2	118,4	43,2	5,2	5,4	99,9	22,9	0,4
18	Lecceta rupicola	0,0	3,2	9,8	16,2	4,3	13,6	24,5	2,5	0,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,4	3,0	1,5	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	1,1	2,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	13,3	94,2	13,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	20,3	20,9	5,6	3,6	6,2	8,4	7,7	15,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	7,4	20,2	34,4	2,6	3,3	6,1	4,5	1,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	20,4	49,9	21,1	1,0	1,3	2,9	4,6	9,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	4,0	6,8	8,5	55,8	59,9	50,8	12,4	0,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	22,1	80,3	61,8	5,8	0,4	0,0	1,3	4,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,4	2,3	1,4	0,4	1,0	0,8	1,8	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,0	2,6	8,1	16,9	20,9	17,3	6,3	1,0	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	0,6	1,0	2,3	2,4	2,9	1,6	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	60,4	13,8	17,6	29,1	29,9	24,1	12,7	4,4	1,5	1,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,2	1,0	0,3	0,3
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,8	4,4	25,0	60,7	86,3	74,6	38,6	16,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	1,1	5,3	11,1	13,7	13,7	9,9	20,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,1	0,2	0,3	1,1	1,8	1,8	0,6	0,3	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,4	0,5	0,3	0,4	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,5	3,2	11,0	30,0	36,1	27,7	10,1	2,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,5	11,2	8,1	7,7	8,3	7,2	6,4	4,8	3,6	6,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,8	2,9	5,6	13,8	25,0	17,5	11,6	2,3	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	0,8	0,6	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,5	8,8	14,6	18,9	20,8	18,3	11,8	7,4	3,7	1,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,5	1,4	6,9	25,4	35,3	39,0	33,2	25,8	16,8	14,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5	1,6	6,5	27,0	47,5	49,6	32,0	10,2	1,2	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,4	1,5	1,0	0,7	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,7	58,3	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	3,8	6,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	138,6	52,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,3	64,7	113,0	104,6	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	3,9	30,7	16,0	15,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	2,5	2,5	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,7	23,4	42,0	45,5	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	77,6	9,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,1	45,0	23,2	0,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	21,2	59,9	8,3	16,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	17,6	128,3	44,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	60,6	93,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	8,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	63,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	74,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	58,2
11	Cerreta mesoxerofila	49,9
12	Faggeta altomontana rupestre	2,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	631,8
14	Faggeta termofila e basso montana	53,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	177,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	9,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	15,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	165,7
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	5,1	50,5	5,1	2,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,8	1,6	4,9	8,4	15,4	27,4	11,6	4,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	1,6	0,6	1,9	6,1	9,9	10,9	20,1	7,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,2	1,5	0,1	0,0	0,4	1,6	12,9	24,2	9,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	131,9	287,4	79,5	15,5	17,4	20,3	25,8	53,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	2,0	1,3	1,6	3,8	10,2	11,3	15,3	7,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	7,4	7,8	6,5	8,6	20,4	59,8	48,0	18,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,2	0,1	0,5	0,7	2,4	2,0	1,2	0,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	1,2	6,1	5,9	2,5	0,1	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	0,4	0,4	0,3	0,5	0,5	1,4	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,2	0,8	1,4	3,0	52,4	88,4	14,3	4,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,5	6,9	3,0	2,2	5,6	15,3	19,0	10,9	0,2	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,2	32,9	22,3	8,2	2,8	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	4,2	14,5	15,7	10,7	6,3	3,6	1,7	0,7	0,4	0,4
11	Cerreta mesoxerofila	7,8	28,9	9,0	2,7	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	0,5	0,5	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,1	23,2	53,0	100,5	136,5	136,8	99,7	55,0	16,5	4,4
14	Faggeta termofila e basso montana	3,9	10,7	13,2	9,8	6,8	4,2	2,5	1,2	0,6	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,2	86,9	47,5	17,3	6,1	2,1	0,4	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,7	1,0	1,6	1,9	1,8	1,1	0,7	0,2	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,5	1,4	1,9	2,2	3,2	3,1	2,4	1,1	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	1,9	1,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,4	3,2	14,1	35,8	50,3	36,4	19,7	5,2	0,4	0,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	16,6	34,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	268,9	234,8	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	176,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	88,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	15,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	2,5
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	207,6
11	Cerreta mesoxerofila	0,5
12	Faggeta altomontana rupestre	57,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	286,0
14	Faggeta termofila e basso montana	423,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	83,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	28,7
18	Lecceta rupicola	9,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	15,7
21	Ostrieto mesofilo	323,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	261,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,6
26	Querceto a roverella pioniero	2,3
27	Querceto a roverella tipico	2,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	310,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	11,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	18,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,5	1,1	1,8	2,1	0,5	4,9	3,1	1,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	0,2	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	74,8	106,9	24,2	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,2	8,8	23,4	21,6	3,1	0,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	17,6	8,9	6,1	35,4	46,8	80,5	62,8	27,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	30,9	14,8	5,4	11,6	92,3	154,2	88,4	26,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	20,9	10,7	8,9	5,9	7,3	11,7	7,2	10,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	14,9	9,5	1,6	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,8	2,8	0,9	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,3	0,1	2,1	1,2	9,2	2,5	0,3	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,1	85,7	106,4	29,7	7,2	26,8	19,5	14,9	33,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	53,3	40,5	39,2	9,0	13,5	43,3	23,8	38,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,5	1,9	0,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	26,9	30,5	13,0	6,7	34,7	162,0	17,8	19,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	3,2	2,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,4	0,1	0,0	0,3	4,8	7,9	3,1	1,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,1	4,0	2,6	1,7	1,1	1,2	1,3	1,2	0,8	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,1	0,3	0,5	0,8	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,2	4,6	38,7	62,7	59,1	33,1	7,2	2,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,1	0,5	2,4	6,3	12,7	12,9	12,2	5,4	4,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	5,8	17,8	35,6	58,9	65,8	49,8	30,1	17,8	3,9	0,5
14	Faggeta termofila e basso montana	1,6	6,2	16,1	38,9	73,8	99,9	81,7	63,2	30,1	12,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,2	19,0	26,7	18,5	7,2	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	6,2	7,0	7,4	5,6
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,4	1,8	5,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,2	0,5	1,3	2,6	3,2	3,5	2,6	1,5	0,2
21	Ostrieto mesofilo	1,5	4,8	12,2	25,0	48,3	73,1	69,7	54,1	25,3	9,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	5,9	15,5	24,7	39,9	54,7	55,2	39,0	20,9	5,0	0,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,7	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,5	0,7	0,2	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,7	0,7	0,3	0,2	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,0	11,8	29,6	44,7	74,3	74,1	61,5	9,6	0,9	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	0,2	0,5	1,2	2,0	2,6	2,2	1,6	0,4	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	0,9	1,0	1,6	2,8	4,9	3,5	2,4	0,6	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,8	9,9	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	4,1	77,0	69,9	53,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	18,2	36,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	65,0	168,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	150,9	179,3	80,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	37,1	25,4	12,1	6,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	18,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,3	12,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	10,4	161,9	120,8	26,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	62,9	162,5	34,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	1,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	94,8	119,7	70,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	4,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	446,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	36,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	193,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	431,8
14	Faggeta termofila e basso montana	29,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	206,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	28,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	19,6	63,7	105,1	31,9	76,8	100,3	27,9	20,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	1,5	6,2	13,1	10,9	1,5	0,5	0,4	2,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	19,6	58,9	60,9	9,3	9,3	16,6	6,7	12,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	115,6	151,2	56,7	13,3	5,9	6,7	13,0	69,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	14,7	10,1	2,3	1,2	0,0	0,1	0,2	1,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,3	3,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,4	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	5,8	16,8	38,6	54,4	42,5	23,1	12,5	12,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	5,4	18,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	24,6	66,6	87,5	81,1	64,4	48,4	35,8	24,1	11,0	2,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,7	8,7	12,1	8,3	2,8	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	3,3	14,2	18,5	23,7	27,5	27,3	27,4	22,5	14,3	15,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	8,3	28,0	54,9	79,9	85,9	70,0	46,9	30,5	16,2	11,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,7	2,1	2,7	3,0	3,8	5,0	6,5	3,4	2,3	0,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	2,2	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,8	0,6	0,6	0,3	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	23,1	59,5	68,3	35,8	13,1	4,9	1,8	0,3	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	1,1	5,7	8,6	5,9	3,6	1,9	0,9	0,4	0,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	77,1	103,6	95,1	85,7	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	76,6	81,6	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	84,7	302,2	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	22,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1199,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	45,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	503,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2589,5
14	Faggeta termofila e basso montana	34,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	19,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	290,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	26,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	23,4
26	Querceto a roverella pioniero	2,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	792,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	46,6
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,5	96,6	127,9	133,7	183,8	323,2	237,1	68,1	28,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	6,6	8,5	7,2	10,5	4,4	3,7	1,8	2,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,6	58,3	94,0	70,1	51,9	58,9	92,8	39,6	37,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	5,3	645,7	659,8	277,9	213,1	281,3	230,1	114,6	161,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,3	0,3	0,3	0,7	7,5	24,2	1,1	0,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,2	9,2	4,7	0,6	1,2	0,7	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	50,2	82,8	9,7	10,0	66,4	64,3	4,9	1,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	3,8	7,6	6,3	6,1	1,4	0,6	0,5	0,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	7,2	4,4	3,9	3,0	1,3	0,2	0,6	2,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,7	87,3	221,6	137,5	111,9	142,7	47,2	17,5	22,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	5,7	5,8	8,6	5,3	2,9	13,3	3,2	1,8
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	128,4	163,5	174,0	185,0	194,3	157,3	110,2	55,7	20,5	10,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,1	11,8	15,9	9,6	3,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	47,3	150,9	137,5	72,3	35,4	21,2	16,9	10,0	5,2	6,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	112,6	240,8	381,5	458,0	469,7	396,5	272,3	148,8	69,5	39,5
14	Faggeta termofila e basso montana	1,4	3,8	16,1	11,8	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	3,9	7,0	5,5	2,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	8,1	28,7	57,5	66,6	48,3	36,8	24,1	15,0	4,3	0,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,3	3,2	7,2	6,6	3,9	2,1	1,4	0,6	0,2	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,9	3,9	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	1,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	113,5	165,7	180,4	146,4	93,3	51,9	25,8	10,6	3,7	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,4	7,7	13,7	9,6	6,2	3,5	2,3	0,8	0,1	0,2
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,3	317,5	159,1	363,1	104,3	1,5	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	109,4	47,1	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	744,0	1122,5	586,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	64,8	197,2	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	13,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	272,8	495,1	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	588,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	28,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	34,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	693,7
14	Faggeta termofila e basso montana	324,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,1
21	Ostrieto mesofilo	26,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	21,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	185,5
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	37,1	62,5	80,7	68,2	65,0	107,3	119,6	48,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,1	3,4	3,0	2,2	3,2	6,5	8,4	1,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	2,3	5,9	7,2	4,3	1,6	5,1	7,0	0,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	146,8	174,0	88,0	44,0	16,4	18,4	89,7	116,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	54,6	59,4	48,4	32,1	23,8	20,9	54,4	30,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,5	1,2	1,9	0,5	0,0	0,3	4,1	3,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	0,1	1,4	2,1	0,2	0,0	0,0	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	1,4	6,7	9,5	5,8	2,2	0,1	0,1	0,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	1,4	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,6	0,9	0,1	0,0	0,2	2,0	10,8	7,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	1,3	3,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	7,4	23,6	34,2	21,6	17,9	30,8	44,2	5,7
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	8,2	30,2	76,7	125,3	144,2	113,0	65,1	23,4	2,1	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,6	4,3	6,7	6,5	5,4	2,2	1,1	0,7	0,3	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	1,2	2,5	6,0	8,6	8,3	5,1	2,0	0,2	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,7	20,8	45,8	92,8	149,5	155,9	123,0	65,8	26,6	8,7
14	Faggeta termofila e basso montana	2,6	10,7	26,7	45,8	61,5	65,8	51,6	34,0	15,3	10,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,0	1,0	1,4	2,0	2,1	1,9	0,7	0,3	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,7	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,4	0,7
21	Ostrieto mesofilo	0,2	0,8	1,2	2,2	2,7	4,1	5,3	4,2	3,0	2,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	1,1	0,6	0,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	0,7	2,7	5,8	5,0	4,3	1,6	1,1	0,2	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,9	0,8	1,2	0,5	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	3,3	3,5	8,5	22,3	48,5	48,2	34,8	12,2	3,6	0,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	183,7	161,2	141,8	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	7,9	8,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	28,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	372,2	220,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	151,9	111,8	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	19,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	17,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	78,1	78,9	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	150,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	12,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	88,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	120,0
14	Faggeta termofila e basso montana	8,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	106,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	1,1
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	25,6
21	Ostrieto mesofilo	11,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	49,8
26	Querceto a roverella pioniero	132,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	54,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	7,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	518,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	24,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,7	2,2	2,3	11,2	46,2	69,9	14,8	2,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,9	4,7	0,4	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,8	0,6	0,0	0,0	0,6	1,1	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,0	0,2	1,2	17,8	48,2	20,2	0,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	1,1	0,6	0,2	0,0	3,4	37,6	51,8	25,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,3	0,6	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	2,8	7,1	4,0	1,3	8,7	45,6	32,9	3,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,1	13,1	8,6	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	7,6	3,2	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,1	0,6	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6	5,1	13,2	7,5	3,5	3,5	6,7	5,7	4,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	0,6	2,0	1,9	11,5	58,2	55,0	2,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	10,9	7,5	2,5	1,5	5,1	13,3	8,3	5,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,0	2,2	2,2	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	18,3	14,4	13,3	19,1	101,8	252,5	85,6	13,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,1	3,3	9,4	3,9	1,3	1,7	2,3	1,5	1,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,2	12,9	16,0	16,1	24,2	28,0	23,9	15,5	7,5	2,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	2,0	2,9	3,2	2,4	1,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,6	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,2	0,4	0,5	2,0	9,2	17,7	21,3	18,8	18,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	1,9	3,1	5,6	15,7	25,2	30,0	21,8	12,0	4,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,1	0,6	2,2	2,4	2,1	0,6	0,1	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	22,2	42,6	20,6	9,9	5,2	3,7	1,8	0,6	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,2	1,2	5,0	6,0	5,4	2,6	1,4	3,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,2	2,9	4,0	3,4	1,0	0,1	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,3	1,7	1,1	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	44,8	3,9	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	7,1	33,8	28,4	18,0	17,0	14,0	8,6	4,3	0,7	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,6	6,1	10,8	13,4	11,9	6,4	3,3	0,8	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,2	0,9	1,3	2,0	1,7	1,1	0,4	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	8,6	31,5	80,1	105,2	112,1	90,2	52,8	23,9	7,5	6,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	11,1	3,7	3,8	3,2	2,1	0,6	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	12,8	51,9	57,6	28,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	35,4	29,4	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	42,7	68,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	95,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	2,8	0,3	9,3	10,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	9,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	17,5	54,3	54,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	16,4	4,1	5,3	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	6,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	28,6	98,5	286,8	81,8	23,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	57,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	79,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	530,0
11	Cerreta mesoxerofila	3,6
12	Faggeta altomontana rupestre	67,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	966,6
14	Faggeta termofila e basso montana	453,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	183,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	22,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	49,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	155,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	3,9	1,5	5,7	8,7	8,6	9,0	14,0	6,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	12,1	8,0	8,5	13,3	14,3	4,8	5,4	13,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	29,8	36,6	60,3	92,6	149,5	99,6	47,9	13,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	0,4	0,7	0,5	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	8,0	7,6	9,9	25,7	3,1	3,5	4,7	4,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	159,5	254,1	157,7	81,2	53,1	39,4	92,9	128,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,5	51,0	122,2	75,7	82,9	52,3	15,7	21,5	31,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,3	7,1	28,2	46,2	45,0	19,7	20,3	13,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,6	5,7	11,1	3,8	1,6	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	1,8	2,3	0,6	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,3	9,2	10,9	5,5	7,0	7,8	4,8	1,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	15,2	33,7	29,9	21,7	11,0	14,2	13,6	16,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,9	12,0	14,1	13,1	9,7	5,5	1,0	0,3	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	14,4	32,8	19,4	6,9	3,8	1,6	0,3	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	20,1	114,5	166,1	118,3	62,8	28,7	13,2	4,8	1,3	0,2
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	0,9	0,4	0,6	0,6	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,7	2,3	4,7	8,1	11,4	12,7	13,4	9,0	3,3	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	21,7	64,3	112,0	174,9	199,5	181,1	123,8	61,6	20,9	6,7
14	Faggeta termofila e basso montana	13,0	43,3	69,2	76,4	72,0	69,0	52,5	37,2	15,6	4,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,4	56,0	65,5	34,8	12,9	4,3	1,3	0,8	0,3	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,2	1,2	3,5	5,1	5,7	3,7	2,5	0,6	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	1,3	1,2	0,4	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,5	8,9	11,6	9,4	6,8	4,3	2,8	1,9	0,9	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,1	9,6	19,0	27,1	34,8	30,8	21,8	8,1	1,6	0,5
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,5	38,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	10,5	42,2	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	318,2	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	16,7	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,4	560,9	223,3	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	121,4	233,1	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	73,7	71,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	13,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	26,9	18,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	77,4	60,6	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,4	0,3	0,2	0,5	1,1	1,1	1,7	2,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	299,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	83,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	78,3
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	113,6
21	Ostrieto mesofilo	63,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	154,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	4,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	14,5
26	Querceto a roverella pioniero	223,3
27	Querceto a roverella tipico	2,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	128,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	249,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	11,1	49,3	90,1	80,9	46,4	8,0	6,7	7,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,0	2,0	0,8	0,4	0,7	0,4	1,4	1,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	9,8	24,6	21,0	7,3	6,2	1,4	4,9	8,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	4,1	5,7	17,2	35,6	12,1	3,4	0,1	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	15,3	43,6	31,9	10,6	3,6	0,6	1,9	6,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	23,6	28,9	2,7	0,2	0,0	0,0	0,1	7,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	37,6	66,0	23,9	4,0	2,3	1,5	4,2	15,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	2,2	1,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,9	3,0	1,8	0,2	0,0	0,1	1,9	1,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	16,9	55,2	60,0	49,7	20,7	5,8	6,8	8,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	32,6	43,7	15,8	6,0	1,8	1,1	9,4	17,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	30,1	63,0	59,9	38,4	44,0	3,2	3,0	7,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	8,8	25,8	52,4	70,7	67,7	43,9	23,4	5,6	1,0	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	1,0	2,3	2,4	1,6	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,8	12,1	20,9	21,6	14,9	7,3	2,1	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,1	0,3	1,4	4,3	14,2	23,3	19,5	12,6	2,1	0,6
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	4,2	13,8	27,1	29,0	20,5	12,3	4,9	1,4	0,2	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,1	1,1	3,2	6,7	14,4	16,0	13,9	6,3	1,5	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,6	7,0	17,6	30,5	33,5	31,4	18,4	9,0	4,3	1,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	1,1	1,2	1,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,5	2,1	3,2	2,7	2,3	1,9	1,1	0,6	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	7,0	27,3	42,4	50,2	42,1	30,7	15,9	6,3	1,5	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,1	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,2	14,9	22,7	25,6	24,1	19,0	11,2	5,5	0,8	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,2	16,9	50,0	69,9	60,2	32,6	14,7	2,5	0,5	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	14,9	120,8	132,7	30,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,8	1,0	4,9	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	2,0	33,2	20,7	25,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	24,9	42,4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	20,2	85,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	11,3	31,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	11,7	64,4	72,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	1,7	4,1	6,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	23,6	110,2	57,3	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	6,0	79,3	24,5	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	1,1	19,4	131,1	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	60,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	60,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	16,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	58,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	26,8
26	Querceto a roverella pioniero	125,7
27	Querceto a roverella tipico	3,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	158,8
29	Rimboscimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboscimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	26,3
31	Rimboscimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	80,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	4,0	2,0	4,7	8,6	9,7	22,1	6,6	3,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,0	0,1	0,3	0,5	0,3	1,6	1,9	1,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,3	1,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,1	5,1	1,4	3,8	8,8	13,6	11,0	10,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,7	8,4	2,6	0,6	1,1	0,2	1,4	1,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	10,7	40,6	4,0	1,6	0,5	0,4	0,8	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	3,8	1,8	2,2	2,8	2,8	2,3	5,4	5,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	8,3	5,6	3,5	13,3	20,0	47,3	17,3	10,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	0,9	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	18,1	51,8	18,2	10,1	9,2	22,0	17,7	11,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	7,6	1,3	0,6	1,0	0,7	1,6	7,5	6,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	13,4	9,1	5,8	6,7	7,3	16,3	12,1	9,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	10,0	13,7	8,9	6,1	6,7	7,6	4,2	2,4	1,1	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,9	2,5	1,5	1,5	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	1,9	1,1	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,5	15,8	14,8	9,8	5,7	2,3	1,0	0,2	0,1	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,4	1,6	2,7	4,2	4,3	1,9	0,7	0,3	0,2	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,8	3,0	7,0	8,8	11,5	11,3	8,3	4,4	3,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,0	4,9	3,9	3,2	2,5	1,8	1,7	1,6	1,2	2,1
26	Querceto a roverella pioniero	9,0	20,6	23,0	22,4	20,9	16,8	8,7	3,4	0,7	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,8	1,0	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,2	16,3	22,3	27,9	31,4	24,9	16,6	7,3	2,4	2,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,2	5,1	7,2	4,2	3,7	2,5	1,6	0,5	0,2	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	11,5	19,3	18,7	15,0	8,9	4,1	1,6	0,9	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	24,8	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	4,0	44,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,3	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	6,6	32,6	19,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	1,7	23,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,2	99,4	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	9,8	110,4	37,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	17,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	17,8	60,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	41,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	4,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	97,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	53,8
18	Lecceta rupicola	4,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	45,7
21	Ostrieto mesofilo	3,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	47,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,4
26	Querceto a roverella pioniero	44,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	67,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	245,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	160,8
32	Robinieta-ailanteto	25,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,2	1,7	1,5	3,5	16,3	17,6	0,7	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,3	0,2	0,6	0,0	1,8	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,5	0,7	0,5	0,4	1,4	1,6	1,2	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,5	2,3	1,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	9,3	12,4	8,2	8,5	26,6	28,0	3,0	1,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,9	0,1	0,2	0,9	6,3	34,9	7,2	3,2
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,7	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,2	0,1	0,6	3,9	37,1	3,7	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,2	2,8	0,2	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,7	7,6	3,0	0,5	1,2	29,5	2,7	1,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,9	1,3	1,7	1,4	1,7	0,1	0,1	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,0	0,6	2,6	2,6	11,3	25,6	0,7	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	8,0	9,7	2,8	6,3	39,3	0,9	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	14,3	27,1	10,9	10,0	55,3	92,6	28,0	7,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	2,1	0,6	2,3	10,3	53,4	63,9	24,8	3,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,5	1,1	2,5	3,3	12,2	4,5	0,1	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,7	3,1	8,3	12,3	7,8	5,8	2,3	0,3	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	0,6	1,0	0,5	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,9	2,5	1,1	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	0,5	0,9	1,0	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,9	28,5	29,2	17,5	8,0	3,8	0,9	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,1	0,9	3,5	6,5	8,1	13,1	12,2	7,9	1,4	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	1,7	0,6	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	0,3	0,8	3,0	5,2	14,2	13,6	8,1	0,4	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,2	0,9	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3	0,8	1,8	5,7	13,6	14,3	8,6	2,4	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,6	1,9	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,3	5,3	7,7	13,8	11,1	4,7	0,7	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,3	7,4	15,6	16,5	13,7	8,0	3,3	0,3	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	13,3	41,2	56,6	58,5	43,9	22,8	7,7	1,0	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,2	7,7	26,7	34,5	36,5	29,5	18,1	5,5	0,9	0,2
32	Robinietao-ailanteto	2,2	7,2	8,0	4,9	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	1,9	24,5	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	11,3	86,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	38,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	2,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	3,5	37,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	9,7	46,6	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	7,3	208,5	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	110,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	3,1	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	29,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	21,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	4,3
11	Cerreta mesoxerofila	15,4
12	Faggeta altomontana rupestre	55,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	536,4
14	Faggeta termofila e basso montana	369,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	33,8
16	Lecceta costiera termofila	225,6
17	Lecceta mesoxerofila	358,3
18	Lecceta rupicola	4,3
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	83,9
21	Ostrieto mesofilo	265,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	166,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	72,1
26	Querceto a roverella pioniero	21,9
27	Querceto a roverella tipico	141,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	912,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	6,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	1,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,4	1,9	1,5	1,3	13,7	10,0	0,0	0,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	0,7	2,9	5,0	6,4	3,9	1,6	0,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	0,6	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	3,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	1,1	0,4	3,0	8,7	1,6	0,1	0,1	0,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	7,0	9,6	7,4	4,7	7,9	11,2	3,0	4,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	128,8	74,9	54,0	29,5	41,8	65,8	78,6	63,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	8,2	59,9	77,9	62,4	46,1	52,3	43,3	19,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,8	4,0	5,9	4,1	6,5	8,1	2,0	1,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,1	0,2	1,2	21,8	116,0	68,4	14,8	3,1
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,7	0,6	13,7	46,0	110,4	88,2	81,4	17,3
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	1,9	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,8	18,0	11,6	12,5	14,7	13,6	7,5	1,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	56,6	96,0	63,8	19,8	12,7	1,7	1,7	13,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,5	0,6	8,9	25,3	84,9	34,3	5,3	6,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	8,1	10,4	7,5	5,5	12,6	12,2	9,0	6,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	2,8	0,8	1,1	4,6	10,4	1,4	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	3,6	7,6	8,0	15,4	28,7	38,9	26,4	13,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	163,6	269,8	140,1	64,0	61,8	87,4	67,9	57,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3	5,7	1,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	1,6	1,4	0,6	0,1	1,2	1,4	0,2	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	0,6	2,2	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,1	1,8	7,3	8,0	6,6	3,1	0,6	0,4	1,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,9	1,6	3,1	4,3	5,1	3,4	1,6	1,3	0,2	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,4	1,6	1,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,2	0,6	1,6	3,8	4,1	2,4	1,5	1,0	0,2	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	1,4	6,8	8,5	6,9	6,6	6,0	4,8	14,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,5	7,4	25,1	56,6	91,6	108,7	100,3	74,7	40,2	30,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	0,9	7,6	27,6	52,6	82,0	85,6	66,8	36,0	10,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,9	9,0	6,3	4,7	4,1	2,3	1,0	0,4	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	1,1	2,3	9,3	21,4	43,6	59,3	44,3	32,8	10,2	1,2
17	Lecceta mesoxerofila	0,4	1,2	4,2	14,6	46,8	82,7	87,8	69,8	38,8	11,9
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,7	1,0	0,7	1,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	1,1	5,5	9,5	13,7	13,5	13,1	8,8	18,3
21	Ostrieto mesofilo	0,2	3,1	11,9	21,9	31,2	46,9	50,1	46,2	32,6	21,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,4	1,5	4,4	14,9	31,5	39,3	35,6	24,2	11,0	3,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	23,0	21,9	12,3	6,5	4,0	2,3	1,4	0,4	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,7	0,7	1,8	4,0	5,3	5,2	3,0	1,0	0,2
27	Querceto a roverella tipico	7,5	12,3	24,5	34,7	29,6	18,0	9,9	4,0	1,2	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	27,5	70,1	150,0	223,8	203,1	129,6	64,9	26,4	9,9	6,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,2	0,8	1,5	1,7	2,5	1,7	1,1	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,5	2,3	1,5	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	1,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	19,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,3	11,4	3,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	0,4	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	1,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	27,2	21,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	73,9	204,8	225,3	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	106,4	145,7	91,4	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	17,7	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	1,2	89,4	108,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	39,7	161,3	148,4	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	1,4	13,9	21,9	8,9	18,8	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	20,1	114,9	93,4	34,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	18,1	17,5	43,5	80,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	66,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	3,9	14,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	42,6	55,8	30,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	118,2	513,3	240,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,6	8,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	4,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	19,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	260,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	38,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,6	2,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,1	2,0	2,7	1,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6	5,5	5,3	1,2	1,7	2,4	0,9	0,8	0,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	114,5	102,8	21,6	4,7	1,8	0,3	2,4	12,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	19,1	9,5	1,9	1,4	5,2	0,0	0,0	1,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,2	2,2	2,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	4,3	1,0	0,3	0,7	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,7	2,4	2,1	1,8	1,8	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,2	22,0	31,3	31,9	35,1	42,7	32,9	27,7	14,8	17,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,8	4,8	8,7	10,4	8,9	3,8	0,9	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	5,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	4,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	23,3	127,2	75,2	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	7,9	26,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	11,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	76,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	723,8
9	Castagneto da frutto	37,9
10	Cerreta mesofila	570,4
11	Cerreta mesoxerofila	172,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	208,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	317,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	24,4
21	Ostrieto mesofilo	171,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	58,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	26,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	94,8
26	Querceto a roverella pioniero	38,7
27	Querceto a roverella tipico	31,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	272,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	18,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	6,4
32	Robinetto-aillanteto	7,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,2	2,9	1,4	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	6,8	9,3	10,0	9,0	10,5	14,1	9,7	7,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,1	104,8	148,3	182,3	105,3	39,6	46,3	39,8	57,3
9	Castagneto da frutto	0,0	9,6	12,8	6,6	1,6	1,0	1,4	1,7	3,2
10	Cerreta mesofila	0,0	41,6	35,5	48,9	76,1	109,8	115,6	87,9	55,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	2,4	7,1	11,9	20,7	37,8	61,9	25,6	5,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	30,7	20,9	16,9	12,7	10,1	26,6	36,9	53,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	38,4	45,4	47,1	33,6	46,3	53,8	30,2	23,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,5	8,6	5,3	0,1	0,3	4,9	3,2	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,1	40,5	66,4	17,1	3,2	3,9	18,0	13,0	9,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	6,1	11,3	11,4	3,0	4,6	8,0	7,5	6,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	3,8	5,8	5,4	2,7	2,6	2,2	1,3	2,9
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	9,9	13,6	9,7	7,1	14,0	17,1	15,0	8,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,6	1,1	2,0	12,1	19,5	3,4	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	9,1	20,3	1,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,1	3,6	6,0	6,9	57,5	155,9	34,8	6,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	4,4	7,0	0,4	0,4	4,4	1,4	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,8	1,7	1,0	1,1	1,5	0,3
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,4	0,4	0,7	0,3	1,9	2,8	0,8	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,2	1,6	3,4	3,0	2,6	0,7	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,9	16,3	25,7	16,8	8,2	3,1	0,9	0,4	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	11,7	34,4	78,9	139,7	171,1	144,6	89,5	40,6	10,6	2,7
9	Castagneto da frutto	0,6	2,9	7,2	10,2	9,2	5,3	2,0	0,4	0,1	0,0
10	Cerreta mesofila	10,8	29,0	72,6	136,3	151,0	103,7	49,7	14,4	2,5	0,4
11	Cerreta mesoxerofila	1,1	6,0	20,1	39,5	46,6	36,3	17,0	5,0	0,7	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	3,3	10,7	26,9	45,4	48,6	35,4	21,0	11,1	4,5	1,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	12,4	42,3	88,7	86,4	55,0	25,8	6,0	1,0	0,2	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,4	1,5	3,7	3,9	3,0	2,2	2,5	2,2	4,9
21	Ostrieto mesofilo	1,4	6,1	18,7	28,6	37,9	33,8	22,4	12,8	5,6	4,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,5	7,9	13,6	15,7	10,1	5,3	2,4	1,1	0,1	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,2	1,6	3,9	6,4	6,0	4,3	2,2	1,0	0,1	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,2	19,4	15,5	12,4	7,0	3,0	1,6	0,6	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	1,2	6,9	7,9	6,3	6,5	3,9	4,1	1,4	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,5	2,6	4,6	5,4	6,1	5,6	4,8	1,2	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,8	12,0	40,8	56,8	55,5	47,6	30,7	21,9	4,4	0,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,1	2,6	3,8	3,8	2,2	2,2	1,3	1,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	0,5	0,6	1,4	1,6	1,2	0,8	0,2	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,6	1,2	1,3	1,7	1,3	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,6	10,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	5,1	52,4	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	60,2	555,8	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	55,2	471,0	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	27,4	114,8	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	103,6	44,0	57,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	47,2	251,0	19,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	14,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	108,9	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	40,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	12,6	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	41,7	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,6	18,6	12,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	20,4	102,8	137,3	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	1,2	12,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	6,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	9,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	52,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	51,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	110,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,8
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	31,3
21	Ostrieto mesofilo	0,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	10,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	22,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	11,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	44,3
32	Robinetto-ailanteto	3,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,4	1,6	1,2	1,1	3,0	1,2	0,1	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	4,7	3,0	7,0	26,5	7,8	0,5	2,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	24,9	24,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	10,7	11,6	5,1	16,6	25,6	34,9	4,2	1,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,8	7,6	3,4	6,0	10,0	2,7	0,2	0,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	3,7	3,1	0,6	2,5	1,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	1,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,4	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	1,8	0,9	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	12,2	6,6	0,0	0,1	3,0	0,4	0,0	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,4	0,7	0,4	0,3	0,9	7,8	1,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	9,1	6,9	0,4	1,5	13,4	11,2	1,4	0,6
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,4	2,2	1,2	1,6	1,7	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	8,0	3,1	1,0	3,8	10,1	11,7	9,3	4,9	0,9	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,7	3,2	10,1	16,4	12,6	7,5	0,8	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,5	23,9	26,0	23,1	17,8	9,6	3,7	0,5	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,4	1,0	3,4	6,4	8,7	6,7	3,7	0,8	0,2	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,3	0,9	2,0	3,5	2,5	1,5	0,2	0,1	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,7	1,1	1,0	0,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,4	3,7	6,3	7,1	3,3	1,7	0,2	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,1	0,6	2,9	4,1	2,6	0,7	0,3	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	1,6	4,2	11,2	14,3	7,0	5,4	0,5	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	0,4	0,9	1,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,8	0,0	19,5	23,0	6,2	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	65,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	18,0	12,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1278,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	106,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	512,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2572,9
14	Faggeta termofila e basso montana	1236,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	216,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	158,1
21	Ostrieto mesofilo	41,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	175,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	30,1
26	Querceto a roverella pioniero	68,0
27	Querceto a roverella tipico	181,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	173,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	57,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	225,9
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	60,9	86,3	170,5	174,3	159,6	314,7	236,4	76,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	2,4	3,1	12,0	34,6	26,8	22,8	4,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	44,6	71,7	62,4	53,9	48,2	121,4	73,8	36,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,9	421,9	560,0	366,0	143,9	100,8	226,8	372,1	380,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	153,6	191,0	222,9	111,9	66,6	123,9	203,5	162,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	18,0	25,4	26,7	12,6	15,6	59,6	40,0	18,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,9	7,5	16,9	16,8	21,9	60,5	24,8	6,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	9,0	6,6	12,2	6,8	0,1	0,1	2,2	5,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	18,4	11,4	29,7	35,2	16,2	18,7	34,5	11,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,9	2,8	2,2	1,8	2,7	6,7	7,2	4,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,6	0,2	2,2	9,0	19,6	26,1	8,6	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,9	0,2	1,9	20,8	78,6	58,5	18,9	1,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,3	0,1	0,6	20,0	17,1	51,1	67,3	14,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	3,8	5,6	4,0	4,2	2,7	13,8	16,4	6,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	4,2	4,6	7,2	7,4	53,2	103,6	24,9	20,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	10,9	54,6	128,8	198,5	271,0	280,6	200,2	103,7	22,1	8,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6	9,1	35,7	35,2	14,3	5,0	2,6	1,6	1,6	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	3,4	11,8	30,9	63,1	110,7	122,6	91,8	53,3	18,0	6,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	30,0	103,3	214,8	349,0	482,2	519,1	421,2	274,7	114,8	63,7
14	Faggeta termofila e basso montana	10,1	29,7	62,0	118,2	197,2	259,0	228,2	176,7	93,5	61,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,9	18,6	47,0	55,5	40,8	25,8	15,4	7,3	2,6	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,9	2,3	7,9	14,7	20,0	30,6	30,5	26,7	12,0	12,4
21	Ostrieto mesofilo	0,3	0,4	0,8	2,2	5,5	11,5	8,1	7,7	2,9	2,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,4	1,7	4,0	13,0	28,9	33,8	37,3	22,7	33,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,7	3,9	5,6	6,9	4,9	2,3	1,2	0,4	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	1,3	4,7	6,0	8,3	12,3	14,0	10,8	5,8	3,2	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,3	1,5	4,8	11,8	27,0	43,1	40,4	32,5	14,5	5,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,0	2,3	5,3	9,9	30,2	41,9	41,3	25,5	11,3	4,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,4	1,6	4,2	6,4	11,2	13,0	10,5	5,6	2,4	1,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	3,6	11,0	16,5	27,4	45,0	49,2	39,5	21,8	9,2	2,9
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	70,8	332,3	614,8	223,4	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	35,9	64,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	31,0	273,5	207,4	0,3	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	109,3	762,1	1374,2	326,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	105,0	553,3	495,9	79,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	88,4	99,0	11,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	50,8	39,4	47,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	10,9	9,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	50,7	44,8	66,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	9,5	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	39,0	22,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	91,2	78,6	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	110,1	41,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	34,7	17,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	28,0	97,3	75,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	17,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	49,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	1,2
11	Cerreta mesoxerofila	240,0
12	Faggeta altomontana rupestre	9,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	345,0
14	Faggeta termofila e basso montana	93,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	116,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	6,1
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	43,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	33,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	58,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	11,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	1,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,2	0,1	0,4	3,8	5,4	4,0	2,8	0,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	1,2	9,8	17,3	9,6	9,0	1,5	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,7	3,5	35,1	99,8	35,9	42,6	22,4	0,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,1	6,5	2,5	0,1	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	6,5	15,0	40,2	97,8	49,6	33,2	70,2	32,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,0	5,5	8,2	3,3	18,1	55,9	2,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	4,1	12,0	30,4	38,7	21,4	7,7	1,3	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,8	1,7	0,8	0,2
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	3,2	19,6	7,4	10,1	3,3	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,9	0,8	0,9	3,0	1,5	8,7	16,6	1,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	9,7	7,8	9,9	9,1	7,2	5,4	4,2	4,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,1	2,0	2,0	2,6	3,0	1,7	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,4	1,6	4,3	4,5	4,0	1,9	0,3	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,9	10,5	13,5	8,8	6,1	3,2	2,1	1,5	0,9	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	1,2	7,9	22,8	40,1	51,9	54,8	37,7	17,5	5,4	0,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,5	0,9	1,0	2,1	3,1	1,6	0,1	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	8,1	27,7	50,1	73,8	77,0	61,8	29,4	12,4	3,2	1,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	2,2	3,8	7,6	15,9	23,5	21,3	12,8	4,7	1,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,4	20,2	33,6	22,8	15,8	8,2	4,6	1,3	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0	0,8	2,7
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,2	0,3	1,5	4,6	8,2	10,3	9,0	5,2	4,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	0,6	1,6	3,2	7,0	5,8	6,9	3,8	4,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	42,2	6,6	3,2	2,3	1,4	0,9	0,5	0,4	0,2	0,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,2	0,8	2,4	2,2	2,7	1,9	1,0	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	24,3	4,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	109,3	79,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	74,2	238,3	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	47,5	39,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	36,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	25,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	10,8	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	2,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	29,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	165,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	106,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	603,0
14	Faggeta termofila e basso montana	289,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	36,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	978,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	21,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	83,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1049,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	39,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	17,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,2	1,3	4,6	9,4	6,4	2,5	2,9	1,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	6,8	21,6	29,6	25,1	36,1	29,5	11,9	4,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	3,5	10,4	24,1	25,3	23,1	8,2	8,1	4,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	127,7	298,0	71,6	14,7	22,3	4,9	28,7	34,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	60,9	79,6	59,6	24,9	14,8	20,4	8,6	21,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,0	6,2	8,0	8,4	7,2	3,8	0,0	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,4	95,6	172,7	126,2	83,3	133,6	131,1	137,9	97,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,2	2,4	1,8	3,2	3,7	2,2	3,1	2,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,2	6,4	13,6	20,0	28,6	12,5	0,5	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,3	56,1	114,8	233,2	157,6	191,9	186,4	79,8	28,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,2	1,9	5,4	17,3	11,8	2,6	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,6	0,5	0,2	1,9	9,1	4,9	0,2	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,9	3,5	7,7	9,2	5,3	2,3	0,5	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,2	20,2	46,7	45,0	28,6	13,0	5,6	1,0	0,2	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,1	3,4	8,3	15,5	27,4	24,8	17,8	6,6	1,7	0,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	5,4	13,1	27,1	69,4	144,8	164,7	119,1	48,0	10,1	1,3
14	Faggeta termofila e basso montana	1,8	5,6	13,7	29,3	56,1	75,5	60,8	36,5	9,4	1,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	3,9	11,1	11,3	6,7	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	10,7	32,0	88,2	167,4	232,3	214,7	150,8	64,4	14,3	3,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,2	4,5	4,1	2,7	1,8	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	2,8	5,1	8,4	13,8	20,5	16,6	11,4	4,0	0,9	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	19,4	50,1	123,0	180,8	236,8	214,1	144,2	62,4	14,4	4,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,6	1,6	4,7	10,2	11,3	7,0	3,5	0,4	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,9	2,8	3,3	4,4	3,3	2,0	0,7	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	4,5	42,7	107,6	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	35,3	19,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	126,2	386,1	79,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	161,2	54,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	10,1	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	542,3	315,1	43,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	12,4	44,5	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	69,7	353,2	489,9	136,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	25,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	120,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	37,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	59,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	34,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	7,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	9,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,3
26	Querceto a roverella pioniero	2,3
27	Querceto a roverella tipico	12,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	79,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	63,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	2,5	10,7	9,1	2,9	0,6	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	7,4	20,8	20,4	7,6	20,0	24,6	10,2	9,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	9,3	7,7	4,2	1,8	1,2	2,3	4,3	6,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	10,4	9,5	11,4	2,8	3,9	6,2	6,3	9,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,5	23,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,5	4,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	2,3	1,1	0,3	0,3	1,1	0,7	1,4	2,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	0,2	2,4	0,2	0,2	0,3	4,7	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	1,6	8,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	23,4	20,5	9,4	2,5	5,4	5,2	2,4	11,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	13,5	15,8	12,6	3,3	10,3	1,9	2,5	3,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,9	1,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,6	5,7	5,6	4,2	4,2	4,3	0,4	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	1,9	6,9	16,7	36,7	29,1	24,9	4,3	0,2	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	2,0	11,1	15,9	6,8	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,3	10,0	15,3	11,7	9,1	7,0	3,4	1,0	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,7	1,9	8,0	11,9	9,8	2,1	0,1	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	0,9	1,4	2,1	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,5	2,4	3,7	1,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,1	4,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,8	3,9	4,6	2,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,2	5,7	10,5	15,2	17,5	14,9	9,8	4,2	0,8	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,2	4,9	12,5	19,0	13,7	7,7	4,0	0,7	0,0	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,3	0,6	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	2,7	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	45,8	58,3	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	34,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	41,1	14,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	6,7	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	6,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	5,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	26,7	48,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	12,1	50,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	17,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	132,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	64,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1106,1
14	Faggeta termofila e basso montana	36,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	202,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,7
26	Querceto a roverella pioniero	12,9
27	Querceto a roverella tipico	50,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	506,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	86,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-ailanteto	1,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	3,9	9,6	2,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,6	20,3	29,5	41,2	29,4	6,5	1,0	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	25,6	23,6	5,9	2,4	1,8	0,6	0,5	3,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,3	341,9	507,2	85,6	22,1	20,2	20,0	39,2	69,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	6,8	20,4	2,9	0,3	1,9	0,4	2,3	1,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,2	1,1	0,5	1,2	1,7	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	37,9	74,4	59,7	10,2	6,1	2,9	2,0	9,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,3	1,9	2,6	1,5	0,3	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	3,3	0,4	3,4	4,6	0,8	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	1,3	4,6	5,2	24,8	14,5	0,4	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	30,5	52,5	68,0	55,7	133,5	134,8	23,0	8,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	6,2	5,4	16,4	15,7	29,4	8,2	1,0	3,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	0,2	0,2	0,3	1,1	5,1	4,3	4,7	0,8	0,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,0	14,5	29,8	34,4	27,2	16,3	4,4	1,2	0,3	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,3	2,3	3,4	6,4	8,5	11,2	10,0	8,2	5,4	8,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	14,9	56,9	152,2	207,4	205,9	190,6	135,2	90,1	32,6	20,3
14	Faggeta termofila e basso montana	1,3	2,4	3,2	5,3	7,0	7,6	4,5	3,5	1,3	0,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	0,6	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7	0,3	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,9	23,7	28,0	32,1	36,8	35,4	20,2	14,5	5,3	1,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	3,0	2,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,0	2,7	1,4	1,8	2,6	2,3	1,2	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,7	10,2	16,8	11,5	7,0	1,7	0,7	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	22,5	64,6	102,7	109,2	94,0	59,1	34,6	14,3	5,0	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	4,8	14,1	17,8	15,5	15,6	9,3	7,0	1,7	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,8	8,2	3,6	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	1,6	28,7	73,2	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,3	3,8	19,8	31,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	528,3	311,8	137,8	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	29,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,8	61,3	129,7	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	2,6	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	3,0	1,5	4,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	38,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	28,4	180,6	31,1	176,6	90,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	2,5	12,9	66,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	396,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	78,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	31,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	89,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	7,1
14	Faggeta termofila e basso montana	160,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	210,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	3,8
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	73,2
21	Ostrieto mesofilo	6,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	27,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	127,5
26	Querceto a roverella pioniero	113,0
27	Querceto a roverella tipico	9,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	48,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	89,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	618,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	73,5
32	Robinieta-ailanteto	24,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	57,6	43,1	6,2	11,2	49,6	112,1	71,7	44,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	0,2	1,3	2,4	14,7	37,3	16,8	5,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	1,0	1,6	0,2	0,1	4,3	13,0	7,7	3,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,7	0,1	0,4	3,2	30,7	27,7	19,4	7,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,1	2,5	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	13,9	4,2	0,2	0,3	11,8	42,5	45,5	41,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2	34,4	34,5	14,2	5,4	19,9	35,6	36,8	28,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,2	1,1	0,0	3,1	26,7	30,2	8,6	2,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,7	1,4	0,1	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	8,8	15,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	18,0	22,0	6,3	1,9	7,4	27,0	28,0	16,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	16,2	9,4	0,4	0,2	24,3	45,0	10,8	6,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,9	6,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	14,7	7,9	0,6	0,0	2,6	6,2	12,7	3,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,3	0,0	0,0	3,8	16,1	47,6	16,5	4,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	23,4	32,2	1,3	10,2	124,7	222,0	161,5	43,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	15,5	29,8	19,3	7,9
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,9	1,6	0,2	0,1	2,2	8,7	8,3	1,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	6,9	44,0	79,5	69,6	58,6	52,2	41,0	23,7	9,6	11,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,4	1,1	4,7	10,4	16,2	21,7	14,3	7,0	1,6	1,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,1	13,0	7,3	4,1	1,7	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,6	2,0	7,3	17,7	18,1	18,0	11,5	7,1	7,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,2	0,9	2,2	2,3	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	1,0	4,3	10,9	20,4	30,3	37,6	27,9	18,4	6,7	2,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	61,2	57,5	36,9	24,4	16,8	8,1	3,6	1,1	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1	1,0	0,5	0,1	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	1,3	2,4	7,9	12,4	16,5	11,4	12,1	9,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,6	1,6	2,0	1,6	0,6	0,1	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	1,1	1,7	2,8	5,5	6,2	4,7	3,4	1,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	55,4	33,7	16,9	10,5	6,0	3,1	1,4	0,5	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	13,1	17,2	19,0	26,5	20,6	13,2	2,7	0,2	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,7	0,9	1,2	1,9	1,7	1,5	0,9	0,7	0,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,0	4,9	7,7	8,7	9,1	7,8	5,9	2,1	0,6	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,1	11,8	17,5	22,3	18,1	13,7	3,3	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,2	8,1	25,7	62,5	121,3	151,3	122,8	83,3	29,7	12,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,6	0,8	0,8	2,1	8,9	22,4	15,0	17,2	4,3	1,5
32	Robinieta-ailanteto	7,2	6,3	5,2	3,7	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	139,6	227,3	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	40,4	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	7,3	20,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	41,7	37,5	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	11,5	66,5	58,3	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	101,4	106,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	1,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	6,9	16,2	19,5	12,4	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	0,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	3,9	18,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	78,1	47,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,1	53,4	28,1	3,4	26,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	8,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,7	36,8	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	4,4	59,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	52,2	166,0	178,1	119,5	89,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	17,0	11,3	35,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	22,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	48,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	87,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	16,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	395,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	263,1
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	146,2
11	Cerreta mesoxerofila	30,6
12	Faggeta altomontana rupestre	5,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	983,9
14	Faggeta termofila e basso montana	173,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1105,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	152,6
21	Ostrieto mesofilo	488,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	281,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	67,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	105,3
26	Querceto a roverella pioniero	26,0
27	Querceto a roverella tipico	50,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	132,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	155,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,4
32	Robinetto-aillanteto	9,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,1	2,7	6,3	13,8	10,8	8,9	4,2	0,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,9	2,8	7,9	9,8	25,7	28,4	9,2	1,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,3	1,7	1,5	4,9	7,0	1,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	86,0	167,6	51,3	20,6	18,2	21,2	10,4	20,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	46,6	65,4	62,2	23,0	6,8	6,7	15,3	37,1
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	26,9	26,0	16,0	10,7	8,9	11,9	18,4	27,4
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	3,9	3,5	1,3	1,5	2,4	4,3	8,3	5,4
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	1,5	0,7	0,4	0,9	1,6	0,6	0,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,6	146,3	364,6	164,5	60,2	61,8	68,7	56,3	59,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	23,9	99,5	26,6	3,4	2,2	6,7	6,2	5,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,7	187,9	352,1	155,7	89,4	86,8	89,1	67,9	76,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	5,8	10,8	17,4	14,3	31,2	46,8	19,0	7,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	103,2	179,8	86,6	18,9	10,9	16,5	25,1	47,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	81,7	80,9	37,3	10,3	9,4	11,3	17,0	33,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	17,6	15,0	10,6	4,2	2,6	1,3	4,3	11,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	15,6	18,9	13,3	9,6	10,8	14,3	13,0	9,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,9	0,2	0,1	1,4	8,9	7,6	2,2	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	10,7	29,0	8,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	4,1	1,8	6,8	13,6	23,6	48,8	27,1	6,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	30,1	41,3	28,3	17,6	14,8	13,7	6,0	4,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	1,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,9	1,8	1,1	0,2	1,4	2,3	0,4	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	3,3	10,2	12,5	12,8	6,5	2,7	0,4	0,1	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,8	7,8	25,8	28,6	16,3	6,5	0,8	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,7	2,6	5,0	5,3	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	22,2	69,6	108,5	93,3	61,0	25,3	12,2	3,0	0,3	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	3,8	13,0	33,0	60,3	66,1	51,0	24,1	8,7	2,5	0,7
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	32,8	25,2	28,9	24,7	19,2	10,4	3,6	1,2	0,2	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	1,7	7,0	9,1	7,2	4,2	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,6	0,9	1,0	1,0	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	46,1	117,1	201,3	228,5	184,0	113,8	56,0	22,2	9,6	5,3
14	Faggeta termofila e basso montana	2,6	6,1	12,1	19,3	26,7	29,6	28,3	22,6	15,2	11,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	45,4	162,2	253,7	242,7	197,2	120,0	58,9	18,8	5,3	1,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	6,9	22,9	31,7	32,4	24,7	14,1	7,9	3,3	2,5	6,2
21	Ostrieto mesofilo	11,1	36,2	59,6	73,6	86,7	71,0	59,4	41,9	26,8	21,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	11,0	36,0	55,2	60,4	49,6	35,4	19,0	10,9	3,0	1,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	4,0	6,5	12,5	15,4	14,1	9,2	3,8	1,4	0,3	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	28,2	31,2	21,3	13,1	6,5	2,9	1,3	0,5	0,2	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,6	1,3	3,2	4,5	6,1	4,0	3,7	2,0	0,4	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,5	3,9	8,1	10,8	13,3	8,6	4,3	0,6	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,1	16,9	38,2	35,3	25,1	9,4	3,4	1,1	0,4	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,1	9,2	15,2	24,5	33,8	31,7	21,5	10,3	4,0	3,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,5	0,8	0,7	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,8	1,9	3,5	1,9	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	5,6	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	54,4	223,5	110,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	46,4	173,6	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	113,4	11,8	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	15,9	14,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	768,8	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	123,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	185,6	512,4	329,4	75,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	61,4	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	276,3	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	1,8	77,4	171,0	27,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	22,1	37,8	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	54,4	45,8	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	5,8	14,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	37,6	93,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	4,6	77,3	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	6,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	287,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3,3
14	Faggeta termofila e basso montana	14,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1236,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	4,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,6
26	Querceto a roverella pioniero	19,6
27	Querceto a roverella tipico	10,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1749,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	12,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	22,4	41,6	14,2	14,4	52,9	109,0	23,7	8,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	1,6	1,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	10,5	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,0	5,8	1,1	1,7	3,3	3,0	0,3	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,3	240,3	587,4	107,4	67,9	149,6	25,2	22,5	34,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	1,3	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	6,6	13,4	2,7	1,5	3,7	4,8	1,6	1,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,2	3,6	1,7	1,1	2,3	4,7	4,2	0,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	7,3	0,7	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	194,3	404,0	106,4	104,8	255,3	399,0	170,9	114,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	2,3	7,2	2,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	16,0	41,4	62,9	59,1	47,0	30,7	19,2	8,3	1,9	0,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	0,2	0,5	0,8	0,6	0,6	0,2	0,3	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,2	0,8	1,5	5,0	2,6	3,5	0,5	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,3	6,4	6,5	3,1	1,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	20,3	86,2	162,1	155,0	194,0	242,5	218,1	123,3	30,1	4,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,3	0,8	0,1	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	13,7	10,3	6,2	2,7	1,3	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	9,3	4,4	1,6	0,6	0,6	0,9	1,0	1,0	0,1	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	3,4	4,9	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	76,7	253,9	352,8	353,1	300,5	221,4	122,9	49,7	14,4	3,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,8	0,3	0,5	2,9	3,7	2,7	0,9	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	34,5	27,3	101,0	122,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	14,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	80,2	296,0	577,7	278,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	2,5	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	7,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	234,9	583,0	356,4	484,9	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	2,6	1,3	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	31,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	41,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	15,6
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	31,2
11	Cerreta mesoxerofila	1,8
12	Faggeta altomontana rupestre	287,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1603,0
14	Faggeta termofila e basso montana	571,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	94,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	747,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	9,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	597,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	10,8
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	4,6	11,4	4,9	1,7	2,9	2,6	2,7	0,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,5	6,7	13,1	1,4	0,9	2,8	9,0	4,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	3,6	3,0	1,4	1,2	0,8	0,7	1,8	3,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,4	6,9	5,8	4,9	4,9	2,3	0,3	1,0	4,8
11	Cerreta mesoxerofila	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	41,6	75,8	53,2	17,7	12,3	22,6	31,9	32,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2,8	205,3	400,3	257,5	59,6	60,1	125,8	307,7	183,9
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	87,8	248,7	142,1	31,0	6,2	15,0	18,0	22,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	14,0	45,4	20,5	5,6	1,2	0,1	2,4	5,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	90,3	218,9	151,1	30,1	14,8	59,9	137,0	44,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,4	10,6	8,2	1,2	0,1	0,6	3,3	7,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	3,7	3,8	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	57,8	166,5	146,6	26,0	10,6	30,9	100,8	57,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,3	4,3	6,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,7	4,0	6,9	6,8	6,7	3,4	1,5	0,4	0,1	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,3	5,3	8,3	8,5	7,7	5,2	3,3	0,9	0,2	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,6	1,8	2,9	3,6	3,0	2,0	1,1	0,5	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	15,6	11,6	3,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	1,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	4,8	19,2	38,6	60,0	66,9	53,5	28,9	11,3	3,0	1,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	37,4	77,3	153,7	278,2	366,9	343,4	204,4	109,4	26,8	5,4
14	Faggeta termofila e basso montana	1,4	3,6	12,0	35,5	92,0	139,4	136,1	96,7	38,3	16,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,1	10,0	19,6	17,7	13,6	12,1	9,2	6,6	2,8	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	9,1	24,4	54,0	93,6	125,5	150,2	131,2	95,0	45,9	18,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,2	5,1	8,4	8,5	6,3	3,1	1,6	0,6	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	1,0	2,3	2,4	2,1	0,8	0,7	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	21,2	65,0	104,9	124,4	110,7	85,5	45,5	26,4	10,4	3,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,6	1,6	3,1	3,3	1,4	0,5	0,2	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	6,4	6,1	2,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	6,7	16,6	5,6	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	11,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	26,6	93,8	95,2	68,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	504,7	608,1	421,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	205,4	281,4	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	21,0	18,4	54,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	14,4	243,7	298,2	133,8	54,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	16,3	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	162,5	393,6	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	7,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	17,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	435,5
14	Faggeta termofila e basso montana	217,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	32,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	34,5
21	Ostrieto mesofilo	160,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	138,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	7,5
26	Querceto a roverella pioniero	63,0
27	Querceto a roverella tipico	120,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	299,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	64,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,0	2,8	0,2	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,4	1,8	0,2	0,5	1,8	0,0	0,0	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	2,9	2,6	4,0	0,7	0,0	1,6	3,1	2,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	130,8	153,8	60,0	44,6	10,4	0,2	6,5	29,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	63,6	52,5	24,1	6,0	3,0	11,1	22,6	34,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	21,0	3,7	0,2	0,2	0,1	0,1	1,4	6,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	12,7	9,3	2,0	1,3	1,9	0,0	0,1	7,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	11,7	31,1	40,7	43,8	24,6	0,5	5,1	3,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	34,6	27,0	23,4	9,1	0,8	1,2	14,1	28,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,0	0,8	0,7	0,6	1,6	1,1	1,6	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,2	0,7	0,3	0,5	11,9	32,2	8,2	5,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	9,3	10,0	2,2	0,5	9,1	55,7	17,8	16,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	82,1	76,2	60,2	21,1	5,8	0,7	7,8	44,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	6,9	7,0	5,8	7,0	4,6	5,6	20,8	6,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,6	0,0	0,0	0,3	2,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	0,6	1,3	0,8	1,4	0,6	0,7	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	2,5	4,6	4,0	2,7	1,6	1,4	0,8	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,2	9,5	41,9	113,9	130,7	96,0	36,5	5,6	0,2	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	3,7	9,5	22,7	41,5	56,2	47,0	29,2	6,7	0,9	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,8	6,3	2,9	1,4	1,7	2,1	2,9	3,1	2,7	5,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	0,5	0,5	1,3	3,1	5,7	7,0	7,0	4,4	4,8
21	Ostrieto mesofilo	1,1	4,0	6,0	12,2	35,8	44,7	36,8	17,7	2,1	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,6	3,8	8,6	19,9	34,9	32,3	25,6	10,7	1,6	0,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,3	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,7	2,8	10,2	19,2	17,7	7,9	2,0	0,7	1,8
27	Querceto a roverella tipico	3,3	8,5	12,3	19,9	30,2	26,4	16,6	3,2	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,4	25,0	42,0	52,4	61,9	52,9	39,2	15,6	2,7	0,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	11,4	14,0	9,6	10,8	8,3	7,1	2,9	0,4	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,8	1,0	0,7	0,6	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	1,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	4,0	3,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	208,9	134,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,4	77,5	129,7	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	31,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	10,8	22,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	28,0	30,2	36,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	42,5	89,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	14,7	44,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	26,1	67,2	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	90,9	178,8	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	7,8	31,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	228,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	16,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	26,8	139,0	54,0	3,5	1,4	0,8	0,8	2,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	2,0	11,7	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	0,7	0,7	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,4	8,4	16,4	29,2	40,7	52,4	43,8	28,0	5,8	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,8	3,7	5,6	3,2	1,9	0,6	0,2	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	9,7	93,5	104,4	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	5,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	109,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	30,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	83,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	73,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	429,3
14	Faggeta termofila e basso montana	241,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	24,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	66,5
21	Ostrieto mesofilo	185,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	113,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	170,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	46,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	15,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	20,5
32	Robinetto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,4	1,9	5,5	9,2	21,6	62,7	8,2	0,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,0	1,1	2,5	1,8	1,4	9,3	11,5	1,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,8	0,1	1,0	2,3	7,9	51,4	16,4	3,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	1,7	0,9	0,4	0,4	9,3	52,5	6,9	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	75,2	112,9	69,7	28,8	26,7	78,7	17,5	19,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	3,4	17,2	4,1	1,3	11,3	157,1	40,4	6,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,4	0,3	0,1	0,4	3,0	15,2	4,3	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,9	3,2	3,0	8,1	13,7	28,1	8,6	0,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	5,8	3,1	0,7	18,1	138,8	17,5	1,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,9	2,9	8,1	7,6	7,6	12,8	66,3	6,3	1,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,6	4,1	11,0	19,8	17,4	99,4	12,5	2,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	4,2	1,0	0,0	0,0	1,9	23,0	11,3	4,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	12,3	2,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2,1	15,5	2,9	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,9	6,8	21,7	37,8	29,9	9,7	2,0	0,1	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,6	2,4	6,0	8,2	7,4	4,3	1,0	0,4	0,2	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,6	10,7	20,5	24,1	17,1	7,1	1,3	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,8	2,3	4,4	4,0	2,5	5,0	11,1	14,3	13,5	14,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	5,5	20,5	52,6	87,9	90,5	75,3	54,5	30,6	9,8	1,9
14	Faggeta termofila e basso montana	3,2	7,4	13,0	16,9	29,7	48,3	56,6	42,1	20,5	3,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	3,8	7,6	7,7	3,4	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	2,0	4,5	10,1	17,3	16,3	11,0	3,2	1,9	0,2	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,8	2,1	4,4	11,5	30,1	46,3	44,2	29,1	12,7	4,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,9	6,4	14,5	21,5	26,5	23,3	11,8	4,5	1,3	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	0,1	0,3	0,5	0,8	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,7	13,0	32,0	47,6	43,1	23,4	6,7	1,1	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,3	4,6	9,7	10,7	8,0	6,4	3,5	1,7	0,2	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,4	2,3	3,6	3,8	2,6	2,0	0,5	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	1,2	1,1	2,1	6,5	6,1	3,0	0,3	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	66,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	9,1	2,6	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	71,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	5,5	39,1	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	237,7	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	72,9	97,3	65,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	42,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	74,2	91,5	13,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	94,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	2,2	88,3	80,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	25,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	10,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	57,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	311,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	42,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	93,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	644,9
14	Faggeta termofila e basso montana	450,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	95,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	2,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	286,7
21	Ostrieto mesofilo	57,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	68,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,0
26	Querceto a roverella pioniero	68,6
27	Querceto a roverella tipico	17,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	203,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	46,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	32,6
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,6	3,5	21,2	18,3	6,8	6,0	0,8	0,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	46,6	67,3	76,8	16,9	17,2	21,6	32,4	32,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,2	1,4	1,2	1,2	10,6	7,2	10,5	6,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	13,0	33,0	22,5	13,5	4,2	0,4	1,2	6,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	198,6	180,2	88,9	17,2	0,2	0,1	41,6	118,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	85,1	123,9	119,7	40,0	13,6	9,9	10,2	48,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	11,1	43,7	15,6	3,0	2,1	6,8	8,8	4,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	10,2	39,5	112,1	70,0	9,4	23,7	16,4	5,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	9,8	12,4	12,5	2,7	6,1	2,3	3,7	8,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,5	14,9	24,9	11,4	0,9	2,2	6,0	4,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,8	3,6	1,9	0,3	0,9	3,2	2,6	1,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	0,5	0,9	20,2	31,7	12,4	2,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	6,4	6,2	3,9	1,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	5,6	0,9	0,4	1,4	11,3	56,4	90,0	37,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	9,1	14,1	5,5	1,6	2,2	5,3	3,5	4,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	9,0	18,4	4,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,2
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	0,3	1,0	2,0	7,3	13,1	14,7	9,8	5,8	3,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	2,7	12,4	38,8	68,5	71,4	52,3	32,5	17,1	6,8	8,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,8	6,4	13,0	11,8	6,2	1,8	0,6	0,3	0,2	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,3	4,1	11,2	18,7	21,7	17,5	9,3	4,8	2,6	2,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	3,8	19,2	63,4	125,1	152,4	130,4	89,4	40,5	20,3
14	Faggeta termofila e basso montana	2,2	9,5	20,9	42,9	72,6	98,2	84,7	65,0	34,4	19,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,4	11,0	18,9	21,8	19,5	11,4	6,1	2,9	1,1	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	1,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	3,0	6,2	9,7	12,7	21,0	51,8	56,8	61,2	35,1	29,2
21	Ostrieto mesofilo	0,5	1,1	2,3	4,1	6,2	10,9	10,5	10,2	6,4	5,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,5	0,8	1,7	5,1	14,1	18,0	16,0	8,0	2,8	1,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,2	3,0	2,6	1,7	1,4	1,3	1,3	1,1	0,5	0,9
26	Querceto a roverella pioniero	2,5	5,6	9,2	8,9	10,9	12,4	10,9	4,5	1,8	1,9
27	Querceto a roverella tipico	0,8	4,4	5,9	4,3	1,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,8	10,9	18,4	25,5	32,9	41,2	34,6	24,2	9,1	4,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,4	7,3	6,6	6,2	5,9	7,3	5,8	3,3	1,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	1,2	3,2	8,4	9,5	6,8	2,9	0,2	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,9	35,1	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	18,2	65,9	75,0	94,1	58,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,5	25,6	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	9,1	38,5	14,1	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	86,4	210,5	274,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,2	14,5	96,6	191,5	137,4	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	5,3	33,4	54,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	14,7	104,3	65,9	66,5	29,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	2,8	25,7	21,2	7,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	2,5	10,2	29,4	18,9	7,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	5,1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	12,7	22,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	3,1	49,6	80,9	66,8	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	23,0	0,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	7,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	38,1
11	Cerreta mesoxerofila	107,5
12	Faggeta altomontana rupestre	148,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	599,8
14	Faggeta termofila e basso montana	70,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,4
21	Ostrieto mesofilo	3,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4
26	Querceto a roverella pioniero	2,3
27	Querceto a roverella tipico	8,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	43,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,6
32	Robinetto-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,6	1,2	0,9	8,5	14,3	12,7	3,4	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	1,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	40,1	36,7	4,5	19,8	44,2	43,5	30,0	16,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	71,5	94,0	28,9	4,5	35,1	286,0	148,6	31,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	161,6	129,2	76,6	32,4	39,1	90,3	137,0	113,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	505,3	732,2	427,6	90,1	155,8	642,1	442,1	344,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	72,4	161,3	32,1	22,4	23,4	43,7	27,5	12,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,4	0,9	0,1	0,1	0,6	0,7	0,8	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	3,7	2,2	0,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	3,2	8,6	3,2	0,0	0,0	0,4	1,3	0,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,4	13,1	2,9	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,6	8,5	3,3	1,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,7	33,8	6,3	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	7,6	13,7	2,5	1,1	20,6	118,7	78,3	12,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,9	0,9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,4	0,7	1,5	7,1	13,9	9,8	7,2	1,1	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,7	0,6	0,4	0,7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	14,5	25,7	42,1	28,5	29,3	39,0	30,8	22,4	2,9	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	70,3	109,5	96,9	107,4	128,5	103,3	62,2	19,1	3,3	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	3,7	13,3	33,1	75,3	151,1	189,2	159,6	106,8	35,3	12,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	22,7	89,6	205,1	410,6	739,5	819,6	628,6	321,5	84,7	17,6
14	Faggeta termofila e basso montana	19,5	38,7	56,7	66,9	75,6	65,1	49,9	19,6	3,0	0,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	1,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,3	0,9	2,3	1,7	0,8	0,5	0,2	0,2	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,1	0,1	0,3	0,8	3,3	5,1	4,1	2,8	0,4	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,9	4,2	5,2	5,0	3,3	1,6	0,3	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,5	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,0	4,5	5,6	3,9	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,2	1,6	2,6	10,9	17,3	11,6	2,9	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,5	21,1	32,3	55,2	69,8	49,4	19,7	1,6	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	0,4	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	0,6	0,2	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,1	36,9	47,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	347,0	217,6	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	282,7	412,7	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,6	1132,5	1131,5	868,4	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,1	142,0	16,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	9,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	3,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	42,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	171,5	29,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	3,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	12,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	1,5
11	Cerreta mesoxerofila	88,0
12	Faggeta altomontana rupestre	37,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	658,2
14	Faggeta termofila e basso montana	201,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	96,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	15,8
21	Ostrieto mesofilo	1,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	49,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	172,4
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	67,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,9
32	Robinieto-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,1	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,5	6,3	4,6	0,5	0,3	0,8	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,1	0,0	0,8	1,2	5,7	39,2	38,8	2,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	0,5	1,2	9,0	12,6	11,2	2,1	0,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	3,5	38,3	210,3	50,3	21,1	129,4	180,4	24,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	24,5	26,4	5,7	2,8	7,7	59,4	70,5	4,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,0	1,5	22,0	21,4	12,0	30,1	8,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	11,6	3,3	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	7,4	25,1	14,9	1,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	6,3	14,0	43,9	42,9	35,3	22,8	7,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	6,9	10,6	12,1	6,9	9,2	10,4	8,1	2,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2	0,6	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,9	1,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	1,5	4,4	4,7	1,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	1,8	4,8	6,0	7,1	15,8	21,6	18,3	10,3	2,3	0,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	1,1	1,7	2,1	2,0	3,2	5,8	7,3	6,9	7,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,7	9,4	40,0	82,5	119,9	142,8	124,9	79,0	48,0	10,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,7	2,8	4,5	9,0	27,2	45,4	47,8	37,0	19,7	7,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,3	10,7	30,1	26,7	16,4	7,9	2,4	0,4	0,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,1	0,3	2,2	5,2	4,8	2,6	0,3	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,8	2,1	6,3	12,7	12,8	9,7	3,2	1,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,7	4,4	14,5	27,7	37,0	36,9	30,4	16,3	4,6
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,5	10,7	10,9	7,8	4,7	3,4	2,9	1,6	0,5	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	35,2	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	10,4	13,6	8,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	25,4	172,8	354,4	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	54,5	40,3	94,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	61,8	31,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	4,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	7,4	31,5	9,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	88,7	68,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	21,7	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	142,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	5,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	14,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	110,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	138,3
18	Lecceta rupicola	3,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	5,4
21	Ostrieto mesofilo	60,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	14,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,0
26	Querceto a roverella pioniero	74,6
27	Querceto a roverella tipico	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	97,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	75,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	19,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,4
32	Robinetto-ailanteto	11,8
33	Variante Abete bianco	0,0

Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	3,6	49,7	21,9	40,5	23,2	3,5	0,1	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,4	2,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,1	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,6	9,9	2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,1	13,6	18,3	35,0	20,4	6,4	2,5	7,5	6,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	1,4	36,5	73,6	24,1	2,3	0,4	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,3	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	3,2	1,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	2,5	49,9	6,0	1,1	0,3	0,1	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,9	10,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	2,1	0,5	1,5	0,6	0,7	0,1	0,4	2,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,7	14,7	33,7	12,9	8,6	0,7	0,1	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,5	35,1	24,1	31,1	1,9	0,1	0,8	0,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	23,7	17,0	19,2	6,1	2,8	0,8	1,0	4,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,7	11,5	6,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,9	3,1	4,8	1,6	0,1	0,1	1,1	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,0	4,2	17,0	40,0	41,1	26,6	9,5	2,8	0,4	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	1,6	2,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,3	0,9	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,4	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	0,4	1,6	3,4	3,8	3,2	1,6	0,3	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	16,9	15,0	18,9	21,4	18,1	11,8	6,3	2,1	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,1	0,2	0,5	3,7	25,5	43,1	40,7	21,6	2,7	0,2
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	1,0	0,4	0,5	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,8	1,4	0,9	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,4	1,2	2,4	6,0	13,3	18,7	12,8	4,6	0,6	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	5,0	4,8	1,8	0,1	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,7	1,7	4,4	11,6	20,3	17,8	13,5	3,9	0,5	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	1,6	5,5	13,8	22,3	26,0	19,3	7,6	0,8	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,8	4,2	6,2	9,4	18,8	16,4	13,0	4,2	0,9	0,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,3	2,1	5,7	6,3	4,6	0,5	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,9	1,7	3,3	2,9	1,5	0,9	0,5	0,1	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	2,2	47,9	71,4	20,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	89,7	16,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	5,7	81,1	50,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	2,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	1,4	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,7	19,9	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	9,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,2	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	6,0	32,6	13,8	13,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	6,9	20,2	10,3	30,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,6	53,8	18,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,8	11,2	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

