



Parchi e Riserve Naturali Regionali




Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	88,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1770,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	275,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	4,2
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	762,7
11	Cerreta mesoxerofila	170,9
12	Faggeta altomontana rupestre	3010,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	15447,1
14	Faggeta termofila e basso montana	1978,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	741,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	18,1
19	Mugheta appenninica	111,2
20	Orno-ostrieto pioniero	414,5
21	Ostrieto mesofilo	83,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	478,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	365,4
24	Pioppeto di pioppo tremulo	3,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	475,7
26	Querceto a roverella pioniero	77,0
27	Querceto a roverella tipico	11,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	288,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	296,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	513,5
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	7,7	30,2	41,0	1,8	0,4	2,0	1,9	3,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,6	57,7	115,6	199,5	226,1	260,9	511,1	326,9	72,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	17,5	25,8	36,9	21,1	31,4	76,0	53,5	13,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,1	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1	90,3	89,5	96,7	118,7	126,8	98,3	94,7	47,8
11	Cerreta mesoxerofila	0,1	6,0	10,4	4,2	6,1	73,5	39,9	17,7	12,9
12	Faggeta altomontana rupestre	1,7	409,2	451,8	346,8	296,6	261,4	563,2	413,5	266,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	11,7	2524,6	2960,5	2272,5	1270,9	1240,1	1640,7	1884,9	1641,1
14	Faggeta termofila e basso montana	1,2	286,3	388,2	414,2	134,0	76,4	186,2	333,7	158,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	117,9	167,8	107,5	30,6	60,6	109,5	89,9	57,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	6,5	5,7	2,3	0,2
19	Mugheta appenninica	0,0	14,8	15,2	15,0	8,7	13,4	16,1	11,5	16,5
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	7,6	24,2	39,6	48,0	119,1	95,8	65,3	14,7
21	Ostrieto mesofilo	0,1	8,2	4,8	5,8	2,1	12,8	21,3	10,4	18,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	50,1	67,5	41,7	58,1	45,7	58,7	112,5	44,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	38,5	45,9	86,6	48,3	35,6	32,4	38,8	39,4
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,3	88,6	77,3	48,2	24,2	41,1	54,5	70,0	68,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,4	6,9	13,7	4,3	1,2	21,8	24,5	3,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,2	2,7	1,2	0,1	3,9	3,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	4,7	36,0	94,0	21,1	6,6	19,4	94,3	12,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	25,9	50,4	44,1	18,0	18,6	38,7	80,8	19,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	14,7	22,6	42,7	45,2	99,7	154,8	106,5	27,2
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,1	3,8	9,2	12,7	10,2	14,3	10,8	8,0	0,9	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	36,4	122,7	220,4	295,2	378,4	329,2	227,2	80,7	27,3	26,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	10,0	50,9	94,1	71,9	34,2	11,4	2,8	0,3	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,1	0,1	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	4,2	28,2	75,5	78,0	65,1	54,9	37,3	24,4	4,0	0,3
11	Cerreta mesoxerofila	2,4	14,7	48,4	43,0	22,4	12,4	6,7	3,0	1,1	0,5
12	Faggeta altomontana rupestre	16,4	44,8	133,1	332,6	627,4	693,0	529,4	297,1	112,0	51,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	414,7	1073,8	1813,9	2432,5	2836,3	2530,3	1797,9	956,8	381,9	157,8
14	Faggeta termofila e basso montana	39,0	101,8	210,4	297,1	347,7	295,4	221,7	122,2	48,2	23,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	19,9	95,8	199,1	158,5	78,9	31,8	12,6	3,7	1,4	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,6	0,6	0,6	0,7	1,2	1,4	2,1	2,1	8,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,1	0,2	0,5	1,1	3,5	3,8	4,1	2,7	6,2
20	Orno-ostrieto pioniero	4,7	20,5	33,7	37,2	41,6	66,9	60,7	59,8	36,5	34,9
21	Ostrieto mesofilo	0,5	1,0	3,9	9,2	13,6	16,6	16,7	11,5	5,9	2,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	5,7	14,1	16,3	22,7	47,6	61,6	77,5	59,9	42,3	63,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,1	0,6	3,0	9,9	25,8	41,0	46,3	41,6	27,3	20,2
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	0,4	1,0	1,0	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	104,4	94,7	87,8	73,0	41,7	16,0	7,1	3,3	1,2	2,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,8	6,0	16,5	19,3	15,2	10,4	5,2	2,6	0,7	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	2,3	2,8	2,2	1,5	1,4	0,4	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	4,9	21,1	40,8	62,4	64,2	53,0	30,5	9,6	1,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	5,0	9,7	16,7	29,7	62,8	63,3	55,8	26,7	6,5	3,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	7,7	21,8	54,6	84,6	106,8	103,3	72,4	34,1	7,7	1,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	61,1	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7	146,2	223,3	335,0	754,0	217,6	1,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	63,3	162,3	36,2	5,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	493,3	205,2	57,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	95,2	72,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	53,3	561,2	1712,1	682,2	0,3	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,1	3275,6	6080,4	4827,5	989,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	386,2	1048,1	1494,5	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	452,2	185,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	10,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	14,7	30,6	53,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	119,4	179,4	89,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	36,0	10,3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	220,1	155,5	63,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	121,2	98,1	57,0	68,3	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	266,2	92,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	42,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	179,7	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	140,5	111,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	290,8	139,7	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1410,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	5989,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1129,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	542,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	18,9
7	Boschi di forra	5,5
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	814,6
9	Castagneto da frutto	141,3
10	Cerreta mesofila	1422,0
11	Cerreta mesoxerofila	3731,3
12	Faggeta altomontana rupestre	2228,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	21590,7
14	Faggeta termofila e basso montana	5989,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2127,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	664,1
18	Lecceta rupicola	363,8
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1429,5
21	Ostrieto mesofilo	3246,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	3495,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	73,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	1374,2
26	Querceto a roverella pioniero	1573,2
27	Querceto a roverella tipico	290,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4611,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	37,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1626,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	3752,1
32	Robinieta-aillanteto	23,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	148,8	0,1	163,9	95,5	192,0	183,6	210,0	150,7	266,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	720,8	1,1	503,9	663,7	380,4	589,1	1259,9	789,3	1080,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	150,7	0,3	79,5	134,9	73,7	147,8	179,0	190,2	173,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	84,5	0,2	21,2	52,2	16,8	53,7	100,3	76,5	136,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,3	0,0	3,2	1,0	4,4	7,1	0,3	0,2	2,5
7	Boschi di forra	0,4	0,0	1,3	0,8	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	43,9	0,0	159,1	114,1	260,3	170,5	12,1	7,8	46,7
9	Castagneto da frutto	13,7	0,0	50,0	22,4	35,6	13,9	0,9	1,6	3,3
10	Cerreta mesofila	90,5	0,0	430,3	246,4	272,6	143,6	67,0	61,4	110,2
11	Cerreta mesoxerofila	592,9	0,0	334,7	424,1	325,5	430,1	611,0	465,4	547,5
12	Faggeta altomontana rupestre	301,3	0,6	165,7	174,5	190,6	303,3	315,9	308,1	468,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3374,8	3,9	4238,6	4505,8	3179,8	2115,2	1011,9	1886,0	1274,7
14	Faggeta termofila e basso montana	753,8	1,2	989,3	969,3	766,3	679,3	499,1	590,0	740,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	274,9	0,1	286,3	259,2	236,9	235,2	311,4	181,0	342,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	29,5	0,0	10,3	11,0	79,9	249,5	69,7	47,3	167,1
18	Lecceta rupicola	38,8	0,0	2,7	13,4	4,8	36,5	90,7	78,6	98,4
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	278,4	0,1	59,9	189,0	45,8	100,8	281,1	281,4	192,9
21	Ostrieto mesofilo	663,1	0,2	587,0	797,6	411,8	228,3	115,9	221,3	221,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	684,3	1,0	285,3	520,1	219,3	490,9	390,0	442,7	461,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	4,7	0,0	16,9	14,0	12,6	11,8	1,9	2,0	9,8
25	Pioppo-saliceto ripariale	141,9	1,0	227,3	189,7	221,1	216,7	117,1	118,5	141,0
26	Querceto a roverella pioniero	198,0	0,4	71,8	80,3	71,7	162,6	319,8	258,2	410,5
27	Querceto a roverella tipico	9,7	0,0	17,1	4,9	32,3	107,4	35,4	23,4	59,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	594,7	0,5	547,5	555,9	493,9	749,7	508,9	512,2	647,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,2	0,0	1,9	0,2	7,5	10,2	4,8	3,2	9,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	142,0	0,1	157,6	152,0	170,4	234,5	299,0	173,3	297,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	381,9	0,5	395,3	415,4	373,0	535,4	540,6	331,5	778,5
32	Robinieta-aillanteto	1,9	0,0	2,6	6,3	0,8	0,4	5,2	2,4	4,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	10,8	51,4	112,3	173,3	164,8	98,9	36,8	9,6	2,2	1,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	182,0	401,3	698,8	812,3	816,7	718,8	520,6	315,6	121,7	46,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	41,4	154,4	238,0	223,5	167,8	97,1	38,5	12,0	3,0	2,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	15,6	50,9	111,6	135,6	109,6	63,1	29,8	14,6	4,4	3,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	1,1	2,4	4,4	4,7	3,7	1,9	0,5	0,0
7	Boschi di forra	0,1	0,1	0,4	0,4	0,9	1,2	1,2	0,8	0,1	0,3
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,1	1,7	3,7	3,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	2,0	11,0	13,6	10,6	5,5	4,0	2,5	1,0	0,6
10	Cerreta mesofila	5,4	24,2	90,6	139,8	159,5	135,8	107,2	68,9	33,1	12,4
11	Cerreta mesoxerofila	8,0	58,9	206,6	338,5	382,5	379,8	317,3	232,8	142,2	129,4
12	Faggeta altomontana rupestre	18,3	42,4	68,8	97,3	122,4	145,5	151,6	131,7	95,8	149,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	181,7	700,1	1597,1	2446,8	2819,3	2664,5	2116,7	1457,4	816,6	639,4
14	Faggeta termofila e basso montana	33,7	194,9	486,1	662,5	696,8	682,8	579,9	444,5	257,5	188,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	53,1	238,1	392,6	409,6	301,9	173,8	87,7	37,3	16,1	7,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	5,5	14,3	41,7	90,3	141,3	151,2	119,0	62,3	26,0	10,3
18	Lecceta rupicola	0,3	0,8	2,4	4,4	15,4	30,0	34,7	30,4	16,8	24,2
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	12,3	40,6	108,4	185,3	196,9	156,8	103,8	75,1	43,1	51,0
21	Ostrieto mesofilo	19,0	82,2	212,2	330,9	379,3	372,2	303,4	222,1	126,5	101,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	25,4	87,0	234,9	385,9	454,6	435,8	346,7	237,8	137,3	112,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,3	4,8	9,6	11,5	13,0	9,0	5,8	2,5	0,9	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	124,6	137,5	157,9	172,0	154,5	120,7	85,3	49,9	24,5	16,3
26	Querceto a roverella pioniero	30,6	104,7	204,3	266,6	229,6	146,9	70,1	29,6	13,1	14,2
27	Querceto a roverella tipico	0,2	3,7	10,4	19,6	30,7	33,6	29,2	18,7	10,0	4,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	30,4	124,1	307,4	490,5	545,4	475,5	333,7	199,9	88,9	50,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,6	2,6	5,5	6,9	7,1	4,8	2,5	0,9	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,0	48,8	144,4	241,6	279,2	243,2	163,4	98,0	40,5	17,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	35,7	219,4	496,6	648,9	674,9	542,1	352,7	163,3	48,3	13,2
32	Robinietao-ailanteto	2,2	3,1	3,5	4,3	3,5	1,8	0,5	0,1	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	61,1	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7	146,2	223,3	335,0	754,0	217,6	1,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	63,3	162,3	36,2	5,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	493,3	205,2	57,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	95,2	72,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	53,3	561,2	1712,1	682,2	0,3	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,1	3275,6	6080,4	4827,5	989,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	386,2	1048,1	1494,5	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	452,2	185,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	10,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	14,7	30,6	53,3	6,5	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	119,4	179,4	89,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	36,0	10,3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	220,1	155,5	63,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	121,2	98,1	57,0	68,3	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	266,2	92,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	42,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	179,7	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	140,5	111,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	290,8	139,7	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Parco Nazionale della Majella




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1000,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3635,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	607,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1009,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	9,3
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	1331,7
11	Cerreta mesoxerofila	168,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1910,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	15697,9
14	Faggeta termofila e basso montana	5486,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	760,4
16	Lecceta costiera termofila	0,1
17	Lecceta mesoxerofila	159,1
18	Lecceta rupicola	250,6
19	Mugheta appenninica	1305,6
20	Orno-ostrieto pioniero	871,6
21	Ostrieto mesofilo	1321,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	1494,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	7,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	422,3
26	Querceto a roverella pioniero	472,6
27	Querceto a roverella tipico	11,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2870,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	85,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3040,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1729,5
32	Robinieta-aillanteto	21,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,5	40,9	81,3	89,6	99,9	161,9	293,9	188,7	44,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,7	89,2	223,5	473,2	641,6	523,1	852,5	629,7	190,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	96,4	79,2	41,4	25,2	42,2	107,2	126,2	90,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	181,7	173,1	92,4	101,6	98,6	98,7	114,4	119,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,0	2,6	3,1	0,1	0,0	0,0	1,0	1,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,4	169,4	119,6	207,2	220,7	143,6	96,8	169,2	174,5
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	23,7	32,0	29,1	14,7	11,1	11,0	30,2	13,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	108,6	156,5	280,8	253,6	262,1	378,0	336,0	132,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	4,2	2502,5	3025,4	2328,8	993,0	738,9	1674,0	2285,7	1982,4
14	Faggeta termofila e basso montana	5,4	838,7	842,9	654,9	445,6	339,7	546,0	829,6	842,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	63,2	99,6	134,8	123,9	86,7	75,1	85,0	74,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,0	0,2	17,0	63,7	53,7	20,3	4,1
18	Lecceta rupicola	0,0	28,2	8,8	5,0	26,2	42,6	70,3	46,5	22,9
19	Mugheta appenninica	0,0	173,2	193,3	196,9	169,8	132,0	108,6	191,0	140,8
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	72,2	74,6	171,4	168,5	139,2	134,8	74,5	36,4
21	Ostrieto mesofilo	0,1	237,4	302,6	249,3	136,9	49,1	112,3	91,3	141,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3	294,7	319,2	287,3	118,0	76,8	104,3	133,7	160,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	2,2	1,7	1,5	0,3	0,1	0,0	0,4	0,8
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	79,8	78,6	47,9	29,2	24,9	37,7	52,9	66,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	33,4	49,0	25,4	17,2	57,6	170,1	91,6	28,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	0,5	2,7	4,7	1,6	1,1	0,7	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	463,1	521,2	314,5	185,7	174,6	300,3	485,9	424,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,7	0,6	1,1	1,6	5,3	54,4	19,1	2,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,4	238,4	189,6	202,3	245,6	421,1	846,9	599,3	296,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,7	253,3	243,8	176,3	138,0	132,0	396,6	210,9	177,3
32	Robinieta-aillanteto	0,0	2,3	1,1	1,7	2,8	6,9	2,3	1,0	2,9
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	46,0	110,9	158,7	129,7	129,5	128,7	118,8	74,5	37,9	32,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	115,8	339,5	627,2	696,7	598,9	507,8	364,5	240,9	92,8	51,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	23,6	151,0	153,5	102,0	65,1	40,2	26,7	15,9	10,4	18,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	29,5	187,2	318,2	208,6	111,1	62,9	39,7	25,2	14,6	12,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,8	1,6	3,2	2,3	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	38,6	330,0	429,0	267,4	135,6	64,0	33,8	18,0	8,5	6,8
11	Cerreta mesoxerofila	3,3	44,9	62,7	34,7	14,1	4,5	2,1	1,1	0,5	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	9,6	38,8	66,6	87,3	131,4	221,5	277,4	271,0	209,0	292,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	196,8	1150,7	1980,9	2156,9	2329,6	2399,2	2035,1	1433,0	793,7	587,5
14	Faggeta termofila e basso montana	193,5	784,5	1213,8	1030,9	720,4	529,5	383,0	260,9	153,2	131,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	18,9	170,9	278,4	167,3	68,1	26,5	12,8	4,8	1,6	1,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,4	4,7	16,4	29,3	35,2	32,9	22,2	13,5	4,4
18	Lecceta rupicola	0,8	2,8	3,5	2,9	5,7	16,2	36,9	46,6	48,4	85,3
19	Mugheta appenninica	2,4	7,5	12,4	26,6	94,9	208,8	233,6	203,3	111,3	68,8
20	Orno-ostrieto pioniero	4,0	25,1	44,4	62,7	82,8	120,5	135,0	119,9	88,4	103,9
21	Ostrieto mesofilo	11,7	42,9	88,3	125,2	162,7	206,9	196,7	173,6	123,7	173,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	12,9	58,1	140,7	201,0	211,5	220,9	203,3	164,2	107,2	141,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,6	1,5	1,8	1,3	0,8	0,5	0,3	0,3	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	31,5	76,7	100,3	73,9	48,6	31,5	22,2	15,4	9,4	11,5
26	Querceto a roverella pioniero	9,2	54,4	77,8	82,3	82,8	73,5	46,6	27,2	11,3	6,6
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,4	0,9	2,4	2,6	2,1	1,3	0,9	0,4	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	128,5	525,4	760,2	566,5	349,0	207,8	128,8	79,3	41,0	34,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,8	8,9	15,7	13,9	15,5	14,0	9,5	3,9	1,1	0,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	39,0	163,6	346,6	464,3	557,4	554,8	409,6	267,5	130,0	103,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	62,3	187,4	264,3	285,9	295,9	262,3	180,6	108,0	50,8	31,9
32	Robinietao-ailanteto	0,6	2,1	3,7	4,3	4,3	2,8	1,5	0,9	0,6	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	115,9	327,5	296,6	244,4	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	482,0	401,6	362,2	745,8	981,4	527,4	75,7	33,9	8,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	27,6	189,2	296,0	25,3	6,3	59,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,5	46,6	128,2	241,6	195,7	135,2	156,8	102,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	20,8	190,3	712,0	349,7	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,3	2,9	0,0	10,9	98,5	46,6	2,7	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	11,1	59,5	233,3	551,0	641,4	327,8	84,4	1,9	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	30,5	342,2	1419,3	4638,6	5773,2	3130,5	359,3	4,5	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	1,2	69,2	466,1	1549,1	2074,4	1247,9	76,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,7	58,0	118,8	114,2	147,4	240,1	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	3,9	41,2	78,8	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	12,4	33,4	63,8	62,5	48,6	28,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	153,2	549,1	506,5	86,9	2,3	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,5	42,2	200,3	256,9	227,7	114,1	17,5	9,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	21,0	278,2	535,4	367,0	117,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,0	267,5	648,6	370,8	134,4	60,8	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,8	4,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,1	10,2	51,4	84,6	85,8	104,0	73,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,6	30,0	115,3	170,1	97,8	58,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	12,8	359,1	888,4	1175,7	422,7	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	4,4	66,1	13,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	24,0	177,0	245,5	894,4	940,3	528,7	207,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	115,3	628,6	521,6	235,4	174,9	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	2,6	0,3	8,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Parco Naturale Regionale Sirente-Velino




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	28,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3098,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1672,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	54,1
11	Cerreta mesoxerofila	44,7
12	Faggeta altomontana rupestre	1605,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6075,7
14	Faggeta termofila e basso montana	467,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	350,0
16	Lecceta costiera termofila	13,1
17	Lecceta mesoxerofila	58,3
18	Lecceta rupicola	6,7
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	26,6
21	Ostrieto mesofilo	5,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	2511,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	73,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	179,6
26	Querceto a roverella pioniero	553,1
27	Querceto a roverella tipico	125,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	8902,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1848,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	421,6
32	Robinieta-aillanteto	23,8
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	0,6	0,4	3,3	8,6	9,9	4,5	0,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,9	215,4	291,9	361,2	425,1	727,2	692,4	259,5	124,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,1	105,5	142,9	102,3	165,3	385,3	543,5	164,3	62,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	10,0	15,4	10,2	4,0	1,9	2,5	3,3	6,9
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	13,1	8,4	1,4	3,2	6,0	0,2	0,6	11,8
12	Faggeta altomontana rupestre	0,7	187,5	293,5	266,1	140,2	134,5	279,6	172,0	131,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	7,1	1408,3	1838,3	809,5	403,0	431,1	456,6	297,0	424,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	51,4	97,4	61,8	27,9	56,8	112,3	40,2	19,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	30,8	43,6	20,0	18,6	53,0	101,8	57,8	24,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	2,5	3,7	0,2	2,1	3,4	1,2	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	6,6	20,0	10,4	0,0	2,3	17,8	0,6	0,5
18	Lecceta rupicola	0,0	1,5	1,2	0,2	0,0	0,5	1,8	0,8	0,7
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,9	2,0	2,1	0,6	1,3	5,8	6,1	4,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	3,0	1,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,8	496,6	1078,4	317,9	131,4	260,2	106,1	39,1	80,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	12,6	19,3	15,1	18,0	4,8	1,2	0,8	1,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,0	28,5	33,7	14,3	12,3	23,0	33,3	18,1	15,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	50,8	55,9	28,6	46,4	136,8	135,5	69,6	29,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,7	12,9	30,2	15,5	36,7	25,7	2,1	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	8,7	958,9	1772,9	700,8	555,4	1242,8	2028,9	1043,1	591,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	1,4	167,2	247,1	116,9	108,9	295,2	478,6	301,8	131,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	25,0	41,2	115,0	65,2	49,0	76,7	39,7	9,8
32	Robinieta-aillanteto	0,0	2,7	5,2	2,5	0,9	1,3	4,1	5,4	1,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,4	0,9	3,6	10,4	7,8	4,2	0,9	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	182,7	325,3	413,8	459,8	483,2	471,4	360,5	230,3	102,9	68,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	57,4	233,7	369,9	341,6	264,2	194,6	119,9	62,5	18,9	9,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	10,9	18,0	12,3	6,3	3,7	2,1	0,6	0,3	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,8	4,9	6,6	8,8	7,9	7,0	4,8	2,8	1,0	0,1
12	Faggeta altomontana rupestre	65,9	207,8	243,4	208,5	190,8	192,1	179,5	127,8	73,9	115,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	182,2	414,1	763,9	1039,4	1139,7	1019,1	731,3	438,9	194,0	152,3
14	Faggeta termofila e basso montana	8,7	21,5	41,8	54,9	68,2	86,8	77,6	58,6	28,8	20,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	16,3	68,3	95,1	78,3	47,1	24,7	12,0	5,2	1,8	1,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	2,0	2,7	3,0	1,8	2,3
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,3	0,8	3,6	10,9	15,9	15,2	7,1	4,4
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	1,2	1,4	0,9	2,2
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,1	1,1	4,9	5,1	3,4	1,9	2,0	1,8	6,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,9	1,2	1,2	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	54,6	191,9	315,2	340,4	407,5	478,7	399,6	246,1	66,5	11,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,4	6,6	12,0	14,2	13,4	12,3	7,6	4,6	0,9	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	63,5	41,8	28,6	17,9	10,5	6,4	4,2	2,5	1,3	2,8
26	Querceto a roverella pioniero	21,8	51,6	88,6	106,0	101,7	81,6	46,7	26,7	11,4	16,9
27	Querceto a roverella tipico	2,1	9,4	24,5	30,5	21,2	16,2	10,0	7,3	3,0	1,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	472,5	1188,3	1596,7	1594,4	1438,0	1145,3	776,5	409,5	160,2	118,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	68,5	188,9	282,5	318,6	328,2	292,1	204,6	113,4	38,7	11,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	22,0	28,8	52,6	71,2	80,7	67,4	52,2	26,0	13,5	7,2
32	Robinieta-ailanteto	3,5	6,2	4,6	3,7	3,2	1,5	0,7	0,3	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	365,5	559,7	630,6	1100,2	433,7	7,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	153,6	219,0	524,5	462,4	176,9	117,6	12,4	3,4	2,5	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,6	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	5,1	16,0	7,7	15,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	25,5	512,3	446,7	445,1	174,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	1670,1	2350,8	1604,9	275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	139,7	134,3	155,2	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	88,4	84,9	33,9	92,8	36,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	8,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	23,8	13,0	5,5	10,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	1,3	1,6	0,0	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	3,9	0,5	0,5	14,9	6,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	20,2	115,6	492,8	1187,0	664,9	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	16,5	47,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	110,4	7,9	20,8	6,0	32,0	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	19,5	21,7	206,1	193,3	64,0	46,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	24,1	61,9	26,9	8,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	888,0	2630,7	1863,0	2193,8	1188,2	128,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	51,1	105,0	570,2	809,9	214,8	90,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	49,8	208,1	151,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	12,3	2,2	8,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	178,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	6,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,5	25,5	27,6	23,8	6,0	12,3	19,7	38,7	24,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,4	2,4	2,4	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,5	0,5	0,9	1,6	3,8	1,8	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	15,8	35,8	29,8	22,3	19,3	18,0	14,1	10,7	6,3	6,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,4	0,5	0,5	1,0	0,7	1,0	0,8	0,5	0,3	1,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,1	6,5	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	6,9
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	8,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,4	0,7	0,8	2,1	1,6	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	1,9	0,4	0,8	1,8	0,1	0,2	0,4	1,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	0,1	0,2	1,1	0,5	2,0	2,4	0,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,0	0,9	0,7	0,2	0,4	0,7	0,9	2,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,2	4,3	1,7	2,4	3,4	2,2	1,0	4,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,9	1,4	2,1	0,6	0,6	1,9	0,7	0,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	0,2	0,8	1,4	1,6	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,9	1,4	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	0,4	0,8	0,8	1,2	1,3	1,1	0,8	0,4	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	0,5	1,2	1,7	2,3	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,5	4,2	4,8	4,6	3,4	1,5	0,5	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	19,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	12,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,4	6,3	5,4	1,7	0,3	0,6	2,5	1,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	3,1	6,5	1,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	16,3	2,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	11,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	93,4
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	22,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,3
26	Querceto a roverella pioniero	2,4
27	Querceto a roverella tipico	11,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	8,8	3,2	3,5	3,8	8,3	18,0	29,5	18,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,3	1,8	2,0	1,9	1,9	2,3	8,1	2,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	1,9	3,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	1,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,4	0,6	0,7	0,4	0,6	1,4	3,8	2,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,6	0,1	0,0	0,2	0,4	0,1	0,6	0,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,8	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,4	3,3	3,9	7,2	16,7	21,0	22,0	11,8	5,0	1,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	0,9	1,8	3,5	5,8	5,3	3,5	1,3	0,4	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	0,7	1,0	1,1	1,4	1,4	1,5	0,6	0,3	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,2	0,5	0,7	1,4	2,2	2,5	2,0	1,2	0,8	0,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,1	0,3	0,8	1,1	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,2	0,5	0,7	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	30,7	62,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,5	11,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	6,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	10,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	17,5
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	94,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	19,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	104,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,3	3,1	1,6	0,9	0,1	0,0	1,6	1,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	4,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	4,8	7,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	18,7	27,1	8,7	2,2	1,8	10,5	15,4	10,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,1	1,5	4,5	1,4	0,0	0,0	1,5	4,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,0	3,6	1,0	0,2	0,3	0,5	0,2	1,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	34,6	21,4	10,6	3,0	1,2	1,3	8,8	23,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7	1,6	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	0,1	0,9	0,1	0,0	0,0	0,5	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,8	2,5	3,2	1,9	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,1	2,5	5,0	4,5	2,5	0,8	0,3	0,2	0,6
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	3,0	8,8	15,2	12,2	11,2	10,8	9,1	8,1	5,9	10,6
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2	4,2	7,1	4,6	1,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,6	2,5	2,0	1,7	1,2	1,0	0,5	0,4	0,5	1,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,1	9,3	17,6	18,1	16,5	12,6	8,3	6,4	4,3	9,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,3	0,9	1,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	4,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	17,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	27,0	66,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	3,1	15,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	11,6	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	71,5	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,6	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	0,5	0,9	0,8	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	41,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	4,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	17,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	19,8
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	167,2
21	Ostrieto mesofilo	37,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	18,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	5,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,8	11,3	7,6	3,3	0,6	8,2	8,9	0,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	2,2	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	7,4	6,0	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	1,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	2,4	1,2	1,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,3	4,9	5,7	2,7	2,7	2,4	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	28,9	50,3	21,5	5,0	5,1	18,6	24,9	13,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	8,0	14,0	11,4	1,4	0,0	0,2	1,1	1,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,2	2,6	1,8	0,9	1,7	2,0	4,3	2,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	0,0	0,8	0,7	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	1,5	2,5	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	2,4	6,2	8,2	9,0	14,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	3,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	0,2	0,4	1,1	2,8	3,6	3,3	2,8	2,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	1,8	1,0	0,7	0,5	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	1,7	1,8	14,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	0,7	2,2	5,4	12,7	21,4	27,0	26,8	70,7
21	Ostrieto mesofilo	0,2	0,8	1,7	1,6	2,0	3,2	4,6	6,1	5,5	12,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,1	4,2	3,8	2,9	1,8	0,9	0,6	0,5	0,4	1,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,7	0,6	0,4	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	1,1	1,0	1,1	0,7	0,1
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	4,3	19,8	15,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	16,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	2,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	2,1	7,8	6,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	5,0	76,1	50,8	20,6	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	14,4	14,9	8,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	10,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	1,8	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,5	3,5	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	28,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	75,6
16	Lecceta costiera termofila	3,8
17	Lecceta mesoxerofila	306,4
18	Lecceta rupicola	74,8
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	5,7
21	Ostrieto mesofilo	4,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	121,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	83,1
26	Querceto a roverella pioniero	36,0
27	Querceto a roverella tipico	2,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	45,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	194,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	2,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,1	0,1	0,2	8,1	15,1	2,9	0,8	0,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	10,2	14,3	6,5	12,0	23,9	3,1	3,1	2,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	0,1	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	11,4	118,9	43,5	4,5	5,1	99,6	22,9	0,4
18	Lecceta rupicola	0,0	3,2	9,8	16,2	4,3	13,6	24,4	2,4	0,8
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,4	2,9	0,6	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	1,1	2,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	13,3	94,2	13,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	19,3	19,4	5,1	3,3	5,9	8,0	7,3	14,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,8	9,2	8,2	2,0	3,1	5,8	3,8	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,6	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	7,1	18,0	5,0	0,5	1,3	3,1	3,9	6,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,1	6,3	6,0	55,0	59,7	50,7	12,4	0,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	1,6	0,2	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,4	1,3	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,3	2,0	7,0	8,4	8,5	2,4	0,1	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,1	4,4	7,9	14,3	17,3	16,0	9,3	3,1	1,2	1,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,1	0,9	0,3	0,3
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	0,7	4,3	25,0	60,3	86,3	74,6	38,7	16,3
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	1,0	5,3	11,1	13,7	13,7	9,9	20,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,1	0,2	0,3	0,9	1,5	1,4	0,6	0,3	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,5	0,6	0,4	0,5	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,5	3,2	11,0	30,0	36,1	27,7	10,1	2,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,0	10,6	7,2	6,3	7,3	6,9	6,3	4,8	3,6	6,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,4	2,0	3,4	5,1	10,1	6,6	6,4	1,9	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,7	0,6	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	3,0	3,2	4,4	6,8	7,7	7,7	6,5	3,6	1,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,5	1,3	6,4	23,4	34,6	37,6	33,0	25,7	16,8	14,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,2	0,8	0,6	0,4	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,2	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,0	21,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	48,8	25,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	3,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,3	64,8	113,1	104,2	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	3,9	30,7	16,0	15,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	2,5	1,5	0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,7	23,4	42,0	45,5	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	74,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,0	10,9	14,5	0,3	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	16,5	7,2	0,9	15,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	17,2	124,2	44,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,1	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	23,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	47,0
16	Lecceta costiera termofila	15,5
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	113,1
26	Querceto a roverella pioniero	9,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	22,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	7,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	19,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,5	1,3	1,5	9,9	8,5	0,6	0,1	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	7,7	9,2	4,7	15,4	6,4	0,3	0,5	2,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	4,2	0,3	0,2	0,9	1,0	0,1	1,4	7,5
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	21,9	14,5	18,1	18,4	12,4	2,6	4,9	20,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,8	5,0	2,1	0,8	0,2	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	25,5	20,5	4,8	4,0	8,0	5,4	9,7	25,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	9,1	0,6	0,1	0,1	0,0	0,0	1,2	11,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,1	4,5	0,7	0,2	0,5	0,1	0,0	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	5,2	2,2	1,0	0,8	1,0	0,3	2,6	6,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,7	1,9	2,2	2,3	3,3	3,9	3,4	2,2	1,2	1,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,4	4,4	8,4	8,5	7,8	6,4	5,2	2,5	1,0	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,4	1,2	1,4	1,4	1,9	2,3	2,6	2,2	1,3	1,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,5	14,8	15,2	17,2	16,3	14,4	11,3	7,5	4,3	2,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	0,3	0,5	1,3	1,9	2,7	1,6	0,6	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	2,7	8,8	13,8	14,7	15,0	13,9	12,2	9,9	6,2	5,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	1,5	2,7	2,9	4,1	3,9	3,1	2,0	1,4	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,9	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,3	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,6	1,8	3,2	3,5	3,4	2,6	2,0	1,2	0,6	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	1,9
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	36,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,4
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	28,4
21	Ostrieto mesofilo	0,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	6,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	4,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,3	14,9	3,4	1,6	1,8	2,5	5,1	3,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,4	5,2	2,6	8,4	5,7	3,1	2,5	0,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,2	2,8	0,6	0,1	0,0	0,0	0,5	1,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,2	0,1	0,3	0,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,3	0,2	0,2	1,2	2,0	0,7	0,3	1,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	0,6	1,9	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,3	4,4	8,5	9,3	5,9	3,9	2,0	0,8	0,3	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,9	4,2	4,8	5,0	4,2	3,8	3,1	1,6	0,5	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,2	0,5	0,8	1,1	1,5	1,3	0,8	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,0	1,5	0,8	0,4	0,6	0,7	0,5	0,4	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,1	0,3	0,5	1,1	1,1	0,7	0,6	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	37,9
26	Querceto a roverella pioniero	2,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	12,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,0	8,7	8,7	2,4	2,6	4,3	1,4	0,8	4,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,9	0,7	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	5,1	2,9	1,0	0,6	1,0	0,4	0,2	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	22,1	4,9	2,8	2,2	1,8	1,6	1,3	0,7	0,4	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	1,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,3	1,6	0,9	1,1	0,9	0,8	0,9	0,7	0,2	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	82,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,2	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	10,6	9,7	13,0	13,7	10,7	8,0	8,3	8,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,7	0,5	1,2	0,9	0,5	0,6	1,4	1,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	59,5	14,2	5,0	2,0	1,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Riserva Naturale **Lecceta di Torino di Sangro**




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	95,7
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	51,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,1	21,8	54,7	7,1	1,6	1,1	1,0	3,2	5,3
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,5	1,4	0,4	0,1	0,0	1,4	15,5	28,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,7	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	13,2	32,0	23,9	12,2	6,9	3,6	2,2	0,9	0,5	0,3
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,0	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	7,4	15,7	11,7	6,8	4,3	2,4	1,1	1,0	0,8	0,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,4	1,2	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,0	1,6	4,0	1,4	0,9	0,2	0,8	0,5	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,1	0,5	0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Riserva Naturale Monte Genzana e Alto Gizio




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	23,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	342,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	24,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1078,4
14	Faggeta termofila e basso montana	618,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	30,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	4,9
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	48,9
21	Ostrieto mesofilo	145,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	81,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	17,6
26	Querceto a roverella pioniero	42,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	47,3
29	Rimboscimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboscimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	105,3
31	Rimboscimento di conifere nella fascia montana	76,7
32	Robinieta-aillanteto	1,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,7	3,0	11,3	4,0	2,8	0,5	0,2	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,6	50,4	68,8	83,8	66,5	38,0	13,7	8,1	12,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	4,0	3,1	5,5	7,9	3,8	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	324,3	228,8	178,2	140,5	21,0	4,9	28,1	152,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	176,0	93,4	107,7	61,0	42,8	8,7	26,4	102,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	5,2	9,7	4,1	3,0	1,1	0,6	2,8	4,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,5	1,5	1,5	0,6	0,0	0,1	0,7
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,4	9,4	16,4	20,1	2,3	0,0	0,0	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	8,8	22,4	33,1	50,9	18,2	0,2	1,3	10,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	12,7	9,2	10,0	17,4	2,3	0,3	9,1	20,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,0	3,8	1,6	0,5	0,3	1,4	5,0	3,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,8	7,6	11,2	20,1	2,6	0,0	0,1	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	4,4	23,3	13,6	1,1	0,0	0,0	0,6	4,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,6	44,5	43,6	10,5	0,8	0,4	0,1	0,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	6,3	4,2	6,0	28,6	23,6	1,9	2,4	3,7
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	0,8	1,0	0,8	1,8	4,8	5,0	4,5	2,8	1,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	20,9	56,6	74,5	66,4	50,7	34,8	21,2	10,3	4,4	2,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,3	0,9	2,8	5,2	6,3	4,7	3,5	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,8	29,0	64,9	108,2	190,5	245,1	221,3	141,8	54,8	15,9
14	Faggeta termofila e basso montana	2,5	11,0	27,4	43,2	78,0	138,2	136,9	112,7	55,4	13,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,5	9,2	6,7	5,4	3,4	1,9	0,7	0,4	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	1,2	1,0	1,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,5	1,0	3,6	5,8	9,5	9,8	9,2	5,7	3,9
21	Ostrieto mesofilo	0,5	3,0	2,9	4,8	13,4	29,8	34,9	33,0	16,9	6,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,3	0,8	1,8	5,4	14,4	19,3	18,4	12,2	9,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,2	4,2	2,7	2,3	1,8	1,7	1,1	0,4	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	0,6	2,1	5,2	9,5	10,6	9,0	3,5	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	0,7	1,8	3,7	7,9	12,1	10,7	7,8	2,1	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	0,7	1,1	3,8	14,1	31,2	26,9	22,8	3,9	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,3	1,0	3,1	7,6	15,4	20,2	17,3	9,9	1,6	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,2	9,6	8,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	10,3	109,0	82,6	37,1	79,1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	4,3	6,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	8,2	322,5	411,5	306,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	73,6	319,8	185,2	24,2	11,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,6	8,0	13,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,2	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	20,3	25,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	4,2	54,2	73,6	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,5	28,5	35,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,6	29,6	11,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,8	33,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,9	19,5	67,3	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	34,0	42,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	7,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	86,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	25,2
18	Lecceta rupicola	0,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	20,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	68,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	45,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	90,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	2,0	1,5	0,5	1,8	1,7	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,6	12,4	34,9	12,5	1,8	19,2	3,3	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,6	12,8	4,2	0,4	0,1	0,2	0,5	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,1	7,4	17,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,8	6,7	9,7	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	5,7	55,1	5,4	0,0	0,0	0,8	1,2	0,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,4	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,1	19,3	22,6	0,3	0,2	0,0	0,2	0,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	7,1	16,8	25,3	9,4	5,1	11,2	12,8	2,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	1,2	1,9	1,1	0,6	0,5	0,8	0,7	0,4	0,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	1,4	11,3	17,8	19,5	17,4	13,6	4,5	0,4	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	1,5	3,5	3,6	3,9	3,3	2,0	1,4	0,7	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,2	0,7	2,5	6,9	5,6	7,2	2,0	0,1
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,5	4,4	3,0	1,7	2,7	3,2	2,9	1,3	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,2	1,1	2,5	3,8	9,5	16,3	17,8	12,5	4,4	0,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,6	0,5	0,9	2,4	8,9	11,8	10,4	7,5	1,9	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,7	9,5	23,2	20,7	16,6	9,6	8,0	1,9	0,3	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	2,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	1,7	74,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	9,7	9,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	8,5	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	6,6	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	13,1	55,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	3,2	41,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	6,8	82,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	35,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	5,9	8,7	2,8	2,1	2,3	3,4	5,1	5,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	34,9	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	5,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	7,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,4	3,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,6	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,8	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,3	1,6	0,9	0,8	0,5	0,3	0,3	1,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	1,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1	0,4	0,2	1,3	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,4	0,4	0,6	0,3	0,1	0,2	0,3	1,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,4	0,6	0,7	1,0	0,9	0,9	0,7	0,2	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1	0,6	0,4	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	2,1	1,9	1,4	1,1	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	0,5	0,8	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	0,9	0,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	1,1	2,1	1,5	0,9	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,3	0,7	0,6	0,7	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	11,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,5	10,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	2,0	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,7	0,4	0,4	0,2	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,4	1,6	2,1	2,0	2,0	1,3	0,9	0,6	0,2	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,1	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,9
16	Lecceta costiera termofila	0,9
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,7	3,0	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,6	4,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,1	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,3	1,6	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6	0,3	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,2	2,3	2,1	0,9	0,6	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,2	0,5	0,5	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,4	0,5	1,5	0,4	0,4	0,9	0,3	0,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,6	0,8	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,9	0,8	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	0,3	0,4	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	32,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	1,2
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,8
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	66,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	660,4
14	Faggeta termofila e basso montana	61,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	13,4
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	22,1
21	Ostrieto mesofilo	79,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,6	9,2	12,3	7,2	1,3	0,1	0,5	0,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	11,5	17,7	19,0	7,9	1,8	0,1	1,6	6,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,7	130,4	140,3	179,0	80,7	13,5	6,1	36,3	73,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	17,4	30,7	7,1	1,0	0,0	0,0	0,9	3,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,0	1,5	3,9	3,4	1,9	1,3	0,0	0,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,0	3,0	7,1	9,4	1,4	0,0	0,0	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,0	13,8	27,8	9,8	13,9	9,7	2,8	0,2	1,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,5	1,2	3,9	5,6	7,7	6,4	5,2	1,4	0,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,9
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,3	1,3	5,2	9,7	13,3	14,1	10,6	7,0	3,0	1,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	12,6	49,9	73,4	85,8	107,3	115,2	93,0	63,5	32,7	27,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,5	1,0	1,6	2,5	3,8	6,7	10,6	11,0	9,5	13,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,2	9,1
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,1	0,0	0,2	1,1	1,9	2,9	2,5	2,9	10,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,6	2,2	4,1	6,2	10,2	13,2	14,1	11,9	16,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	5,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8	249,4	204,9	113,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	2,9	19,8	36,7	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	2,1	8,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	1,2	8,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	3,9	46,1	21,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,5	0,6	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	1,0	0,3	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,2	0,9	0,7	0,7	1,9	0,3	0,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,3	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,9	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,5	0,9	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,6	1,8	1,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,3	0,5	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Modelli di combustibile

Caratteristiche della vegetazione-combustibile

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	572,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	986,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	274,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	301,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2294,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	20608,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	2350,4

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2637,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	7044,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	612,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2301,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	8940,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	30978,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	17186,3

Parco Nazionale della Majella

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1994,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2473,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	161,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	1129,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	7500,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	23068,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	9352,7

Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	281,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	4796,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	309,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5408,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	8347,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	8981,0

Riserva Naturale Abetina di Rosello

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	4,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	3,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	6,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	174,8

Riserva Naturale Borsacchio

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	5,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	7,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	9,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	24,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	13,1

Riserva Naturale Bosco di Don Venanzio

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	19,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	12,1

Riserva Naturale **Calanchi di Atri**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	9,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	50,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	6,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	10,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	66,9

Riserva Naturale **Cascate del Verde**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	10,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	18,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	13,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	219,6

Riserva Naturale **Castel Cerreto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	0,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	4,9

Riserva Naturale **Gole del Sagittario**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	32,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	146,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	11,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	41,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	45,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	46,4

Riserva Naturale **Gole di San Venanzio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	43,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	185,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	3,8
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	71,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	62,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	387,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	232,8

Riserva Naturale **Grotta delle Farfalle**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	6,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	106,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	35,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	15,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	132,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	62,1

Riserva Naturale **Grotte di Pietrasecca**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	33,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	32,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	17,5

Riserva Naturale **Lago di Penne**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	37,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	12,5

Riserva Naturale **Lago di Serranella**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	82,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	7,3

Riserva Naturale **Lecceta di Torino di Sangro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	52,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	96,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	3,0

Riserva Naturale **Marina di Vasto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	9,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	0,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	2,2

Riserva Naturale **Monte Genzana e Alto Gizio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	27,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	170,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	18,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	367,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1726,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	376,0

Riserva Naturale **Monte Salviano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	11,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	94,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	5,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	118,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	26,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	112,2

Riserva Naturale **Pineta Dannunziana**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	4,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	0,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	31,6

Riserva Naturale **Punta Aderci**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	8,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	6,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	5,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	16,2

Riserva Naturale **Punta dell'Acquabella**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	11,0

Riserva Naturale **Ripari di Giobbe**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	7,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	6,9

Riserva Naturale **Sorgenti del Pescara**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	4,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	2,7

Riserva Naturale **Zompo lo Schioppo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	23,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	1,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	32,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	799,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	80,3

Parco Territoriale **Sorgenti del Vera**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	4,9

Finito di stampare
nel dicembre 2009