

## Modelli di combustibile

### Caratteristiche della vegetazione-combustibile

Provincia di **Pescara**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 1478,0     |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 3675,5     |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 40,0       |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 1921,5     |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 3276,7     |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 11985,1    |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 12479,0    |

Comune di **Abbateggio**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 98,7       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 27,9       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 125,1      |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 59,4       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 165,5      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 320,4      |

Comune di **Alanno**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 1,7        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 8,6        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 1,5        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 8,9        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 146,9      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 40,2       |

Comune di **Bolognano**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 34,1       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 32,0       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 6,7        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 86,0       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 48,6       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 60,1       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 269,6      |

Comune di **Brittoli**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 18,4       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 218,0      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 86,4       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 71,4       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 107,4      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 308,8      |

Comune di **Bussi sul Tirino**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 106,0      |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 447,9      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 1,7        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 82,9       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 257,0      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 94,1       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 784,0      |

Comune di **Cappelle sul Tavo**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 0,0        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 0,0        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 1,8        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 17,4       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 4,0        |

Comune di **Caramanico Terme**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 219,8      |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 112,8      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 210,6      |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 479,9      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 1850,3     |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 1250,6     |

Comune di **Carpineto sulla Nora**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 18,5       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 227,5      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 1,4        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 44,2       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 24,7       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 737,3      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 219,2      |

Comune di **Castiglione a Casauria**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 54,9       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 60,9       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 1,8        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 83,9       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 101,2      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 116,6      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 226,9      |

Comune di **Catignano**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 7,5        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 8,1        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 13,4       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 2,3        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 163,0      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 16,9       |

Comune di **Cepagatti**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 7,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 17,2       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 1,5        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 10,4       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 165,9      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 17,7       |

Comune di **Città Sant'Angelo**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 21,0       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 4,8        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 4,1        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 7,0        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 70,9       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 548,9      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 57,5       |

Comune di **Civitaquana**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,6        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 13,1       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 9,4        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 32,6       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 163,0      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 143,4      |

Comune di **Civitella Casanova**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 42,4       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 103,2      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 1,2        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 79,4       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 32,0       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 391,3      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 411,7      |

Comune di **Collecorvino**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 14,8       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 1,6        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 12,7       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 213,6      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 32,7       |

Comune di **Corvara**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 10,8       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 49,7       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 7,6        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 18,0       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 19,1       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 129,2      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 203,1      |

Comune di **Cugnoli**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 0,5        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 28,9       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 108,5      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 54,5       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 14,6       |

Comune di **Elice**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 31,9       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 3,9        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 51,9       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 157,7      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 50,4       |

Comune di **Farindola**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 70,7       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 359,3      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 4,3        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 91,6       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 120,5      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 1088,7     |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 945,9      |

Comune di **Lettomanoppello**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 30,9       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 13,2       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 62,4       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 35,5       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 96,4       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 580,4      |

Comune di **Loreto Aprutino**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 1,6        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 42,0       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 28,2       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 24,7       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 396,8      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 73,3       |

Comune di **Manoppello**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 39,9       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 77,8       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,7        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 68,2       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 47,9       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 230,8      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 340,2      |

Comune di **Montebello di Bertona**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 29,1       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 82,8       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 2,5        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 50,6       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 27,3       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 177,8      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 541,2      |

Comune di **Montesilvano**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,8        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 10,9       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 2,3        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 11,2       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 76,8       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 41,9       |

Comune di **Moscufo**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 3,4        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 1,8        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 2,5        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 98,2       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 16,6       |

Comune di **Nocciano**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 0,0        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 0,0        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 2,9        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 22,4       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 6,2        |

Comune di **Penne**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 2,5        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 95,1       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 27,9       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 87,4       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 670,8      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 651,9      |

Comune di **Pescara**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 7,9        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 39,6       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 13,9       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 24,7       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 54,1       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 87,3       |

Comune di **Pescosansonesco**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 91,0       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 218,9      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 1,4        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 69,9       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 62,2       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 64,0       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 455,2      |

Comune di **Pianella**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,8        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 1,4        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 1,7        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 2,5        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 67,8       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 10,3       |



Comune di **Picciano**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 13,5       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 0,0        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 18,7       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 103,5      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 39,3       |

Comune di **Pietranico**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 26,2       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 30,6       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 108,5      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 83,2       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 186,9      |

Comune di **Popoli**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 26,5       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 331,4      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,3        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 100,6      |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 448,0      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 119,7      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 791,7      |

Comune di **Roccamorice**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 116,6      |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 22,6       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 19,4       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 23,4       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 468,4      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 415,9      |

Comune di **Rosciano**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,0        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 26,7       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 5,0        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 20,1       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 186,4      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 106,9      |

Comune di **Salle**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 75,9       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 63,5       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 4,3        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 160,6      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 599,9      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 343,7      |

Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 54,6       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 27,9       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 67,1       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 28,7       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 32,1       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 312,0      |

Comune di **Sant'Eufemia a Maiella**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 40,2       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 10,4       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 0,0        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 344,0      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 1081,2     |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 257,7      |

Comune di **Scafa**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 23,4       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 6,9        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 10,0       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 10,0       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 95,9       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 87,3       |

Comune di **Serramonacesca**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 129,8      |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 271,8      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 6,5        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 59,6       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 106,3      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 87,6       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 669,0      |

Comune di **Spoltore**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 0,2        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 1,4        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 1,8        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 14,0       |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 116,9      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 29,3       |

Comune di **Tocco da Casauria**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 63,9       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 381,3      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 211,5      |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 131,6      |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 370,9      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 676,0      |

Comune di **Torre de' Passeri**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 4,8        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 0,5        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 4,7        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 4,6        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 35,1       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 15,7       |

Comune di **Turrivalignani**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 1,5        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 9,4        |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 0,0        |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 4,2        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 61,6       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 76,3       |

Comune di **Vicoli**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 4,4        |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 30,7       |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 36,1       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 3,5        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 64,8       |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 176,4      |

Comune di **Villa Celiera**

| Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile |   | Superficie |
|--|---|------------|
| Gruppo pascoli   | Pascolo quasi completamente secco (praterie)  | 19,4       |
|  | Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada   | 128,2      |
|  | Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti) | 0,0        |
| Gruppo cespugli  | Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza  | 0,0        |
|  | Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)                             | 0,0        |
|  | Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)                  | 68,6       |
|  | Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.   | 8,0        |
| Gruppo lettiera  | Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie   | 152,6      |
|  | Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati  | 172,8      |





Finito di stampare  
nel dicembre 2009

