

Modelli di combustibile

Caratteristiche della vegetazione-combustibile

Provincia di **Teramo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1958,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	11187,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	579,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2224,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	4275,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	30063,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	21165,4

Comune di **Alba Adriatica**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	15,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	4,0

Comune di **Ancarano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	34,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	10,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	78,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	15,6

Comune di **Arsita**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	15,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	44,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	4,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	46,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	59,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	949,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	507,0

Comune di **Atri**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	37,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	231,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	55,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	25,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	395,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	318,7

Comune di **Basciano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	29,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	98,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	39,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	202,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	24,7

Comune di **Bellante**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	20,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	55,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	7,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	4,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	221,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	64,3

Comune di **Bisenti**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	18,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	127,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	56,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	337,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	301,8

Comune di **Campoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	39,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	389,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	8,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	64,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	53,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	864,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	887,4

Comune di **Canzano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	3,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	38,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	16,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	6,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	105,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	64,4

Comune di **Castel Castagna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	26,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	263,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	69,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	6,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	192,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	278,2

Comune di **Castellalto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	6,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	164,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	20,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	154,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	110,1

Comune di **Castelli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	25,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	124,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	32,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	141,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	89,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1292,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1253,7

Comune di **Castiglione Messer Raimondo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	10,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	133,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	45,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	6,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	218,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	190,9

Comune di **Castilenti**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	24,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	95,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	20,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	15,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	151,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	128,3

Comune di **Cellino Attanasio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	43,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	205,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	118,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	383,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	256,9

Comune di **Cermignano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	64,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	175,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	28,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	67,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	6,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	256,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	236,2

Comune di **Civitella del Tronto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	96,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	524,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	72,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	47,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	86,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1205,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1347,9

Comune di **Colledara**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	54,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	177,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	39,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	241,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	139,0

Comune di Colonnella

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	26,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	22,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	7,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	81,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	54,1

Comune di Controguerra

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	60,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	5,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	114,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	24,2

Comune di Corropoli

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	62,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1,5

Comune di Cortino

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	65,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1026,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	19,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	67,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	729,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1667,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1155,2

Comune di **Crognaleto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	229,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1270,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	62,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	132,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	712,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	4424,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	2987,3

Comune di **Fano Adriano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	56,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	466,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	21,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	397,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1341,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	499,4

Comune di **Giulianova**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	3,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	1,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	11,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	34,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	5,7

Comune di **Isola del Gran Sasso d'Italia**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	111,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	349,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	97,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	272,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	58,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2550,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1119,7

Comune di **Martinsicuro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	1,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	7,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	16,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	3,4

Comune di **Montefino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	25,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	130,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	20,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	92,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	127,0

Comune di **Montorio al Vomano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	75,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	810,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	121,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	131,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	667,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	593,9

Comune di **Morro d'Oro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	8,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	11,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	98,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	15,6

Comune di **Mosciano Sant'Angelo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	11,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	22,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	8,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	9,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	155,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	34,8

Comune di **Nereto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	5,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	24,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	0,0

Comune di **Notaresco**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	12,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	46,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	19,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	161,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	88,7

Comune di **Penna Sant'Andrea**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	15,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	107,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	36,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	118,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	107,7

Comune di **Pietracamela**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	36,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	87,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	9,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	36,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	305,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1504,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	445,1

Comune di **Pineto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	14,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	20,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	12,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	11,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	74,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	57,5

Comune di **Rocca Santa Maria**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	139,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	385,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	22,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	54,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	288,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2138,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1440,9

Comune di **Roseto degli Abruzzi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	5,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	14,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	9,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	30,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	157,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	22,4

Comune di **Sant'Egidio alla Vibrata**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	39,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	6,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	97,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	14,5

Comune di **Sant'Omero**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	17,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	9,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	121,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	16,9

Comune di **Silvi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	20,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	9,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	13,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	79,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	15,1

Comune di **Teramo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	29,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	937,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	8,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	164,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	62,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1541,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1159,4

Comune di **Torano Nuovo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	0,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	26,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	0,6

Comune di **Torricella Sicura**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	75,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	874,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	51,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	272,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	553,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1363,8

Comune di **Tortoreto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	3,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	41,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	8,9

Comune di **Tossicia**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	64,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	262,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	30,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	48,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	636,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	406,4

Comune di **Valle Castellana**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	447,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1306,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	153,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	242,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	774,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	4206,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	3267,0

Finito di stampare
nel dicembre 2009

