






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	15,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	3,9	1,1	1,1	0,8	0,9	0,2	1,9	5,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,5	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	10,2	4,2	0,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	22,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	26,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	66,7
26	Querceto a roverella pioniero	3,4
27	Querceto a roverella tipico	13,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	12,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,2	1,3	0,7	0,5	4,5	7,3	3,3	2,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	9,9	3,7	0,8	0,2	0,7	0,8	2,6	7,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	23,8	8,2	3,1	2,7	4,1	6,1	6,2	12,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,1	0,8	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	7,1	2,5	0,8	0,1	0,0	0,2	0,5	2,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,1	4,5	2,0	1,7	0,4	0,1	0,1	0,4	2,9
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	0,5	1,3	2,9	5,7	5,5	3,8	1,4	0,6	0,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,9	2,3	4,3	6,3	6,4	3,9	1,4	0,4	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	34,8	8,3	6,8	7,0	5,7	2,9	1,1	0,3	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,6	0,9	1,6	3,0	3,1	2,1	1,3	0,2	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	4,1	0,9	1,1	1,6	2,1	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	17,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	21,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	61,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	10,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	10,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	52,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	21,5
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	4,3
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	591,0
14	Faggeta termofila e basso montana	87,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	79,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	62,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	282,9
26	Querceto a roverella pioniero	14,7
27	Querceto a roverella tipico	8,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	372,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	26,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	10,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	4,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	2,7	7,2	27,0	10,8	2,6	1,8	0,2	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,7	0,5	0,2	0,0	0,3	0,7	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,9	1,6	5,2	7,0	3,1	1,9	0,2	0,8
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	1,0	1,4	0,9	0,2	0,1	0,4	0,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	183,6	282,5	84,7	14,2	1,6	0,9	1,2	22,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	37,2	27,6	8,9	1,8	0,0	0,0	1,3	10,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	22,4	18,6	12,9	3,6	6,4	2,1	3,4	10,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	15,6	13,7	6,4	0,5	0,0	1,3	14,3	11,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,6	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	56,8	40,8	37,8	18,3	15,2	21,3	41,8	50,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,9	0,2	0,4	1,7	7,5	3,0	0,4	0,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,7	3,3	2,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	74,6	59,4	46,4	28,3	20,9	27,7	48,5	66,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,8	6,1	7,3	1,0	0,5	1,5	3,9	2,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,4	0,7	0,4	0,8	1,2	0,0	0,1	3,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,5	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,1	0,2	1,9	6,9	11,8	12,7	10,8	5,7	1,5	0,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	0,7	2,0	4,4	5,6	4,4	3,0	1,2	0,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	1,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3,7	21,6	95,2	151,6	117,0	76,4	53,6	33,3	19,6	19,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	6,4	24,8	29,8	18,3	6,2	1,5	0,2	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	3,2	12,3	19,1	19,8	13,5	7,3	3,0	0,8	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,2	2,1	10,3	15,5	16,1	10,6	5,3	1,8	0,6	0,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,6	1,0	1,0	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,6	18,6	32,3	51,7	57,6	49,9	34,3	19,0	7,6	3,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,4	0,6	1,1	2,4	3,5	3,7	2,0	0,9	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,2	1,3	2,0	2,1	1,8	1,0	0,2	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,1	9,9	31,3	61,1	85,3	79,4	56,6	30,1	11,7	5,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,3	0,8	3,5	6,8	6,8	5,1	2,4	0,9	0,2	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,5	2,1	3,2	2,9	1,6	0,4	0,1	0,1	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,6	2,0	1,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	29,0	16,2	4,1	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,7	18,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	17,4	176,1	133,0	151,7	100,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	30,7	33,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,4	28,1	16,9	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	3,9	44,7	13,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	50,5	190,9	41,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	5,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	44,0	217,0	107,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	10,9	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	2,9	0,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	5,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	22,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	321,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	231,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	360,8
26	Querceto a roverella pioniero	16,4
27	Querceto a roverella tipico	52,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	23,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	36,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,9	2,5	0,7	0,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,7	3,3	1,3	2,3	3,5	2,2	3,0	4,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	21,4	13,6	25,3	42,9	49,7	57,9	69,7	40,5
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	40,2	28,8	18,7	15,7	15,9	18,7	41,2	52,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	81,7	43,4	27,9	26,9	44,4	42,6	42,1	51,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,9	0,6	0,1	2,5	2,7	2,4	1,1	4,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	15,8	2,9	1,6	2,0	2,1	4,7	10,3	12,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	4,3	3,8	1,4	3,3	2,0	1,4	3,7	3,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	8,4	4,3	3,9	2,4	5,5	4,2	4,6	3,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,8	1,4	1,2	0,8	0,7	0,3	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,3	1,7	1,6	4,3	5,5	4,1	1,2	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	4,6	11,5	18,6	35,3	68,9	77,5	63,8	29,7	9,1	2,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,6	9,1	19,4	44,4	59,6	50,8	27,7	10,2	3,2	1,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	99,4	68,0	51,8	47,8	43,1	28,6	14,6	5,0	1,5	0,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,4	0,9	2,0	3,2	4,2	3,3	1,6	0,5	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,6	2,0	4,7	9,3	12,1	10,9	7,7	3,1	1,3	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,1	1,3	2,0	4,2	4,8	3,9	1,5	0,4	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,8	1,6	2,9	4,5	7,1	7,0	6,4	4,1	1,5	0,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	4,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	20,2	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	192,1	127,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	150,2	75,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	325,8	34,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	7,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	22,9	28,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	15,1	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	13,6	18,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	26,7
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	41,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	190,9
26	Querceto a roverella pioniero	22,6
27	Querceto a roverella tipico	72,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	15,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	16,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,2	1,1	1,1	1,5	2,3	0,2	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,6	0,3	1,7	5,4	7,0	6,3	4,0	1,5
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,8	3,7	0,6	0,9	8,4	9,1	11,2	4,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	2,3	27,2	31,5	18,8	9,9	10,6	28,3	32,8	29,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,4	4,7	4,2	11,6	1,7	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,0	5,4	6,0	7,6	11,0	9,1	16,2	12,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,1	0,4	1,1	0,4	1,1	3,7	3,9	2,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	2,1	4,7	2,2	0,0	1,0	2,0	2,9	1,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,5	0,7	0,7	1,1	1,1	1,2	0,6	0,2	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,2	1,1	2,4	3,2	4,1	5,3	4,6	3,6	1,7	0,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,8	2,3	8,1	8,3	8,0	6,3	3,7	1,2	0,4	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	78,5	23,3	22,7	21,6	18,6	13,5	7,6	3,4	1,1	0,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	0,7	2,2	4,7	6,8	5,1	2,6	0,4	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,9	3,0	6,8	12,1	15,0	14,7	11,2	6,3	2,1	0,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,2	0,8	0,9	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,4	2,5	4,8	3,7	2,3	1,1	0,3	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	1,2	0,9	1,9	2,6	3,4	3,1	2,0	1,0	0,4	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	22,1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,7	25,3	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	95,7	87,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	20,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,4	61,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,3	13,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	3,4	10,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	45,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	64,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	204,1
26	Querceto a roverella pioniero	8,9
27	Querceto a roverella tipico	27,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	17,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,8	1,1	0,3	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,6	2,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,7	0,6	2,7	4,9	9,9	15,5	7,9	2,8
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,6	10,1	4,9	4,8	6,2	6,0	11,7	7,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,7	24,7	20,7	18,5	15,5	21,6	35,4	38,7	28,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	1,4	1,3	2,1	1,5	1,4	0,9	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,8	3,0	2,6	3,9	2,6	2,0	2,9	4,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,2	0,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	5,4	3,6	0,6	0,1	1,2	2,0	1,6	2,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	0,8	1,6	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,7	2,3	4,1	7,4	12,0	10,3	6,2	1,7	0,4	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,1	5,5	10,6	16,1	15,6	9,4	4,4	1,4	0,4	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	48,5	33,0	29,6	29,0	24,6	17,6	10,5	5,3	2,8	3,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,3	0,6	1,8	2,4	1,8	1,2	0,5	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,3	1,3	3,2	4,9	5,7	5,3	3,5	2,4	0,8	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,0	1,9	2,3	3,2	3,1	2,8	1,9	0,6	0,3	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	22,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	35,8	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	175,5	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	5,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	11,9	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	9,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	40,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	147,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	327,2
26	Querceto a roverella pioniero	36,8
27	Querceto a roverella tipico	49,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	214,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	11,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	17,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,6	7,7	7,1	7,4	5,2	6,4	4,0	0,6
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	13,1	19,0	26,9	22,7	17,8	16,8	17,5	14,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	45,7	45,9	40,8	29,0	29,4	34,1	52,4	49,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,4	5,9	5,1	7,3	4,7	2,6	5,2	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,6	8,3	9,2	9,6	7,4	7,6	3,1	1,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	18,7	22,7	28,8	30,8	32,2	36,4	24,5	20,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	2,2	6,1	1,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,4	2,4	3,9	0,9	1,7	5,5	2,2	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	0,8	3,9	7,0	9,7	8,9	5,4	3,1	0,8	0,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,0	4,8	16,7	29,8	34,9	29,5	17,8	8,7	2,8	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	34,2	25,9	38,8	52,6	57,8	49,9	36,0	19,7	8,5	3,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	0,7	3,1	7,3	8,8	8,5	4,5	2,4	0,8	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,6	1,7	3,9	6,5	9,2	10,2	8,6	5,6	2,1	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,1	7,2	17,0	34,0	46,6	44,1	33,8	20,1	6,9	1,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,5	2,8	3,3	2,6	1,6	0,5	0,2	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,2	0,6	2,2	3,5	4,0	2,9	2,1	1,0	0,5	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	26,0	11,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	108,3	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	249,1	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	19,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	27,8	14,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	128,3	85,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	5,9	5,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	5,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	25,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	26,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	34,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	1,3
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	36,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	145,8
14	Faggeta termofila e basso montana	7,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	259,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	93,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	54,7
21	Ostrieto mesofilo	181,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	141,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	539,6
26	Querceto a roverella pioniero	164,3
27	Querceto a roverella tipico	23,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	309,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	34,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	12,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	134,8
32	Robinetto-aillanteto	68,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	1,6	2,5	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,4	1,8	5,4	6,0	8,7	2,4	0,3	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,1	2,7	4,1	3,5	4,1	5,5	2,8	1,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,6	2,5	1,5	0,7	1,0	0,2	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,8	2,6	0,9	2,6	6,8	9,6	6,8	2,7
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,8	16,6	4,8	5,6	8,2	0,7	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	25,7	22,5	71,7	14,3	7,9	2,6	0,5	0,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,3	2,1	2,8	0,8	0,2	1,0	0,3	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	54,9	45,3	39,0	28,2	13,9	14,2	24,2	39,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,4	0,1	0,9	33,5	22,5	31,1	4,6	0,4
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,6	5,5	28,3	10,6	3,5	5,9	0,2	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	12,6	24,5	109,0	24,5	1,3	2,2	3,8	3,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	23,9	23,5	25,5	35,5	15,5	7,0	1,6	8,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	118,8	80,8	55,9	57,9	49,8	47,1	48,7	80,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	8,8	19,1	36,4	43,5	31,1	18,5	3,9	2,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,3	3,2	3,0	4,7	5,2	0,7	1,2	3,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	46,9	50,5	61,6	50,9	29,7	20,6	17,3	31,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	5,2	3,2	4,3	6,0	2,6	1,1	4,3	8,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	3,0	3,5	1,5	0,6	0,7	1,0	1,2	1,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	13,0	24,5	53,7	35,2	6,5	0,1	0,1	1,7
32	Robinieta-ailanteto	0,0	26,2	11,4	4,5	6,1	2,1	0,6	2,7	14,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	0,8	0,6	0,8	1,1	1,0	0,6	0,1	0,1	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,4	1,4	4,4	7,6	5,7	4,2	1,0	0,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	1,3	4,5	6,8	6,3	4,2	2,3	0,7	0,2	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5	2,1	1,3	1,1	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,6	1,9	2,8	5,7	8,0	6,8	4,7	2,3	0,9	0,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,1	1,2	4,4	7,7	8,6	5,7	4,5	4,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	0,5	2,3	12,3	29,9	31,9	32,8	18,0	10,5	7,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,1	1,0	1,2	1,1	1,8	1,1	0,8	0,4	0,1
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,0	30,0	56,8	63,9	47,0	29,2	14,3	6,2	2,1	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,3	0,5	0,6	3,0	11,9	20,2	19,7	13,4	23,9
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3	1,7	3,2	9,4	10,1	11,7	8,8	5,7	2,2	1,7
21	Ostrieto mesofilo	0,1	1,3	6,1	19,8	39,1	43,8	39,6	21,7	6,5	3,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,9	7,2	12,7	16,7	23,0	28,1	25,6	16,2	7,2	3,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	74,4	79,7	91,3	94,0	78,8	55,3	31,5	18,2	9,8	6,6
26	Querceto a roverella pioniero	5,2	21,8	35,1	38,6	29,5	18,4	9,5	3,8	1,6	0,9
27	Querceto a roverella tipico	0,7	4,1	4,8	4,2	3,6	2,9	2,0	0,9	0,4	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,6	26,0	49,0	62,0	60,1	43,7	30,7	16,4	7,8	3,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,5	5,9	10,9	8,5	4,9	2,0	1,2	0,5	0,3	0,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	2,5	5,3	3,1	1,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,2	9,9	17,7	24,1	25,0	22,3	16,8	10,7	5,3	1,8
32	Robiniato-aillanteto	5,7	5,6	9,2	10,3	10,3	8,8	7,7	5,4	3,2	1,9
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	1,0	3,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7,1	13,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,8	11,4	11,8	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,9	1,2	0,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	10,0	20,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	7,4	18,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	6,5	6,0	41,4	69,9	19,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,0	143,4	93,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	6,1	40,1	36,9	10,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	5,0	40,0	9,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	6,8	69,3	86,7	18,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	6,5	14,8	57,4	29,6	30,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	79,2	244,5	187,3	28,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	66,7	62,2	34,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,9	14,6	4,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	98,9	132,2	59,6	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,1	14,5	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	4,8	7,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	33,6	94,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	6,0	25,9	29,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	10,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	42,8
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	42,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	96,2
26	Querceto a roverella pioniero	13,3
27	Querceto a roverella tipico	12,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	9,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,5	4,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,8	2,5	0,8	0,7	0,6	0,3	0,2	0,3	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	5,8	8,7	4,8	5,6	6,5	3,1	3,0	5,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,5	5,1	9,4	5,5	5,5	4,4	8,0	2,0	2,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	11,7	6,5	8,7	10,0	15,6	17,3	14,9	11,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,3	0,8	0,0	2,3	3,1	2,1	2,9	1,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,2	0,0	0,0	1,1	1,0	2,1	3,2	2,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,5	1,0	0,6	0,3	1,9	0,7	1,1	2,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	1,2	3,1	3,1	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,3	2,1	4,5	8,5	10,6	9,0	5,2	2,1	0,6	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	9,2	1,5	3,4	6,5	7,5	6,9	3,8	2,2	1,2	0,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,4	10,9	13,1	12,5	10,8	7,7	3,7	1,4	0,7	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,0	1,6	2,3	2,7	2,4	1,7	1,1	0,3	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,2	0,4	1,1	3,0	3,5	2,2	1,3	0,5	0,2	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,2	0,4	0,9	1,7	2,4	1,7	1,1	0,6	0,2	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	6,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	16,7	19,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	62,2	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	4,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	3,9	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,5	3,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	16,7
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	53,5
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	143,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	184,8
26	Querceto a roverella pioniero	119,2
27	Querceto a roverella tipico	112,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	173,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	21,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	8,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,3	0,5	0,1	1,1	3,2	5,7	3,2	1,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,9	0,4	0,4	0,0	0,0	1,1	2,4	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,2	4,4	12,5	11,9	12,6	3,8	3,7	3,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	15,2	22,0	17,4	19,7	19,5	21,0	12,8	16,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	31,1	32,5	15,4	6,1	9,2	19,5	30,4	40,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	12,3	10,3	12,4	9,8	11,7	24,8	21,9	16,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	21,1	26,3	8,1	2,4	6,0	17,7	14,1	16,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	26,5	21,0	20,5	17,3	18,7	19,5	19,0	30,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,4	1,8	0,8	2,6	3,3	5,5	4,9	2,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,2	1,5	1,5	0,0	0,3	1,7	0,8	1,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,0	0,3	1,7	3,1	3,2	3,2	2,3	1,2	0,5	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,3	1,8	1,5	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,3	1,1	3,1	5,7	8,1	9,5	10,6	8,4	4,8	1,9
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8	4,9	18,1	31,5	35,8	27,0	16,1	6,7	2,3	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	21,9	18,5	26,8	34,7	34,2	26,2	14,1	6,6	1,6	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,4	2,6	10,8	22,0	27,6	25,4	18,8	9,1	2,3	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,6	3,0	13,1	22,4	26,1	23,2	13,9	6,9	2,1	0,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8	2,8	12,8	31,4	44,9	41,4	23,6	11,5	3,4	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,6	2,5	5,4	6,0	4,6	1,9	0,4	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,3	0,5	1,3	2,0	2,0	1,5	0,5	0,1	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	13,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	26,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	93,9	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	144,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	89,0	29,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	63,2	48,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	73,2	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	18,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	4,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	108,8
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	66,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	141,0
26	Querceto a roverella pioniero	33,6
27	Querceto a roverella tipico	74,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	7,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	15,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	2,1	1,6	2,5	1,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,3	0,6	0,3	0,3	0,1	0,6	0,5	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	5,5	2,3	1,8	5,6	18,2	29,6	30,0	15,7
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	8,5	8,8	4,6	2,0	2,8	10,9	16,9	12,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,3	24,5	18,9	13,0	12,1	19,0	20,0	19,1	14,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,0	1,0	6,6	5,4	6,3	5,7	5,0	2,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	7,1	9,5	6,4	4,0	4,7	12,3	17,2	13,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,2	0,8	0,1	0,6	1,4	1,2	2,7	0,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	4,5	1,9	0,5	0,1	0,9	0,9	3,6	3,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,2	0,5	0,6	1,7	1,8	1,5	0,9	0,4	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,4	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,2	5,6	7,7	15,7	23,2	21,9	17,5	9,3	4,5	2,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,5	2,1	5,9	12,1	17,2	14,3	9,2	3,8	1,1	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	50,7	24,9	17,5	13,9	12,9	10,8	5,8	2,6	1,1	0,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	0,9	2,0	3,2	5,7	6,5	6,4	4,4	2,7	1,6
27	Querceto a roverella tipico	1,0	2,2	4,6	10,3	15,6	16,3	12,6	6,8	3,2	1,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,3	0,5	1,4	2,0	1,5	1,0	0,5	0,2	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,4	1,3	1,8	2,2	2,5	2,5	1,7	0,9	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,9	2,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,7	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	17,1	82,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	12,8	49,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	104,8	36,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,9	29,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	10,6	60,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,5	4,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	5,2	8,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	3,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	69,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	53,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	73,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	29,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	744,4
14	Faggeta termofila e basso montana	150,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	237,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	45,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	361,9
26	Querceto a roverella pioniero	46,9
27	Querceto a roverella tipico	5,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	948,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	104,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	55,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	16,4
32	Robinieta-ailanteto	8,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	1,2	2,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	37,7	22,6	6,2	0,5	0,0	0,0	0,1	2,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,4	4,6	8,8	7,2	7,5	9,1	10,5	4,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	7,4	4,5	11,0	12,4	9,9	10,5	8,6	8,8
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	7,9	5,6	4,6	0,3	0,0	0,1	2,3	8,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	230,6	208,1	124,1	12,9	0,3	4,2	27,0	137,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	23,6	37,5	21,5	9,4	0,3	3,9	23,6	30,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	37,7	48,2	48,7	20,1	4,8	3,6	32,2	42,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	11,6	10,2	3,9	3,1	0,7	1,9	5,0	9,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	52,1	63,9	57,2	22,9	12,4	22,3	62,1	69,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,8	1,0	5,8	8,8	5,4	3,2	12,7	7,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,6	2,1	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	134,3	138,8	143,4	70,9	53,6	64,7	173,0	169,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	16,2	6,1	3,5	0,6	3,7	14,9	27,8	31,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	15,9	14,5	6,7	3,9	0,5	1,7	2,8	8,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,9	4,6	3,6	2,0	0,0	1,0	2,0	1,2
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,1	0,4	0,9	1,2	0,9	1,3	1,2	1,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,3	1,2	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,5	6,4	14,4	18,5	14,8	9,3	5,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	2,0	9,7	14,6	13,8	7,6	3,4	1,5	0,4	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,6	2,0	5,9	10,5	15,9	14,8	12,5	7,4	2,8	0,8
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,2	0,4	1,2	2,2	2,9	4,1	3,7	14,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,3	19,7	65,0	114,8	134,0	122,8	101,0	73,8	52,0	60,1
14	Faggeta termofila e basso montana	1,0	6,6	22,1	38,3	34,5	22,9	13,3	5,6	2,9	3,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,3	16,1	49,2	68,3	53,0	28,1	12,8	4,8	2,0	0,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,7	2,7	8,4	12,2	11,3	6,7	2,6	0,9	0,2	0,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,4	0,9	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	13,5	25,9	55,5	80,8	76,2	55,1	31,5	14,5	6,2	2,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	1,0	6,3	10,2	10,8	8,4	5,7	3,1	1,0	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,4	1,1	1,0	1,2	0,7	0,4	0,0	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	13,4	43,9	116,9	200,8	218,3	173,9	104,3	50,3	18,9	7,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,4	4,9	16,3	26,6	22,5	16,1	8,3	2,9	1,0	0,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2	2,3	9,1	14,1	12,8	8,9	4,7	2,2	0,5	0,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,2	0,8	2,5	5,4	4,7	1,9	0,8	0,1	0,0	0,0
32	Robinietao-ailanteto	0,0	0,4	1,0	1,6	1,5	1,6	1,5	0,7	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	32,1	23,1	6,0	0,7	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	6,2	35,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	6,3	53,2	12,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6,9	11,7	9,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	8,8	263,7	225,4	154,1	89,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	95,6	53,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	14,1	138,0	62,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	3,2	31,2	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	99,5	200,0	62,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,6	42,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,9	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	121,1	605,7	217,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	16,2	80,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	6,4	46,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	4,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,5	7,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Comune di Castiglione Messer Raimondo




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	42,6
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	193,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	3,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	190,2
26	Querceto a roverella pioniero	13,2
27	Querceto a roverella tipico	87,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	32,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	28,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	4,4	1,0	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,5	2,6	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,7	1,3	0,8	3,6	14,9	9,0	6,0	4,5
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	36,8	23,6	10,5	14,7	21,5	20,3	26,4	39,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	0,5	0,0	0,0	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	28,0	17,4	19,3	19,9	27,3	28,7	23,5	26,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	0,2	0,7	4,9	4,9	2,1	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	18,7	5,5	3,1	3,2	14,8	9,6	12,8	19,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	6,2	4,0	1,7	0,3	0,4	1,3	6,6	12,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,1	0,0	0,1	1,4	1,6	0,4	0,0	0,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	6,9	5,2	2,4	2,4	0,9	1,2	3,5	6,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,3	0,8	1,4	1,3	1,1	0,9	0,5	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,8	1,7	2,0	1,2	0,8	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,3	1,1	3,5	4,7	7,1	7,9	7,2	5,7	3,6	1,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	8,1	6,5	15,8	28,7	35,7	37,7	29,6	18,1	8,8	4,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,1	0,6	1,2	0,9	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	49,7	21,1	19,4	21,6	22,3	21,6	16,0	10,2	5,7	2,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	0,2	0,7	1,4	2,6	3,0	2,7	1,5	0,7	0,1
27	Querceto a roverella tipico	3,2	2,3	6,1	11,8	16,8	17,4	15,3	9,2	3,8	1,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	1,1	2,6	5,4	6,3	7,7	5,3	2,6	1,2	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,3	0,7	1,3	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,5	1,7	2,3	4,0	5,6	6,0	4,8	2,7	0,9	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,6	39,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,2	139,5	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	71,7	109,6	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	12,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	12,7	63,2	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	11,9	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	5,6	17,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	8,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	13,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	125,9
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	85,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	153,1
26	Querceto a roverella pioniero	9,1
27	Querceto a roverella tipico	35,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	6,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	5,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,9	1,7	1,2	1,0	0,9	0,4	0,3	1,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	1,8	1,5	1,7	3,9	1,3	1,3	1,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	12,8	9,4	8,1	7,9	14,2	21,4	28,9	23,2
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	9,6	7,9	8,9	6,4	5,1	9,2	20,8	17,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	13,7	18,8	23,8	13,3	15,4	17,6	26,8	23,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,4	0,4	1,6	1,2	2,4	0,8	1,3	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	7,2	4,2	4,9	0,7	2,3	4,6	3,5	7,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,9	0,2	0,7	1,1	2,2	1,2	0,1	0,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,7	1,7	0,6	0,1	0,1	0,4	1,3	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,1	0,6	1,7	2,0	1,8	0,9	0,6	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,6	1,5	3,0	3,2	2,6	1,2	0,4	0,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,5	1,6	3,8	10,6	24,0	29,7	27,5	17,5	7,0	3,8
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,9	1,9	4,4	12,7	21,4	21,3	14,0	6,3	2,3	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,1	16,0	16,2	19,2	23,2	19,1	12,4	7,4	3,1	1,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,5	0,0	0,1	0,7	1,2	2,3	1,7	1,5	0,6	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,4	0,9	2,9	5,2	8,1	7,4	5,4	2,7	1,3	0,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,1	0,2	0,6	1,8	1,8	1,7	0,4	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	0,5	0,4	0,4	0,9	0,8	0,9	0,7	0,3	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,7	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,4	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	42,7	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	31,3	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	111,3	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	4,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	12,2	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	22,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	3,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	108,2
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	233,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	10,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	326,8
26	Querceto a roverella pioniero	26,7
27	Querceto a roverella tipico	100,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	96,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	24,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinetto-aillanteto	63,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,5	3,1	3,3	3,9	5,0	3,0	1,6	1,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,3	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	12,1	7,5	11,2	19,1	18,7	14,1	13,7	11,9
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	36,4	31,4	23,6	17,8	19,4	21,5	36,2	47,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,9	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	2,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,9	66,1	42,7	29,7	25,1	22,2	25,9	44,3	70,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,2	1,7	2,1	7,6	6,8	6,0	1,1	0,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	10,2	8,0	11,9	9,0	12,7	16,7	12,6	19,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	16,4	14,3	6,2	6,3	8,6	3,7	20,6	20,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,1	3,3	4,3	3,5	3,7	4,2	2,3	1,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	11,8	13,3	8,6	5,2	5,0	2,6	4,3	12,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,1	2,7	4,9	5,8	4,5	2,6	0,8	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,1	0,8	1,0	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,0	3,5	8,1	12,9	21,7	23,3	19,5	11,5	4,5	2,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,6	9,0	25,0	43,2	51,3	44,8	30,9	15,2	6,4	2,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	0,4	1,0	2,3	2,3	1,7	1,1	0,7	0,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	50,3	34,7	44,6	52,5	51,2	41,0	29,0	14,7	5,9	2,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,5	1,6	2,8	4,6	5,2	5,6	4,0	1,7	0,5
27	Querceto a roverella tipico	1,8	3,5	7,3	12,3	18,2	20,3	16,8	10,4	5,2	4,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,5	2,4	6,6	11,6	18,4	20,6	18,8	11,6	4,5	2,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,7	2,0	3,5	6,7	6,4	3,9	1,1	0,2	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,1	4,1	6,3	10,3	13,7	12,7	8,1	4,1	1,7	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	5,0	14,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	22,1	77,2	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	35,5	156,3	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	140,5	152,7	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	25,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	9,0	69,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	25,0	68,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,5	13,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	8,6	43,7	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	15,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	47,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	231,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	216,9
26	Querceto a roverella pioniero	33,4
27	Querceto a roverella tipico	108,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	102,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	14,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	58,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,7	1,8	1,3	1,5	1,8	1,4	1,2	3,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,9	0,1	0,1	1,1	0,9	0,3	0,6	0,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	7,5	10,6	8,8	3,6	2,2	5,4	5,0	4,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	37,5	29,8	26,0	24,6	16,9	16,1	32,0	47,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	50,6	35,9	22,6	18,0	13,3	14,9	20,7	40,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,9	1,1	3,6	10,2	8,8	2,8	2,4	3,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	24,1	16,1	13,3	6,2	1,9	6,2	15,4	25,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	25,0	11,1	8,8	8,7	4,5	6,9	11,1	25,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,4	1,7	1,0	1,3	0,5	2,0	1,9	3,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	9,5	8,4	6,1	7,6	3,8	2,0	5,8	15,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,9	2,8	3,5	3,0	1,9	1,2	0,5	0,2	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,8	0,6	0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,9	6,0	10,5	10,6	8,6	5,6	3,2	1,1	0,5	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,2	13,1	32,8	49,5	50,4	39,4	23,4	11,1	3,7	1,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	1,1	0,6	0,4	0,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	31,9	17,4	28,9	39,8	38,9	28,6	17,3	8,9	3,5	1,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	1,1	4,2	6,4	7,4	6,8	4,8	1,8	0,6	0,1
27	Querceto a roverella tipico	1,1	5,2	15,3	24,6	24,8	18,5	11,6	5,0	1,8	0,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,6	4,6	10,2	16,1	21,5	20,7	15,4	8,0	3,6	1,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,5	1,7	3,2	3,6	3,4	1,6	0,4	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,8	4,3	9,8	15,1	13,3	8,1	4,1	2,0	0,6	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,5	8,3	3,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,1	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	16,8	27,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	37,6	85,7	99,1	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	66,9	48,5	93,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,4	14,9	14,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	18,2	63,1	14,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	15,0	76,1	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	6,2	13,1	31,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	23,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	18,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	22,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	12,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	29,2
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	11,6
9	Castagneto da frutto	52,4
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	95,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	480,5
14	Faggeta termofila e basso montana	63,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	139,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	31,3
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	27,7
21	Ostrieto mesofilo	502,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	262,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	541,1
26	Querceto a roverella pioniero	98,8
27	Querceto a roverella tipico	65,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	549,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	94,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	27,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	183,2
32	Robinieta-aillanteto	45,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,5	2,5	9,4	5,9	2,5	0,7	0,4	0,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	2,7	10,2	2,9	2,3	0,2	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,7	3,7	2,2	1,6	2,3	2,6	5,1	3,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,5	2,3	2,6	0,6	0,4	0,2	0,3	2,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,9	2,4	5,1	8,9	7,6	3,1	0,1	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	3,6	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,1	4,8
9	Castagneto da frutto	0,0	12,6	4,7	1,5	0,4	0,1	0,6	6,8	25,7
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	19,4	13,4	24,7	18,0	13,8	0,9	0,6	4,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	135,7	201,0	100,1	5,9	0,1	0,4	7,2	30,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	15,7	26,9	6,9	0,9	3,8	1,1	0,6	7,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	16,8	13,9	17,9	19,5	17,3	7,6	17,8	28,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,0	0,9	4,2	7,9	12,7	3,6	0,3	0,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,3	5,0	7,5	5,5	4,5	3,4	0,2	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,1	91,3	208,8	124,7	23,1	12,6	2,4	7,9	31,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	36,9	55,9	51,5	44,0	20,4	11,4	9,2	33,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,6	113,0	74,3	66,4	61,0	39,2	29,3	49,4	107,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,5	12,5	28,9	22,5	17,8	9,0	1,8	1,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	11,1	6,0	6,8	13,0	5,5	4,8	5,0	13,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	93,7	139,0	117,3	70,2	32,1	15,3	27,5	54,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	10,9	4,3	14,6	16,3	12,8	7,3	10,6	17,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,9	7,0	8,5	2,2	1,4	0,1	0,3	2,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	23,4	65,3	73,9	14,1	3,6	0,6	0,9	1,4
32	Robinieta-aillanteto	0,2	9,1	10,7	8,0	6,0	3,2	2,6	1,2	4,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,3	3,0	4,5	5,1	3,5	2,3	1,6	1,1	1,1	0,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	3,0	4,4	3,1	3,2	2,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	1,4	4,6	6,2	5,5	3,1	1,5	0,2	0,0	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,4	1,9	2,1	3,0	2,3	0,9	0,3	0,1	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,9	3,5	5,9	6,5	5,5	3,8	1,9	0,7	0,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,1	0,7	1,5	2,4	2,5	2,1	1,4	0,6	0,3	0,1
9	Castagneto da frutto	1,4	4,1	6,1	8,3	10,2	10,0	7,7	2,9	1,1	0,7
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,8	4,0	15,2	14,1	10,6	12,9	13,9	11,7	8,6	3,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	2,4	29,9	77,3	99,4	93,8	76,7	58,2	28,5	14,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	2,1	7,6	14,1	16,4	10,0	5,0	3,1	2,5	2,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,5	10,0	25,7	34,0	32,3	20,1	10,0	3,6	1,1	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,1	0,1	0,2	0,3	1,1	2,9	4,5	4,9	4,5	12,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,7	2,5	4,8	5,2	4,7	3,0	2,7	2,3	1,3	0,5
21	Ostrieto mesofilo	1,1	6,1	18,4	47,6	89,0	114,2	99,3	70,7	36,0	20,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	5,0	13,8	34,1	54,8	57,7	42,9	27,6	16,0	6,8	4,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	71,0	82,9	96,7	95,0	77,1	55,7	31,9	17,3	7,8	5,7
26	Querceto a roverella pioniero	2,6	10,0	22,1	23,4	20,3	10,8	5,7	2,8	1,0	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,8	3,6	9,1	12,6	13,9	11,7	8,3	3,5	1,5	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	8,9	40,6	92,5	115,0	108,4	83,0	52,1	27,9	13,9	7,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,0	7,0	13,0	23,0	21,5	14,6	6,4	3,0	1,0	0,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,7	3,0	7,3	6,8	4,6	2,1	1,1	0,6	0,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	3,8	10,3	17,4	22,1	29,6	36,3	29,6	22,5	9,6	2,0
32	Robinieta-aillanteto	3,4	5,7	9,4	9,8	7,1	5,1	3,0	1,3	0,5	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	3,9	16,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	9,0	0,5	4,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,8	8,5	12,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	11,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,2	20,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	8,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	1,1	42,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	18,4	50,9	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	109,6	209,9	146,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,2	17,4	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,4	83,2	48,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	3,4	15,6	11,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	3,6	7,8	13,8	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	28,2	147,5	193,8	106,3	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	22,4	129,1	95,1	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	60,4	231,1	226,2	22,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	17,1	42,2	39,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,8	47,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	38,9	266,0	208,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	6,2	76,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	2,3	23,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	8,6	112,6	54,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,6	18,3	21,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	10,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	63,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	63,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	18,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	218,8
26	Querceto a roverella pioniero	45,8
27	Querceto a roverella tipico	101,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	108,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	22,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	1,6	2,7	4,7	1,0	0,7	0,0	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	3,0	12,3	14,3	15,1	15,1	3,2	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	16,6	8,2	7,0	10,0	10,2	2,9	1,0	7,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	11,7	3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	38,9	29,5	31,2	35,6	19,5	10,1	20,7	33,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,5	6,5	12,0	14,6	8,3	1,3	0,1	0,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	10,7	16,6	27,7	26,7	13,8	2,5	0,9	3,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	11,9	21,0	25,5	27,6	13,7	2,1	1,9	4,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,3	1,3	2,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	4,7	4,1	1,9	3,2	4,4	2,2	0,1	2,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,2	1,7	2,4	3,1	2,3	0,8	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,0	4,2	7,7	11,4	13,0	10,9	7,8	4,7	2,0	0,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,6	3,3	11,1	16,7	13,1	8,4	4,5	1,7	0,3	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,9	1,5	2,5	3,4	3,1	2,9	2,2	1,2	1,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	48,5	25,4	26,8	30,0	30,0	25,0	16,9	9,0	4,4	2,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	2,0	6,4	11,9	12,2	8,5	3,1	1,2	0,2	0,1
27	Querceto a roverella tipico	2,0	5,8	16,7	26,0	22,1	16,0	8,8	3,7	0,7	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,8	6,1	13,9	21,9	25,6	19,5	11,7	5,3	1,7	0,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,2	0,5	1,2	1,6	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,9	2,3	3,7	4,6	4,0	3,2	1,5	0,3	0,1	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,9	4,7	3,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	53,8	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,1	41,0	12,8	3,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	17,2	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,9	151,1	54,8	6,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	8,4	15,0	22,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	73,5	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	44,8	26,9	30,5	6,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	4,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,1	16,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	14,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	46,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	76,6
26	Querceto a roverella pioniero	3,9
27	Querceto a roverella tipico	8,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	28,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	5,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,8	1,0	0,3	0,3	0,1	0,1	1,7	1,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,4	0,6	0,0	0,7	4,2	4,1	1,9	1,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	20,8	3,3	2,5	1,7	0,9	0,8	1,7	14,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	16,8	13,8	7,6	5,4	7,5	10,4	6,2	8,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,5	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	1,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	3,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	14,7	2,1	0,7	0,3	0,7	0,5	1,9	7,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	1,7	1,8	0,9	0,4	0,3	0,4	0,0	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,6	1,8	2,6	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,5	1,0	2,1	2,0	1,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	0,2	0,8	1,8	2,8	3,4	2,8	1,6	0,6	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,7	2,2	9,8	13,8	11,5	5,2	1,7	0,8	0,2	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	22,7	18,3	16,0	10,9	6,1	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,3	0,9	1,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,4	1,1	1,9	2,3	1,7	0,7	0,1	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,6	1,5	4,1	6,2	6,7	4,6	2,7	1,6	0,6	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,9	1,5	0,9	1,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	39,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	75,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	14,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	2,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,5
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	24,5
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	16,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	109,5
26	Querceto a roverella pioniero	1,0
27	Querceto a roverella tipico	40,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	4,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,3	1,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	2,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	3,9	0,9	0,6	0,1	0,8	4,8	6,3	7,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,5	1,1	0,1	0,0	0,1	1,1	1,9	7,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,4	29,0	7,6	7,8	11,6	9,7	10,1	8,2	25,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	19,1	4,5	0,4	0,4	0,3	0,8	3,6	11,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	4,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,5	0,4	0,1	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,1	0,4	0,7	1,7	1,1	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	0,3	0,8	1,6	4,8	6,8	5,7	3,0	1,2	0,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,5	0,7	1,3	2,3	4,6	3,9	2,2	0,4	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	58,1	24,6	11,0	7,4	5,1	2,3	0,8	0,3	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	2,8	4,6	5,5	7,6	8,1	6,6	3,4	1,7	0,3	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	0,8	2,5	2,8	1,9	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,3	0,7	0,8	0,6	0,9	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	20,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	14,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	108,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	37,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	62,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,2	0,1	0,3	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	9,9	8,6	7,8	5,2	7,5	9,1	8,0	5,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,9	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	29,1	21,0	7,2	2,7	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	245,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	441,6
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	4,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	5,5
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	2,3
10	Cerreta mesofila	220,8
11	Cerreta mesoxerofila	195,3
12	Faggeta altomontana rupestre	99,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1248,2
14	Faggeta termofila e basso montana	136,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	117,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	101,2
21	Ostrieto mesofilo	177,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	725,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	214,0
26	Querceto a roverella pioniero	119,2
27	Querceto a roverella tipico	2,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	494,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	41,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	131,9
32	Robinieta-aillanteto	2,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	40,0	17,0	18,4	18,5	21,5	27,2	22,4	80,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	80,1	62,3	58,3	59,9	31,3	33,5	52,1	64,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,3	1,8	0,6	0,5	0,3	1,0	0,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	1,3	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	1,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	105,4	40,8	12,8	4,5	5,0	6,0	2,8	43,6
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	44,6	30,1	36,7	30,5	14,6	8,1	5,4	25,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	7,5	5,6	15,9	20,5	15,4	14,9	10,7	9,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	223,1	213,6	221,4	233,3	96,3	81,3	55,4	123,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	16,4	16,6	20,3	12,3	4,5	15,2	22,3	29,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	32,2	14,0	8,7	5,8	1,5	4,6	13,4	37,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,4	6,0	22,1	25,0	20,3	13,8	8,2	3,4
21	Ostrieto mesofilo	0,1	33,4	41,8	42,7	9,4	2,0	0,5	16,4	31,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	129,5	148,3	151,4	89,0	51,5	33,7	52,8	69,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,3	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	53,0	31,1	17,7	16,4	13,1	16,4	26,5	39,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,1	6,6	21,8	41,2	34,6	9,5	2,5	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	0,4	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	56,9	46,4	55,9	72,7	104,6	79,7	44,5	33,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	11,3	5,7	3,0	3,3	2,7	4,0	4,9	6,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	7,3	23,8	27,8	30,2	21,2	14,9	3,3	3,5
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,5	27,4	63,2	47,3	32,4	29,2	21,9	13,1	6,4	2,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,0	27,8	79,1	103,9	99,3	68,4	38,3	15,8	4,8	1,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,1	0,2	0,7	0,9	1,0	1,3	0,5	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,1	0,1	0,4	0,4	0,9	1,2	1,2	0,8	0,1	0,3
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,6	0,4	0,2	0,0
10	Cerreta mesofila	1,7	9,8	34,7	44,2	43,6	33,5	23,8	16,4	8,2	4,9
11	Cerreta mesoxerofila	0,6	4,3	16,9	29,3	37,7	37,6	32,6	21,9	10,8	3,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,1	1,0	4,5	9,8	17,0	22,4	19,6	15,5	7,3	2,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,3	23,7	76,5	170,3	245,5	245,7	202,8	143,5	81,5	52,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,5	2,9	8,6	18,6	26,0	28,3	24,7	16,5	7,2	3,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,3	7,9	19,5	26,7	24,7	19,7	11,1	5,0	1,4	0,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3	2,5	5,7	9,9	16,7	23,0	20,4	14,4	6,9	1,3
21	Ostrieto mesofilo	0,8	2,9	12,2	21,9	29,7	32,3	30,3	21,8	14,8	10,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	4,3	23,1	45,7	79,2	114,3	135,8	129,0	99,3	57,4	37,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,5	0,2	0,3	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,9	14,5	28,5	36,8	38,7	33,7	25,3	16,7	8,9	5,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,7	5,5	10,9	15,4	25,6	26,9	19,6	10,3	3,4	1,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	0,7	0,6	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,1	13,6	37,7	70,3	99,0	103,7	81,0	50,5	24,1	11,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,6	4,1	7,0	7,2	8,0	6,2	4,4	2,4	0,9	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,9	3,8	6,4	14,9	25,1	31,3	26,4	16,1	5,9	1,2
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,4	0,7	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	1,1	110,7	103,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	258,1	122,3	24,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,2	2,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	26,2	132,4	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	43,4	102,3	48,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	51,5	44,9	0,0	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	270,4	518,2	296,2	150,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	78,9	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	3,2	30,1	74,9	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	3,2	30,5	62,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	24,2	104,5	45,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	48,5	355,4	255,8	64,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	21,8	70,7	81,4	37,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	6,4	34,0	77,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	8,8	213,0	255,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	9,8	24,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	61,0	64,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	168,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	526,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	9,6
9	Castagneto da frutto	50,8
10	Cerreta mesofila	419,9
11	Cerreta mesoxerofila	1816,6
12	Faggeta altomontana rupestre	82,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	3007,9
14	Faggeta termofila e basso montana	972,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	171,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	273,2
18	Lecceta rupicola	105,7
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	283,1
21	Ostrieto mesofilo	202,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	528,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	137,1
26	Querceto a roverella pioniero	167,0
27	Querceto a roverella tipico	104,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	578,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	22,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	179,4
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	19,6	14,9	33,0	29,1	29,4	21,9	12,3	8,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	37,9	117,7	139,5	116,0	71,0	24,0	11,8	8,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,4	0,6	1,2	1,8	1,8	0,0	0,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	4,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4
9	Castagneto da frutto	0,0	22,5	12,3	0,6	0,0	0,1	0,0	12,6	2,7
10	Cerreta mesofila	0,0	160,9	97,0	31,5	9,7	3,6	5,4	97,8	13,9
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	181,7	267,8	349,0	260,8	234,7	178,6	163,8	180,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	5,3	12,1	12,8	16,6	20,5	8,7	3,5	3,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	502,8	441,4	552,4	474,5	254,5	156,9	412,7	212,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	127,1	127,6	140,9	177,1	133,9	89,7	111,7	64,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	42,6	30,7	39,0	18,0	15,3	6,0	14,7	5,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	7,4	37,9	53,5	47,6	65,5	41,9	1,9	17,4
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	5,4	19,5	26,2	35,0	16,1	0,1	3,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	5,1	21,6	51,9	69,1	76,5	36,7	5,2	17,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	67,9	42,7	23,3	13,1	8,5	3,0	33,6	10,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	47,7	99,4	87,8	56,3	64,8	64,4	44,2	63,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,5	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	18,2	22,1	18,0	17,5	15,4	14,5	14,9	16,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,6	10,4	27,3	29,0	40,1	40,0	2,9	15,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,8	6,0	19,0	34,5	34,5	0,1	9,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	29,2	81,1	108,3	90,8	84,2	97,6	15,0	72,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,4	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,9	0,2	0,9	2,0	5,3	6,7	0,5	5,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	10,4	13,0	34,1	25,3	22,7	23,8	22,1	28,1
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,9	12,6	24,1	29,0	33,3	27,5	20,1	10,3	4,4	2,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	5,5	43,2	121,5	123,6	97,9	65,2	37,2	18,8	8,7	4,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,2	0,3	0,7	1,6	1,4	1,2	0,5	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,1	1,7	3,7	3,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	2,0	11,0	13,6	10,6	5,5	4,0	2,5	1,0	0,6
10	Cerreta mesofila	1,1	7,8	32,8	61,1	75,6	78,6	72,4	49,6	27,9	13,0
11	Cerreta mesoxerofila	6,3	35,6	126,5	214,4	283,7	327,7	304,7	236,0	148,6	133,1
12	Faggeta altomontana rupestre	0,3	0,9	3,2	6,1	12,7	17,2	17,5	12,3	6,5	5,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	14,5	69,7	225,5	403,8	502,3	517,7	464,0	356,2	239,9	214,4
14	Faggeta termofila e basso montana	4,4	28,6	78,9	132,9	166,6	166,0	141,2	108,9	74,0	70,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8	10,0	35,3	44,6	33,6	24,2	13,9	6,6	1,8	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,4	1,8	5,4	12,5	26,8	43,2	53,9	51,8	40,8	36,5
18	Lecceta rupicola	0,0	0,7	1,9	3,9	7,2	11,8	16,8	18,6	16,4	28,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	1,2	4,7	14,2	27,7	44,0	57,9	50,4	39,5	22,2	21,2
21	Ostrieto mesofilo	1,3	6,6	17,9	31,8	40,0	40,1	31,0	18,9	8,6	5,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,8	6,5	18,6	39,4	65,6	92,2	105,6	91,0	62,6	45,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,3	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,6	15,0	16,2	16,7	16,9	18,4	16,3	12,0	8,0	8,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,1	7,6	13,0	23,3	32,1	31,8	25,8	16,8	9,2	6,3
27	Querceto a roverella tipico	0,1	2,4	6,7	11,3	17,6	22,1	19,4	14,5	6,6	3,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	2,0	9,7	31,4	68,7	106,6	124,4	107,9	69,4	36,3	21,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,1	0,7	1,2	0,7	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	0,9	2,6	3,0	4,1	4,1	3,3	2,2	1,2	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,9	9,9	19,1	27,3	34,1	32,9	26,0	16,0	7,7	3,5
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	11,1	120,8	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	178,7	252,9	86,8	2,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	2,6	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	27,1	22,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	44,5	238,4	134,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	1,6	223,6	947,7	552,2	86,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	47,7	25,4	2,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	318,9	759,7	1173,1	668,6	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	2,6	174,1	416,2	288,3	88,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	2,9	14,6	40,1	100,3	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	26,1	125,1	85,4	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,9	21,7	56,1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	11,9	52,4	159,1	54,9	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,2	14,8	128,1	53,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	42,6	279,2	169,1	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,1	47,5	50,8	31,2	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	38,8	50,4	73,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	17,6	40,4	43,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	35,5	188,4	334,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	1,0	11,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	1,4	69,9	85,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	168,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	208,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	19,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	25,9
12	Faggeta altomontana rupestre	60,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1133,0
14	Faggeta termofila e basso montana	145,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	1,6
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	50,6
21	Ostrieto mesofilo	93,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	324,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	44,0
26	Querceto a roverella pioniero	36,9
27	Querceto a roverella tipico	21,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	356,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	28,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	55,5
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	65,4	16,4	1,4	0,2	2,5	9,8	24,5	48,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	47,0	23,8	11,0	1,9	2,4	14,1	40,2	68,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	11,9	6,2	0,8	0,8	0,2	0,1	0,0	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	13,9	10,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	2,7	5,2	6,1	7,7	8,8	20,2	6,1	3,6
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	243,2	186,9	153,0	80,9	32,0	62,7	129,3	245,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	63,0	38,2	14,8	1,0	0,0	1,6	4,7	21,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,9	2,4	0,1	0,0	0,0	0,3	1,3	2,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	7,4	14,4	15,6	6,0	2,3	0,9	1,4	2,7
21	Ostrieto mesofilo	0,0	8,5	41,2	14,8	0,4	0,8	3,7	7,6	16,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	78,3	71,8	42,0	15,7	2,1	6,4	44,1	64,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	9,8	8,0	2,4	0,4	0,6	2,1	9,7	11,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	5,8	2,8	5,1	7,0	2,9	3,2	6,3	3,9
27	Querceto a roverella tipico	0,0	8,2	0,9	0,1	0,1	0,0	2,0	4,5	5,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	73,4	42,6	14,2	11,2	10,7	19,8	102,9	82,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	5,1	3,6	2,9	1,8	0,3	5,2	5,8	4,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	11,0	6,2	0,0	0,2	5,1	10,0	11,5	11,3
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,6	20,4	53,2	39,8	19,5	13,7	8,7	6,9	3,7	1,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	2,3	33,3	64,5	43,7	26,3	18,7	12,2	5,9	1,7	0,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	4,2	9,1	4,5	1,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	3,2	11,0	8,1	2,0	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,4	1,5	2,8	4,1	6,0	8,1	9,4	9,9	7,9	10,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	10,3	58,1	124,3	161,5	189,1	196,8	167,2	116,9	66,9	42,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	7,2	36,5	30,7	18,2	12,7	13,9	10,9	8,8	6,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,3	0,6	1,0	1,3	0,9	1,1	1,2	1,0	2,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,7
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	1,0	2,1	2,3	3,3	4,6	7,2	7,4	7,8	14,6
21	Ostrieto mesofilo	0,2	1,4	2,6	5,4	8,1	11,9	15,7	16,1	14,7	17,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,0	5,4	22,0	38,0	45,4	52,4	51,7	41,8	32,6	34,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,9	3,8	5,1	6,4	7,1	6,2	6,0	3,9	1,7	1,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	1,9	5,8	4,4	4,5	4,8	3,7	3,0	2,9	5,8
27	Querceto a roverella tipico	0,1	2,2	4,3	4,8	4,4	2,8	1,6	0,7	0,2	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	8,9	28,1	49,5	60,4	64,7	55,3	41,2	26,7	21,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	2,4	4,4	3,9	3,3	4,3	4,4	3,8	1,7	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	2,2	10,3	11,2	10,4	8,3	6,3	4,5	1,9	0,4
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	89,8	102,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	16,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	15,8	27,2	9,2	7,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	150,0	412,6	419,3	141,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	2,0	26,7	79,9	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,2	7,2	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	4,6	18,7	21,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	6,8	26,8	48,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	1,5	105,4	116,1	67,4	33,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	14,3	28,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	7,4	11,5	14,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	8,1	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,4	120,1	169,0	66,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	4,3	18,7	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	11,9	40,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	11,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	32,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	5,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	1,0	1,8	2,6	3,0	0,6	0,6	0,5	0,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,1	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	5,5	3,1	5,0	9,1	4,5	1,2	1,3	2,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,4	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,2	1,0	1,4	1,0	0,3	0,1	0,1	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,4	1,0	1,8	1,7	0,3	0,0	0,0	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,8	1,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	26,3	5,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,7	0,8	1,1	1,0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,7
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	39,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	91,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	3,5
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	145,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1616,6
14	Faggeta termofila e basso montana	394,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	393,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	34,7
21	Ostrieto mesofilo	366,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	90,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	480,2
26	Querceto a roverella pioniero	140,8
27	Querceto a roverella tipico	71,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	503,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	12,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	74,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	95,7
32	Robinieta-ailanteto	2,2
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	6,3	13,0	13,0	2,5	0,0	1,8	1,0	2,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	7,5	6,8	13,1	16,4	17,1	12,9	11,7	5,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,8	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	24,4	22,5	27,7	31,0	6,9	2,7	10,9	19,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	450,0	380,8	259,5	151,2	43,2	12,8	88,0	231,2
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	57,6	61,2	99,3	76,2	34,1	9,9	15,7	40,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	66,2	81,1	72,5	33,0	14,5	23,6	43,9	59,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	4,6	4,3	4,5	5,2	0,8	3,2	3,1	8,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	83,6	64,2	66,1	27,4	3,0	0,2	25,3	96,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	26,4	31,5	12,8	5,8	1,0	2,9	4,4	5,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	94,9	69,7	49,6	39,1	32,5	43,6	66,1	84,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	12,4	13,3	23,3	22,3	19,0	25,1	13,6	11,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,5	3,9	14,4	18,0	5,3	7,5	10,2	7,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	110,6	76,1	77,7	63,4	16,6	25,9	45,4	87,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,7	0,2	1,2	1,0	0,2	0,2	1,8	5,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	17,5	16,5	4,6	1,7	2,8	6,4	14,6	10,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	19,8	26,2	26,9	8,4	2,9	0,1	0,8	10,6
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	1,4	0,0	0,0	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,4	2,6	8,8	12,9	9,1	5,5	0,4	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,0	5,6	15,3	22,6	21,3	14,1	6,7	2,3	1,3	0,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1,0	1,0	0,4	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	1,3	4,0	7,6	13,9	19,2	21,6	19,8	57,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,9	22,0	97,0	191,1	249,9	278,9	255,4	217,4	146,0	157,2
14	Faggeta termofila e basso montana	1,5	23,7	50,6	61,0	65,9	62,0	49,5	36,4	22,8	20,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,3	48,4	79,1	103,0	80,4	46,1	20,6	7,2	2,5	1,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,3	2,5	4,7	6,5	6,6	5,0	2,7	2,0	2,1	2,2
21	Ostrieto mesofilo	3,7	27,2	65,6	83,5	74,2	51,7	30,6	15,2	7,8	6,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,5	3,5	13,0	23,0	21,9	13,3	6,8	4,2	2,6	1,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	0,9	0,6	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	22,7	57,6	83,2	96,9	87,8	62,7	38,7	18,6	7,9	4,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,8	10,3	24,5	32,7	28,5	20,8	12,6	5,9	2,5	1,2
27	Querceto a roverella tipico	2,0	5,4	12,3	15,4	14,9	11,1	5,6	2,9	1,3	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,9	28,3	82,7	120,0	107,9	78,7	45,3	22,7	8,3	4,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,8	2,2	3,7	2,8	1,9	0,8	0,3	0,1	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,3	3,3	10,5	18,3	18,0	13,8	5,9	3,1	0,8	0,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,6	7,0	16,9	23,7	22,8	13,8	6,9	3,2	0,8	0,1
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,3	0,2	0,4	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	7,7	6,0	12,7	10,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	6,9	20,6	37,9	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	11,2	53,9	52,1	23,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	5,9	168,9	560,8	500,8	272,0	106,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	31,2	211,1	143,1	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	28,3	84,4	131,7	140,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,7	19,2	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	24,1	191,6	137,6	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	23,9	47,6	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	160,1	228,6	81,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,6	31,9	80,2	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	48,2	22,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	37,8	201,7	166,7	88,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,7	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	23,2	38,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	15,6	55,0	21,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,9	0,2	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,9
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	15,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,8	3,2	2,0	0,7	0,0	0,1	0,0	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,6	0,6	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,7	1,9	1,7	2,5	1,9	0,3	0,2	1,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,1	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,4	0,7	1,1	1,2	1,1	0,9	0,5	0,6	0,3	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,1	5,8	2,6	2,1	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,1	0,5	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	132,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	95,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	85,6
26	Querceto a roverella pioniero	17,8
27	Querceto a roverella tipico	42,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	8,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	11,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	8,4
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	13,2	7,4	14,3	20,3	15,6	20,8	21,4	19,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	16,9	14,2	14,0	6,5	10,5	9,5	8,5	15,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	15,3	9,1	6,6	7,8	9,6	11,5	10,9	14,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,8	2,5	0,7	0,6	1,5	2,6	2,7	3,3
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,5	3,1	3,9	12,1	7,4	3,6	3,5	3,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,8	0,0	0,0	0,2	2,4	0,4	1,3	2,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,1	0,7	3,9	0,7	0,7	1,5	0,6	1,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,9	1,9	1,2	0,5	0,5	0,8	1,1	1,5
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,5	8,3	12,1	17,5	28,4	28,8	21,1	9,6	2,5	1,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2	3,8	9,6	17,8	23,3	19,4	11,8	5,2	1,7	1,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	19,1	12,3	9,1	10,3	10,1	7,8	5,8	4,0	3,2	3,9
26	Querceto a roverella pioniero	1,8	0,3	0,8	2,4	4,3	3,6	2,5	1,4	0,5	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,7	1,7	5,3	7,7	8,0	7,0	5,2	3,1	1,9	1,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	0,3	1,0	1,5	1,6	1,6	1,4	0,8	0,3	0,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,2	1,3	2,7	3,2	2,4	0,9	0,2	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	0,4	0,7	1,5	1,9	1,8	1,2	0,6	0,2	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	10,6	121,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,4	82,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	45,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	2,1	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	7,6	32,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,3	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	24,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	88,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	68,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	15,9
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	1,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	51,2
14	Faggeta termofila e basso montana	53,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	129,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	73,7
18	Lecceta rupicola	22,3
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	27,4
21	Ostrieto mesofilo	72,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	373,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,6
25	Pioppo-saliceto ripariale	456,9
26	Querceto a roverella pioniero	248,6
27	Querceto a roverella tipico	143,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	446,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	58,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	6,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	35,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	4,3	1,3	0,4	0,1	0,0	0,4	5,6	12,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	21,7	17,4	7,9	0,7	0,0	0,6	10,3	30,1
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	6,1	10,1	7,7	11,7	13,8	8,8	5,2	5,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,5	3,9	2,1	0,0	0,3	3,2	4,4	1,6
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	9,6	7,3	2,5	0,2	0,0	0,6	13,4	17,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	8,8	3,8	1,6	0,2	0,0	0,4	17,5	20,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	25,3	24,3	10,3	5,2	10,7	8,4	18,7	26,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,4	5,8	14,5	13,3	19,6	18,9	1,2	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,2	2,4	11,6	6,1	2,0	0,1	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,8	4,0	7,6	3,1	0,1	2,0	3,3	5,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	11,0	7,5	4,1	0,2	0,1	2,5	28,2	19,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	50,2	35,1	48,1	73,4	54,6	24,1	40,0	47,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	81,1	72,9	41,9	34,7	40,1	42,8	76,8	66,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	19,3	25,8	31,1	61,2	58,3	26,6	16,2	10,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	13,0	12,3	9,9	27,8	18,3	16,6	26,6	19,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	49,4	77,5	61,5	39,5	27,8	33,5	84,6	72,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,7	1,2	4,8	13,9	24,6	10,8	0,7	1,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5	0,4	1,7	1,5	1,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinietao-aillanteto	0,0	8,1	5,1	3,4	2,2	2,3	3,0	3,8	7,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,2	8,8	10,1	2,9	1,4	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,7	17,5	33,0	21,6	9,0	4,0	1,8	0,3	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,0	1,8	6,7	14,8	18,4	13,6	7,1	3,4	1,2	0,9
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	0,5	1,9	3,1	3,2	2,5	1,8	1,6	0,8	0,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,4	4,0	11,8	10,9	9,6	7,3	4,7	2,0	0,5	0,1
14	Faggeta termofila e basso montana	0,1	2,5	8,6	10,1	10,2	9,9	6,8	3,3	1,1	0,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,8	4,6	15,7	30,2	32,1	22,4	12,1	5,3	1,9	0,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,4	1,7	4,4	9,9	15,7	16,7	13,4	7,4	4,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,4	1,6	2,5	3,5	3,7	4,2	3,1	3,3
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,4	4,4	5,3	5,6	4,9	3,6	1,5	0,5	0,2
21	Ostrieto mesofilo	0,5	1,7	4,0	8,9	14,2	15,0	13,0	8,0	4,4	2,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,0	8,9	28,4	46,8	65,0	74,9	63,2	44,6	24,8	14,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	71,8	41,8	52,5	67,6	71,1	61,2	44,9	26,1	12,6	7,5
26	Querceto a roverella pioniero	2,9	12,6	30,0	47,0	51,4	43,7	31,0	17,0	7,6	5,4
27	Querceto a roverella tipico	1,4	7,0	16,6	25,5	31,4	26,8	17,9	10,4	4,7	1,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	3,8	17,2	49,6	74,5	89,0	84,4	66,5	37,4	16,8	7,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,4	1,4	2,6	7,0	9,1	11,4	10,9	7,5	4,7	3,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,5	1,0	1,2	1,1	0,6	0,6	0,9	0,5	0,2	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinietao-ailanteto	0,9	2,2	4,2	6,0	6,8	7,2	4,3	2,4	0,7	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	54,8	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,3	42,0	14,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	13,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	42,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,1	5,6	37,4	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,1	76,2	46,8	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	11,2	50,4	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	5,3	13,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,7	7,3	7,3	10,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	9,4	57,5	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	14,3	141,7	151,2	65,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	39,9	312,9	82,6	18,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	67,2	78,6	81,3	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,3	43,3	54,1	28,6	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,9	58,8	187,9	144,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	22,4	32,1	2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	4,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,0	32,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	3,6
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	25,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	94,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2	1,0	0,2	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9	0,6	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	2,2	1,9	2,2	4,7	5,6	5,3	1,7	1,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,5	12,6	16,0	14,5	11,5	14,1	12,9	9,5	2,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,8	2,0	0,7	0,1	0,0	0,7	0,6	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,5	0,9	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,4	0,8	0,1	1,5	1,0	0,3	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,5	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	1,1	0,6	0,3	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,2	2,2	1,4	1,8	3,5	3,7	2,0	0,6	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	41,9	22,6	12,8	7,9	4,8	2,8	1,4	0,4	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,5	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,5	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	1,2	1,3	0,9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	24,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	94,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	35,3
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	153,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	11,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,9	1,3	0,3	0,6	0,0	0,6	0,2	0,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,2	0,5	1,2	0,7	1,0	1,7	1,6	2,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,3	0,2	0,3	1,9	6,6	12,2	8,0	5,7
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	3,9	2,1	0,5	0,7	1,5	5,3	4,1	2,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,5	22,2	15,9	8,9	12,1	22,9	28,5	24,1	18,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	1,5	0,7	1,0	0,8	1,1	3,6	1,8	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	1,5	1,2	0,9	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,3	0,8	0,8	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,9	2,6	2,3	1,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,6	0,7	1,7	1,9	1,7	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,7	1,5	2,3	4,6	9,7	8,6	5,3	2,2	0,4	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,5	0,8	3,0	4,3	4,9	3,4	1,4	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	55,2	31,6	19,3	17,4	15,1	9,5	4,2	0,8	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,1	1,9	1,5	1,4	2,0	1,8	1,1	0,5	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	0,6	1,0	1,3	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	1,1	0,1	0,3	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	7,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	35,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	19,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	149,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,5	3,1	1,5	1,9	4,7	3,6	5,3	2,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,1	5,6	2,6	2,7	2,0	1,1	0,7	0,4	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,6	0,6	0,8	1,4	1,3	0,7	0,4	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	9,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	61,2
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	47,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	148,4
26	Querceto a roverella pioniero	1,0
27	Querceto a roverella tipico	40,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	8,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	14,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,2	0,1	0,2	0,9	1,3	1,5	2,5	1,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	3,0	1,3	0,9	0,9	4,2	21,9	18,5	10,5
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	7,5	2,2	1,9	3,4	5,6	3,8	8,5	14,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,9	18,5	12,2	12,4	17,7	20,2	23,4	26,5	16,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,2	6,7	1,3	1,9	3,6	5,9	6,5	9,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,5	0,3	0,1	0,5	2,9	1,9	1,7	0,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	1,0	3,8	3,6	0,2	0,3	2,7	1,3	1,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	0,4	0,7	1,1	1,5	1,6	1,3	0,8	0,6	1,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,2	2,8	4,1	6,7	10,2	13,2	11,2	7,4	2,9	1,4
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,9	2,7	4,6	9,0	11,1	9,3	4,8	1,6	0,8	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	52,4	28,7	19,4	15,6	12,9	9,2	5,8	2,1	1,1	1,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,6	2,9	3,5	5,2	6,8	7,0	6,0	3,6	2,2	1,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,7	0,7	1,0	1,3	1,4	1,3	0,8	0,6	0,2	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,6	1,4	1,8	2,5	3,4	2,5	1,4	0,4	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	40,7	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	28,5	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	140,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	18,1	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	6,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	11,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	32,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	84,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	9,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	83,2
26	Querceto a roverella pioniero	20,1
27	Querceto a roverella tipico	49,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	57,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	9,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	36,5
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,5	1,8	1,4	0,0	0,1	1,6	0,3	0,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	3,4	1,1	0,0	0,8	8,6	11,4	2,9	4,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	18,5	16,5	2,3	1,0	3,3	9,3	13,0	20,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	2,0	4,7	0,8	0,0	0,1	0,1	0,2	1,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	13,4	11,6	4,2	2,1	5,1	13,1	16,0	17,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,2	2,8	0,4	0,2	4,3	5,4	3,3	2,5
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,5	8,3	1,6	1,6	2,5	4,4	13,8	11,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	11,5	11,6	1,8	2,4	3,5	8,3	7,6	10,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	2,5	3,1	1,4	1,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	4,3	4,1	0,3	0,4	2,4	4,6	10,1	10,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,4	1,8	2,2	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,4	2,6	5,5	8,9	6,9	4,6	2,4	0,8	0,2	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,9	7,5	19,5	20,7	15,2	11,2	5,8	2,5	0,8	0,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,6	2,0	2,7	1,8	1,1	0,6	0,2	0,1	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,6	9,8	17,0	16,1	12,6	8,0	4,5	2,0	0,6	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,9	0,4	2,6	4,7	5,5	3,7	1,5	0,7	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,6	1,8	7,3	10,9	11,1	9,0	5,2	2,2	0,9	0,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,2	3,3	11,7	13,3	12,3	8,9	4,9	2,0	0,5	0,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,2	1,2	2,6	2,8	1,2	0,6	0,5	0,2	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,7	2,3	6,4	8,7	7,8	5,3	3,3	1,4	0,5	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	30,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,9	52,4	29,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	28,2	40,7	14,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,0	9,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	4,4	36,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	10,8	42,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	8,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	9,9	19,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	2,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	289,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	15,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	56,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1249,9
14	Faggeta termofila e basso montana	201,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	57,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	1,5
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,6
21	Ostrieto mesofilo	88,9
22	Ostrieto mesoxerofilo	57,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	2,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	29,1
26	Querceto a roverella pioniero	28,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	280,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	9,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	54,7
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,2	62,4	39,6	59,9	41,6	13,2	9,2	24,7	38,7
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	6,0	1,0	0,7	1,4	1,7	0,3	1,1	3,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	7,6	4,8	20,0	9,7	5,8	2,8	2,4	3,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,7	199,3	203,8	132,9	14,4	7,7	31,0	306,2	353,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	51,5	27,6	14,2	7,8	3,8	0,5	21,3	74,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	16,2	4,4	0,3	0,1	0,1	0,6	12,1	23,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,1	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	11,1	8,2	12,3	0,6	0,1	1,8	25,3	29,6
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	4,1	25,5	23,1	2,3	0,0	0,1	1,0	1,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	5,7	2,5	0,4	0,2	0,9	2,5	7,5	9,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	11,4	1,1	1,7	3,2	3,2	1,1	1,4	5,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	63,9	54,9	8,6	9,9	7,7	29,2	50,2	56,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,5	3,7	3,4	0,5	0,1	0,1	0,0	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	14,9	6,0	1,4	0,9	0,7	4,5	8,4	17,8
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,4	1,3	0,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	18,9	80,8	71,8	48,8	31,7	18,0	10,9	5,1	2,5	0,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	2,5	3,7	4,1	3,0	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,2	1,5	5,9	9,5	10,0	10,5	8,0	5,5	2,9	2,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	35,4	123,1	181,6	219,3	226,3	193,9	137,8	83,0	32,7	16,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,8	8,9	25,3	37,6	41,4	34,7	24,8	15,6	8,3	3,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8	6,5	14,3	13,2	10,9	5,7	3,5	1,6	0,6	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,2
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,1	0,8	2,3	5,7	9,3	16,0	18,2	17,9	11,3	7,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,4	2,2	4,0	6,5	8,7	10,9	10,2	7,1	4,9	2,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,8	0,2	0,1	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	1,0	2,6	4,6	5,4	4,8	4,3	3,1	1,7	1,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	2,6	7,9	4,9	2,7	2,1	2,0	1,9	1,0	2,8
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	4,2	15,8	41,8	57,2	57,3	47,9	31,3	16,3	7,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,8	1,9	1,7	1,7	1,2	0,9	0,5	0,3	0,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,6	14,0	14,8	8,4	6,2	5,1	3,0	1,2	0,3	0,1
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	71,3	189,1	5,7	5,8	12,0	1,3	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	5,3	7,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	19,3	31,5	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	164,9	552,3	404,0	105,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,4	28,6	104,7	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	5,5	19,4	19,6	12,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	25,6	29,5	14,2	19,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	1,9	11,9	33,8	9,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	2,7	9,8	8,7	7,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,8	5,6	20,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	6,8	104,6	154,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	22,5	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	3,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	32,1
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	40,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	70,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	27,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	6,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	2,4	1,6	1,2	1,0	1,2	0,7	0,1	0,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	3,1	3,2	4,0	2,7	2,7	4,2	6,6	5,5
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	6,3	6,8	5,2	3,1	3,3	3,9	6,1	6,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,8	18,6	8,9	6,6	7,5	7,9	5,2	4,7	10,4
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,7	0,7	2,9	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,7	2,8	14,4	4,1	0,7	0,5	0,5	0,8	2,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,3	1,6	1,1	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	1,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,5	1,3	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,7	0,3	0,6	1,4	1,7	1,4	0,8	0,3	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,3	0,8	1,4	4,2	6,3	8,2	6,4	3,3	1,0	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,1	4,9	5,8	7,8	8,3	6,2	3,4	1,1	0,2	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	27,2	15,3	11,4	7,5	5,2	2,6	1,0	0,2	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,4	1,1	1,2	1,0	0,6	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	18,5	1,9	2,1	2,8	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	4,8	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	28,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	39,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	6,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	71,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	172,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	18,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	50,5
9	Castagneto da frutto	9,4
10	Cerreta mesofila	175,0
11	Cerreta mesoxerofila	901,9
12	Faggeta altomontana rupestre	168,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1538,8
14	Faggeta termofila e basso montana	368,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	63,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	50,4
21	Ostrieto mesofilo	11,2
22	Ostrieto mesoxerofilo	217,9
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	122,5
26	Querceto a roverella pioniero	63,4
27	Querceto a roverella tipico	13,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	312,9
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	108,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	27,4
32	Robinieta-ailanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	6,0	5,6	8,6	15,9	9,5	10,7	9,9	4,9
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	1,2	9,0	34,2	55,1	30,6	22,7	16,4	2,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	1,2	4,3	6,5	4,9	0,6	0,6	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,5	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	13,3	7,9	3,7	1,8	0,6	0,8	12,9	9,6
9	Castagneto da frutto	0,0	4,5	1,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,7	2,6
10	Cerreta mesofila	0,0	18,5	13,4	21,0	31,7	22,0	28,3	25,6	14,6
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	66,0	110,8	165,5	91,0	93,1	135,6	168,5	71,5
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	8,5	7,4	20,8	35,4	21,2	35,1	29,4	10,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	259,1	313,3	224,4	150,9	60,3	117,2	199,2	214,4
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	49,3	66,9	65,8	64,8	26,7	32,7	30,1	31,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	2,7	7,8	8,7	7,1	6,8	9,3	12,7	8,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,4	4,5	7,8	14,3	11,4	6,6	3,5	0,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,6	0,4	1,5	5,3	2,0	0,6	0,0	0,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	5,3	21,3	48,3	48,2	31,0	36,8	23,3	3,6
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	8,5	8,3	11,1	10,9	17,5	22,8	26,6	16,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,2	8,4	21,4	23,6	6,6	2,9	0,2
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,1	0,3	1,3	8,3	2,9	0,8	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	2,3	4,7	38,2	70,3	88,1	57,3	40,8	11,1
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,3	7,1	16,1	15,4	16,1	24,6	26,1	3,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	3,2	1,8	1,9	1,8	3,6	9,5	3,5	2,0
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,3	2,3	9,0	13,9	15,8	12,9	10,6	4,3	1,7	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,3	4,0	15,5	27,4	33,0	32,7	29,2	18,9	8,7	2,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,4	1,6	2,9	4,2	3,4	2,7	2,1	0,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,1	1,8	6,5	10,6	11,2	10,0	6,2	2,7	1,3	0,3
9	Castagneto da frutto	0,0	0,2	1,0	1,4	1,8	1,8	1,4	1,0	0,5	0,3
10	Cerreta mesofila	0,8	3,9	10,6	22,6	32,7	37,7	33,1	22,2	8,7	2,8
11	Cerreta mesoxerofila	4,3	23,1	86,2	148,7	178,6	172,8	138,2	91,1	42,5	16,4
12	Faggeta altomontana rupestre	1,0	3,8	13,4	26,3	31,5	31,9	27,5	18,9	9,1	4,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	6,0	30,6	88,3	182,1	271,9	313,7	282,5	198,6	109,5	55,5
14	Faggeta termofila e basso montana	2,4	11,2	28,8	51,1	68,5	71,7	58,9	42,6	21,4	11,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	3,4	9,7	13,9	14,0	9,8	7,0	3,9	1,6	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,2	1,2	3,7	6,2	7,9	9,9	9,4	6,5	3,6	1,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,5	0,9	1,2	2,3	2,1	1,6	1,7	0,7
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,9	5,0	13,4	24,7	38,7	46,3	41,2	28,3	12,9	5,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,1	12,5	21,9	23,6	21,0	16,9	11,0	6,5	3,0	1,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,8	3,4	7,1	12,5	14,0	12,6	8,0	3,7	1,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,2	0,8	1,6	3,0	3,1	2,7	1,7	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1,2	5,9	22,2	39,8	53,6	62,1	56,9	39,7	22,0	9,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,6	1,8	7,4	15,7	22,7	22,5	18,0	11,9	6,4	1,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	2,8	4,1	4,1	3,7	4,0	4,1	2,8	1,4	0,3	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,4	41,5	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,3	25,3	100,9	34,2	6,0	3,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	14,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	14,7	92,8	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	45,5	561,3	292,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	75,8	73,2	9,3	6,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	309,4	562,2	358,1	292,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2	252,7	20,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	7,1	23,0	18,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,9	60,3	125,5	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	0,0	0,6	38,0	76,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	15,3	38,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	5,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,1	80,7	159,8	71,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	50,5	55,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	4,1	13,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	27,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	9,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	22,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	146,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,7
27	Querceto a roverella tipico	10,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	11,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	11,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,4	0,7	0,8	2,1	1,6	0,3	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	3,7	5,1	6,1	3,6	1,4	1,2	1,9	4,2
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	0,1	0,2	1,1	1,3	3,0	2,8	0,3
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,2	2,7	3,6	1,3	1,2	1,1	1,1	7,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,8	22,8	15,1	13,0	25,6	19,4	10,6	12,5	26,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,2	0,4	1,2	1,3	1,3	1,3	3,5	0,7	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	1,2	1,5	2,1	1,5	1,5	2,4	0,8	0,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,3	0,9	2,1	0,6	1,8	2,2	1,0	0,6	1,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	0,2	0,8	1,4	1,6	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6,6	4,3	4,8	5,3	4,1	1,7	0,5	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,1	0,5	0,9	1,0	1,8	2,0	1,5	0,8	0,4	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,6	1,3	2,6	4,3	6,4	5,1	1,4	0,1	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	80,2	27,3	15,8	10,9	7,7	3,5	1,1	0,1	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	4,4	1,6	1,6	1,3	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,9	0,9	1,0	1,1	0,8	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	5,4	2,0	1,7	0,9	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	13,7
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	10,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	83,9
26	Querceto a roverella pioniero	5,3
27	Querceto a roverella tipico	12,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	14,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	2,3	1,3	1,9	0,4	0,4	0,4	1,4	5,6
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	1,2	0,9	3,3	7,6	3,5	0,8	0,1	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	4,0	0,2	0,4	1,7	0,1	0,0	0,0	3,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	13,3	8,7	9,8	14,6	13,6	8,3	6,2	9,3
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,1	0,1	1,3	1,2	1,8	0,6	0,1	0,1
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,7	1,2	0,5	0,4	0,7	0,9	1,7	2,3
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	1,0	0,5	3,6	7,7	1,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,4	1,3	1,7	2,9	3,3	2,8	1,3	0,2	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	3,7	1,7	1,6	2,5	2,6	2,5	1,6	0,9	0,5	0,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	0,4	0,4	1,1	2,6	2,7	1,7	0,5	0,5	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,1	20,9	8,8	5,4	4,2	3,0	2,4	1,8	1,1	1,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,2	1,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	1,1	0,6	0,5	0,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,5	0,8	1,7	2,6	3,1	2,0	1,4	0,9	0,7	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	10,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,6	14,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	35,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	6,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,6	10,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,7
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	11,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	112,4
26	Querceto a roverella pioniero	1,1
27	Querceto a roverella tipico	14,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,8
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillateto	8,9
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	2,5	2,4	0,0	0,4	1,9	0,6	0,1	1,7
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,3	2,0	5,4	1,6	0,1	0,1	0,6	0,2	1,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	27,2	15,7	10,3	12,7	15,7	9,3	8,8	12,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,7	6,5	1,3	0,4	0,2	0,4	0,4	2,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	1,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,2	0,4	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,2	1,5	1,1	0,8	0,7	0,9	2,1	0,9	0,8
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	0,3	1,6	2,8	2,9	1,2	0,2	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	0,1	0,4	0,7	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,8	0,9	1,3	1,8	2,6	2,1	1,3	0,4	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	58,8	29,2	10,3	5,7	3,9	2,8	1,0	0,3	0,2	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,4	1,3	2,2	2,3	2,8	2,5	1,6	0,5	0,2	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,3	0,2	0,2	0,5	1,2	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,1	0,1	0,3	1,0	1,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	3,5	1,2	1,0	1,2	0,7	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	13,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	8,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	13,1
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,9
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	20,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	68,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,9
27	Querceto a roverella tipico	16,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	13,7
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3	0,5	0,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	1,6	2,0	1,5	1,3	2,0	2,1	2,0	0,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	1,2	0,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	4,5	2,4	0,7	1,8	3,3	3,5	2,2	2,4
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	9,7	8,5	5,2	7,4	12,0	9,7	9,1	6,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,8	2,6	0,9	2,1	2,4	1,5	1,5	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,2	2,5	1,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-aillanteto	0,0	3,9	4,7	1,8	0,6	0,9	1,3	0,4	0,2
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	5,6	2,4	1,3	1,5	1,1	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,5	1,5	2,9	4,2	4,0	3,2	1,6	0,7	0,1	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,3	15,9	10,7	7,4	5,6	2,8	1,2	0,4	0,2	0,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,3	1,9	2,8	2,3	2,2	2,5	2,1	1,2	0,8	0,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,5	1,1	2,5	3,3	2,9	2,1	1,1	0,2	0,1	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	17,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	12,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	12,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	49,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	106,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	9,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	91,2
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	2,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	52,1
14	Faggeta termofila e basso montana	39,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	380,3
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	2,3
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	8,5
21	Ostrieto mesofilo	18,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	406,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1378,3
26	Querceto a roverella pioniero	358,2
27	Querceto a roverella tipico	129,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	739,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	24,3
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	9,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	25,2
32	Robinieta-aillanteto	71,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	5,3	8,0	7,0	4,0	5,3	8,4	7,8	4,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,4	6,1	16,1	25,5	29,9	22,5	3,5	1,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,2	1,6	1,2	0,8	1,4	2,3	1,1	0,0	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	4,0	3,5	11,1	20,8	24,3	13,5	5,1	8,9
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	23,5	16,8	3,4	0,3	0,0	0,1	0,5	7,5
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	10,7	5,8	11,4	5,4	2,2	0,3	0,5	3,8
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	57,5	54,2	40,2	35,9	40,9	36,8	54,8	60,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,8	0,9	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	1,6	0,3	0,8	1,3	3,3	0,6	0,1	0,4
21	Ostrieto mesofilo	0,0	10,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	6,3
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	143,7	104,9	21,5	14,4	18,8	13,4	24,0	66,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	1,6	217,9	196,1	141,0	139,3	175,9	174,2	154,5	177,8
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	7,8	19,9	82,3	95,6	81,5	53,9	13,6	3,6
27	Querceto a roverella tipico	0,0	5,1	9,0	24,6	34,8	24,7	12,9	10,4	7,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	62,0	110,5	119,1	99,6	130,7	109,5	55,4	52,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,4	1,4	1,1	3,0	5,0	1,6	3,5	5,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,4	0,8	0,1	0,1	0,4	0,2	0,3	3,4
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	1,2	0,2	0,5	11,0	11,6	0,2	0,0	0,5
32	Robinetto-aillanteto	0,0	12,7	20,9	9,3	6,6	4,3	5,5	5,0	6,9
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,3	1,4	5,6	10,4	12,7	9,7	6,5	2,5	0,6	0,1
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1,6	4,5	11,9	21,9	25,9	20,5	12,8	5,7	1,4	0,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,7	0,5	2,0	2,7	2,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,5	3,3	7,0	13,1	19,6	21,1	14,5	7,5	2,5	1,1
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	0,7	0,2	0,1	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	0,4	1,8	5,2	11,5	13,1	10,6	6,5	2,3	0,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,5	2,7	4,8	7,3	8,6	7,0	5,0	2,5	1,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	6,8	22,8	56,2	82,5	90,7	67,0	35,2	14,2	4,1	0,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,7	0,5	0,1	0,1	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,5	0,9	1,3	1,6	1,4	1,4	0,7	0,4	0,3
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,9	2,3	3,5	3,9	6,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	1,7	9,8	33,3	57,5	70,5	75,6	65,4	46,3	26,5	20,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	239,1	190,3	203,5	216,8	194,3	150,5	91,8	50,5	24,9	16,7
26	Querceto a roverella pioniero	5,7	13,6	39,0	71,2	81,8	71,0	44,4	21,5	7,6	2,4
27	Querceto a roverella tipico	1,8	5,1	17,3	27,4	30,8	23,4	14,0	6,5	2,3	0,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,3	26,8	83,8	141,1	161,8	143,4	97,6	50,9	21,2	7,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,3	1,3	3,1	5,8	5,7	4,8	2,4	0,8	0,1	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,3	0,6	1,6	2,3	2,0	1,4	1,0	0,3	0,2
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,6	2,3	5,3	6,3	5,4	2,9	1,9	0,5	0,1
32	Robinieta-ailanteto	4,5	4,6	8,2	12,5	13,6	11,1	7,9	3,9	2,3	2,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	22,2	17,5	1,8	6,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	5,1	52,2	43,5	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,5	3,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	11,9	73,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	46,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	33,1	239,5	101,4	6,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	2,3	1,4	4,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	1,0	12,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	8,0	230,1	142,2	22,8	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	356,7	737,1	264,5	19,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	12,5	179,1	128,7	25,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	19,6	93,3	15,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,7	178,3	388,1	139,1	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,2	15,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	4,2	4,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,2	9,0	15,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	11,5	21,8	37,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1,4
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	26,6
26	Querceto a roverella pioniero	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,1	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1	0,5	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	2,6	3,5	2,0	2,1	4,8	4,9	4,8	1,9
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	6,4	8,7	5,2	3,0	1,8	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	24,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	16,4
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	230,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	24,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	4,6
9	Castagneto da frutto	2,7
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	244,0
12	Faggeta altomontana rupestre	79,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	205,6
14	Faggeta termofila e basso montana	43,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	64,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	69,5
21	Ostrieto mesofilo	3,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	567,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	9,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	232,9
26	Querceto a roverella pioniero	195,8
27	Querceto a roverella tipico	21,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1035,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	19,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	20,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	92,8
32	Robinieta-ailanteto	15,1
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	1,0	2,2	2,2	4,9	3,5	1,2	1,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,8	1,5	13,3	35,8	48,3	77,2	46,1	6,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,5	1,3	2,4	8,5	6,9	2,7	1,2	0,6
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	1,4	0,5	1,1	0,7	0,2	0,1	0,0	0,5
9	Castagneto da frutto	0,0	1,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	40,5	23,9	26,4	19,8	21,3	34,6	34,8	42,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,3	1,8	21,7	27,9	8,6	9,7	8,8	1,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,1	21,9	54,8	66,0	25,0	2,6	3,8	24,6	6,7
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	2,5	5,2	4,5	2,0	3,2	3,5	13,6	8,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	10,9	7,7	6,9	7,2	7,9	5,0	7,4	11,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,2	5,3	11,1	18,2	12,3	12,9	8,1	1,5
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,1	0,8	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	103,9	124,7	88,6	51,8	31,4	31,9	60,2	74,7
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	2,5	2,8	0,8	0,0	0,2	0,5	0,9	1,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	29,7	25,3	21,8	20,4	36,0	38,2	32,8	28,7
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,1	3,8	17,7	53,9	54,4	45,4	16,0	3,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	3,9	4,1	2,8	3,4	6,2	1,2	0,0	0,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	24,2	63,3	137,2	197,5	237,4	218,5	113,2	44,4
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,7	0,5	2,5	4,9	1,3	0,5	3,8	5,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	4,0	2,2	3,7	2,7	1,0	1,3	2,0	3,6
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	2,5	14,9	51,5	22,5	1,2	0,0	0,1	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,0	2,3	2,6	1,4	1,6	1,7	0,7	1,2	3,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,1	0,8	2,1	3,7	3,7	3,0	1,7	0,9	0,2	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	1,4	6,7	28,7	49,1	53,4	39,0	25,0	13,6	7,6	5,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,1	1,4	3,8	5,0	5,1	4,6	2,7	1,0	0,4	0,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,2	0,8	1,2	1,0	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,2	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	2,5	9,9	24,2	37,1	46,0	42,1	34,1	24,2	14,7	9,3
12	Faggeta altomontana rupestre	0,7	1,6	4,6	9,6	12,3	12,1	11,2	10,7	8,9	8,1
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,8	6,1	15,5	30,4	42,1	42,8	32,6	19,9	10,1	4,3
14	Faggeta termofila e basso montana	0,3	0,8	2,2	4,8	8,0	8,4	7,5	5,5	3,6	1,9
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,6	3,0	7,5	11,9	15,2	12,2	8,0	4,2	1,0	0,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	2,4	7,7	10,8	13,0	13,9	11,7	6,4	2,5	0,9
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,1	0,2	1,0	1,0	0,7	0,4	0,1	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,9	12,5	30,6	57,2	80,2	97,5	100,6	82,7	55,6	47,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,1	0,4	0,9	1,4	1,2	1,5	1,2	1,0	0,7	0,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	8,2	21,5	36,3	42,3	40,6	33,3	22,7	13,6	7,8	6,5
26	Querceto a roverella pioniero	2,0	7,8	27,2	41,9	43,8	34,4	23,0	10,5	4,0	1,1
27	Querceto a roverella tipico	0,1	0,8	2,1	3,8	4,6	3,6	2,5	1,8	1,4	1,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	6,5	32,4	92,6	164,8	200,9	201,0	156,1	103,8	52,1	25,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	1,2	3,3	4,6	4,0	2,1	1,6	1,5	1,0	0,5	0,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,1	0,2	1,2	3,7	5,6	5,4	3,0	1,1	0,3	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,3	4,2	13,5	22,0	20,9	16,9	8,6	4,3	1,5	0,4
32	Robinieta-aillanteto	0,3	0,7	1,5	2,7	2,9	2,9	2,3	1,3	0,5	0,1
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	82,8	123,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	1,0	12,5	8,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	69,4	154,7	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	42,4	31,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	69,2	126,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	15,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,4	21,7	23,2	18,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	5,3	10,9	9,1	35,2	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	9,2	86,3	277,3	154,2	34,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,5	7,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	30,8	137,2	48,2	14,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	2,4	53,0	68,0	51,6	20,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,7	14,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	10,8	195,3	388,7	407,4	33,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	7,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	5,3	10,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	31,4	60,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	3,5	10,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	5,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	39,2
26	Querceto a roverella pioniero	1,3
27	Querceto a roverella tipico	1,9
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0
32	Robinieta-aillanteto	2,6
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,3
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,8	1,5	0,1	0,1	0,4	2,5	0,0	0,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,1	4,5	4,8	3,0	3,4	10,6	7,8	3,8	1,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,7
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,0	0,3	0,7	0,1	0,0	0,5	1,3	0,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinetto-aillanteto	0,0	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,1	0,6	0,3	0,3	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,4	0,5	0,5	1,4	1,7	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	15,9	12,5	4,7	2,9	1,5	0,9	0,4	0,3	0,1	0,1
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,4	0,7	0,9	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,1	0,5	0,9	0,4	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robiniato-ailanteto	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	30,8
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	12,8
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	17,5
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	2,5
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	37,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	215,0
14	Faggeta termofila e basso montana	160,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	97,2
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	8,6
21	Ostrieto mesofilo	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	190,5
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	1,7
25	Pioppo-saliceto ripariale	218,7
26	Querceto a roverella pioniero	18,7
27	Querceto a roverella tipico	34,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	266,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	5,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	48,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	49,3
32	Robinieta-aillanteto	33,3
33	Variante Abete bianco	0,0


Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	2,8	19,9	6,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	2,4	6,9	1,6	1,1	0,1	0,1	0,3	0,4
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	2,7	5,6	4,5	2,0	1,1	0,0	0,3	1,3
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9	0,6	0,2	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	2,5	10,8	17,9	5,2	0,3	0,0	0,4	0,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	26,8	61,1	57,8	37,7	3,3	0,2	15,2	12,8
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	54,8	63,1	24,6	12,1	0,1	0,0	0,0	5,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	18,4	21,4	21,6	12,0	1,4	1,1	3,7	17,5
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,4	1,0	4,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,1
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	23,3	66,3	76,4	13,1	0,9	1,7	1,1	7,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	42,6	37,7	30,4	20,6	15,4	11,1	24,4	36,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	1,7	1,1	3,2	3,8	2,8	1,1	1,6	3,4
27	Querceto a roverella tipico	0,0	6,4	2,0	2,5	5,2	8,3	1,9	1,8	6,4
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	52,0	61,8	50,9	33,1	22,0	9,3	9,0	28,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,9	0,4	0,7	2,6
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	3,9	15,6	17,6	9,1	1,7	0,0	0,0	0,9
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	10,0	22,8	11,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,1
32	Robinieta-aillanteto	0,0	3,7	2,8	12,9	3,5	4,4	1,5	0,7	3,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,6	5,9	10,2	7,7	3,9	1,7	0,6	0,3	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,4	2,9	5,4	2,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,2	1,5	3,7	5,1	3,8	1,6	1,2	0,4	0,1	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,5	0,5	0,3	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,2	1,0	3,0	6,4	7,1	7,4	6,3	3,4	3,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	2,3	9,9	34,7	47,4	44,5	32,5	21,6	13,0	9,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,2	2,3	12,1	27,7	38,7	32,8	21,4	12,6	7,3	5,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	2,4	11,0	14,1	18,5	19,4	16,6	10,0	4,1	0,9	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	0,5	1,4	2,3	1,9	1,3	0,6	0,4	0,1	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,9	4,5	22,3	42,4	46,3	34,7	19,8	10,9	5,8	3,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,0	18,6	30,0	38,4	39,9	33,6	22,4	12,6	7,0	4,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,2	1,6	3,7	4,5	3,7	2,9	1,4	0,6	0,2	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,4	1,7	5,0	8,4	8,5	5,4	3,0	1,5	0,5	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	5,0	17,7	38,3	55,4	56,3	42,4	24,5	14,2	7,9	4,6
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,2	0,7	1,1	1,3	1,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	1,0	9,0	13,8	10,1	6,1	4,2	2,6	1,2	0,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,9	4,4	12,9	15,5	10,7	3,4	1,3	0,1	0,0
32	Robinieta-aillanteto	0,5	2,7	5,1	6,3	6,9	5,5	3,3	2,1	0,6	0,3
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	3,3	2,9	5,8	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	11,5	25,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	81,1	86,4	34,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	5,8	54,5	69,5	26,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	29,5	56,0	9,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	2,2	4,1	1,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	15,3	16,4	96,5	60,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	120,1	85,5	8,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	4,6	9,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	19,9	3,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	49,7	73,5	114,9	27,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	3,3	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	1,7	11,2	26,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	6,7	26,3	11,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	15,6	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0






Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	296,6
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	437,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	119,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0
7	Boschi di forra	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	769,1
9	Castagneto da frutto	94,2
10	Cerreta mesofila	149,0
11	Cerreta mesoxerofila	297,9
12	Faggeta altomontana rupestre	614,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	2842,8
14	Faggeta termofila e basso montana	810,3
15	Latifoglie di invasione miste e varie	191,8
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	2,2
18	Lecceta rupicola	83,6
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	234,0
21	Ostrieto mesofilo	486,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	422,3
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	11,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	111,3
26	Querceto a roverella pioniero	398,1
27	Querceto a roverella tipico	204,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1451,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	21,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	220,8
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	126,1
32	Robinieta-aillanteto	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0

Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	24,2	21,0	19,5	15,0	32,2	52,4	88,3	44,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	27,7	30,4	52,0	63,7	57,0	77,9	92,3	36,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	4,1	2,6	5,0	20,5	18,1	29,3	32,9	6,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	146,4	103,7	40,2	6,0	11,5	46,2	159,3	255,7
9	Castagneto da frutto	0,0	25,3	9,8	12,6	1,5	0,9	3,4	12,6	28,3
10	Cerreta mesofila	0,0	40,4	16,2	3,2	0,6	3,2	9,4	26,0	50,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	35,7	12,1	10,3	9,8	32,9	75,1	60,3	61,7
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	17,8	29,5	64,4	85,5	80,1	137,6	147,1	52,9
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,2	531,8	513,3	336,0	257,8	153,9	153,1	380,2	516,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	169,3	105,8	90,9	65,3	42,5	54,8	108,2	173,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	46,5	20,8	13,0	8,8	11,0	16,9	34,9	39,9
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,6	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,4	0,2	4,5	20,4	29,7	15,2	12,3	0,9
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	10,5	8,2	23,9	35,0	51,1	44,0	37,3	23,8
21	Ostrieto mesofilo	0,0	108,0	98,9	59,2	36,9	29,6	22,3	44,2	87,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	65,2	69,1	61,1	37,5	36,9	43,2	52,3	57,1
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	2,2	0,1	0,0	0,1	0,3	1,5	1,9	5,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,2	21,5	16,6	7,6	2,7	2,7	7,7	26,8	25,5
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	20,0	14,5	16,1	30,7	72,2	100,7	96,2	47,7
27	Querceto a roverella tipico	0,0	4,8	2,7	7,7	16,4	25,0	65,7	67,1	15,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,1	183,7	131,5	131,7	116,3	120,7	183,2	306,8	277,2
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	2,3	0,9	0,4	0,0	0,1	3,0	10,0	5,2
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	33,8	38,0	23,2	8,0	5,4	17,5	46,2	48,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	18,3	11,8	7,3	5,5	1,8	7,5	35,5	38,4
32	Robinieta-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1,1	9,4	35,3	67,2	71,9	55,8	31,7	15,1	5,8	3,3
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	3,7	24,0	58,3	90,1	93,3	77,3	49,1	25,9	12,0	4,3
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,3	3,7	12,3	22,6	26,3	24,1	16,7	9,2	3,2	1,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	3,8	24,6	73,4	122,5	149,1	146,6	114,4	74,3	41,5	19,0
9	Castagneto da frutto	0,5	2,8	7,7	14,5	17,8	17,0	13,8	10,3	5,6	4,1
10	Cerreta mesofila	0,7	2,2	6,1	16,2	25,5	29,9	26,8	19,7	11,5	10,5
11	Cerreta mesoxerofila	1,1	5,6	20,8	51,0	67,2	64,3	44,9	24,6	12,4	6,0
12	Faggeta altomontana rupestre	2,5	13,3	41,0	72,6	87,4	106,7	102,9	84,6	55,5	48,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	11,0	44,2	129,3	268,0	422,2	561,0	561,6	441,4	256,5	147,6
14	Faggeta termofila e basso montana	4,9	19,2	45,7	97,1	137,6	163,1	141,0	105,4	60,8	35,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,8	17,9	44,0	44,6	36,7	23,8	13,7	5,9	2,3	1,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,1	0,9	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,1	0,1	0,6	2,2	8,3	13,9	15,2	13,5	29,6
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	3,8	7,1	13,5	26,6	40,6	47,2	42,7	28,6	14,7	9,2
21	Ostrieto mesofilo	1,5	4,9	13,6	32,4	59,1	89,8	99,5	88,6	59,5	37,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	2,8	7,1	17,7	38,3	63,3	79,4	75,8	61,5	44,2	32,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,2	0,7	1,7	2,7	2,3	1,7	0,9	0,5	0,2
25	Pioppo-saliceto ripariale	4,6	6,9	11,1	17,0	18,1	17,2	13,9	9,5	6,4	6,6
26	Querceto a roverella pioniero	2,8	9,9	27,3	64,1	83,4	84,7	59,3	36,4	18,7	11,4
27	Querceto a roverella tipico	1,1	4,7	11,3	28,4	45,4	46,9	34,4	17,8	9,7	5,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	10,0	32,3	91,2	189,5	276,5	298,6	245,6	164,3	93,3	49,7
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,7	2,5	4,4	5,6	4,5	3,0	1,0	0,3	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,4	3,7	15,1	30,6	39,4	44,5	35,7	26,0	17,3	8,1
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	3,3	6,3	14,1	23,5	23,0	20,6	16,3	11,0	6,4	1,6
32	Robinietao-aillanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	0,1	6,5	62,6	180,9	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	300,6	79,4	12,3	18,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	0,0	5,2	14,5	28,2	67,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	23,8	229,4	403,6	112,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	1,7	45,7	36,0	9,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	13,1	61,1	55,4	17,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	0,5	40,3	208,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,5	50,3	298,7	212,6	46,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	17,6	133,5	807,1	966,1	593,8	321,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	33,4	309,8	433,7	31,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	0,0	0,0	33,4	118,1	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	0,0	3,5	21,9	30,6	11,8	9,5	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	12,9	39,1	64,9	63,0	44,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	9,4	131,9	225,9	112,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	0,1	13,0	193,0	208,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	9,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	0,0	1,6	22,3	76,3	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	3,9	45,0	191,8	137,1	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	2,1	58,4	98,2	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,0	16,8	201,8	568,1	607,3	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	9,6	9,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	3,4	73,5	77,2	65,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	29,6	42,1	22,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

